

47033/B

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

SCHLEGEL, J.C.T.
L

18.00

THESAURUS
MATERIAE MEDICAE

ET

ARTIS PHARMACEUTICAE

QUEM

COLLEGIT ATQUE EDIDIT

IOANN. CHRIST. TRAUGOTT SCHLEGEL

MEDICIN. ATQUE CHIRURG. DOCTOR,

SERENISS. PRINCIP. REGN. DE SCHOENBURG CONSI-
LIAR. AULIC. ET ARCHIATER, DYNASTIARUM WALDEN-
BURG ET LICHTENSTEIN ETC. PHYSICUS ORDINAR., ET
ACADEM. CAESAR. NATUR. CURIOSOR. SODALIS.

TOMUS PRIMUS.

C. TABUL. AEN.

LIPSIAE

SUMTU E. B. SCHWICKERTI.
MDCCXCIII.

EX BIBLIOTHECA
JOSEPHI-CLAUDII-ANTHELMII
RECAMIER,

Doctoris magni Parisiensis nosocomii Medici.

N^o. 6. B.



V I R O

PERILLUSTRI ATQUE EXCELLENTISSIMO

IOANNI CHRISTIANO
DANIELI DE SCHREBER

PHILOSOPH. AC MEDICIN. DOCTORI

S. R. I. NOBILI ACADEM. IMP. NATURAE CURIOSOR.
PRAESIDI CONSILIARIO ARCHIATRO ET COMITI
PALATINO CAESAREO CONSILIARIO AULICO BRAN-
DENBURGICO MEDICINAE ET PHILOSOPHIAE PRO-
FESS. PUBL. ORDINAR. IN UNIVERSITATE REGIA
FRIDERICO-ALEXANDRINA ETC. ETC.

HONORIS AC REVERENTIAE

CAUSSA

TOMUM PRIMUM

HUIUS THESAURI

D. D. D.

UNAQUE

SE RESQUE SUAS DE MELIORI NOTA

COMMENDAT

E D I T O R

LECTURIS

S. P. D.

DR. SCHLEGEL.

Omnes inter doctrinas, quas scire medicum oportet et decet, has praecipue, quibus non solum de historia et virtutibus medicaminum, sed et de ipsis praeparandis aequè atque componendis scite edocti sumus, hoc saeculo vergente, esse purgatas erroribus atque opinionibus praeiudicatis ac magis magisque illustratas, nemo est omnino, qui infitias ibit: quem in finem viri permulti, hac de re bene meriti, cum omni solertia iudicandi ac indefessa opera adlaborandi studuerunt, et, quanta hucusque fieri possint, omnia inventa scriptis suis, posteris quoque inferviendis, consignata, sui commodi studio non abrepti, contulerunt.

Cum autem exempla scriptorum, quae in academiis, uti mos fuit, defenduntur, in tam minori plerumque copia typis exscribuntur, ne sufficerent, ut omnes, qui iure meritoque desideravere, ista sibi comparare possint; inutile ideo non fore, scripta materiam medicam etiam et artem pharmaceuticam spectantia congerere atque coacervare, et ex hac faragine, tempore convenienti, praestantiora tantum, denuo in thesauro, his doctrinis dicato, edenda, eligere, confidens credidi, persuasumque mihi fuit.

Thesaurus, quem iam auspikor, continebit itaque, ac servabit in primis selecta, etiamsi mole

parva, attamen materia hic tractata ponderosa et memoratu digna, scripta, quibus placita veterum atque recentiorum certiora dogmataque puriora, ex materia medica et arte pharmaceutica deprompta, ab auctoribus sunt perpolita atque magis illustrata: quorum syllogen hoc consilio curavi, ut ab interitu non modo vindicentur, sed et ut quisquis, quae iam dudum quaesiverit, facilius nunc et minori pretio sibi parare possit.

Omnes autem scientiae medicinalis patronos atque artis pharmaceuticae fautores perhumaniter oro rogoque, ut me, et in hoc negotio versantem, velint benignissime sublevare. Quisquis enim scriptum suum, hac societate meliorum libellorum non indignum, et materiae medicae l. artis pharmaceuticae explicandae et amplificandae aptum, novaque cura ab ipso auctore limatum, recudi, et in hanc collectionem, a me susceptam, recipi desideret, mecum benevole communicet. Quod favoris singularis documentum semper grato animo agnoscam.

Cum tandem vero intellexero, Vobis L. B., et aequis censoribus thesauri primum tomum non displicuisse; coeptam hanc telam strenue pertexere continuabo. Dabam Waldenburgi d. X. Ianuarii MDCCXCIII.

CONTENTA.

I.

Dr. *Arnoldi Iuliana* diff. de resina elastica Caiennenfi.
Traject. ad Rhen. 1780. - - - Pag. I

II.

Dr. *Guilielmi Pusey Hayle* diff. quaedam de cantharidum natura et usu complectens. L. B. 1786. - 57

III.

Dr. *Ferdinandi Dejean* diff. qua exponitur historia, analysi chemica, origo, et usus oeconomicus fodae Hispanicae. L. B. 1773. - - - 83

IV.

Dr. *Wyeri Guilielmi Muys* diff. et observ. de salis ammoniaci praeclaro ad febres intermittentes usu. Franequerae, 1716. - - - 123

V.

Dr. *Car. P. Thunberg* diff. de medicina Africanorum. Upsaliae, 1785. - - - 191

VI.

Dr. *Everardi Ioann. Thomassen a Thueffink* diff. de opii usu in siphylide observatis probato. L. B. 1785. 199

VII.

Dr. *Hermann. Dieder. Reimari* diff. animadv. quasdam de opii, praecipue in febribus, usu exhibens. L. B. 1784. 241

VIII.

Dr. *Guilielmi Christiani Philippi Cramer* diff. de lichene islandico. Erlangae, 1780. - - - 263

IX.

Dr. *Ioan. Baptist. Iosephi Dillenii* diff. de lichene pyxidato. Moguntiae, 1785. - - Pag. 307

X.

Dr. *Car. Henrici Stolte* diff. de vitriolo albo ejusque usu medico et chirurgico: ab auctore nunc correcta et recent. observ. aucta. 1792. - - 327

XI.

Dr. *Ioannis Müller* diff. medicamentorum antimonialium conspectum sistens. Havniae, 1787. - 363

XII.

Dr. *Ioan. Petri Xav. Fauken* diff. de solutione reguli et vitri antimonii in diversis vinis. Viennae, 1767. 421

I.

DR. ARNOLDI JULIAANS

DISSERTATIO CHEMICA

DE

ESINA ELASTICA CAJENNENSI.

TRAJECTI AD RHENUM,

1780.

A

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

DISSERTATIO CHEMICA

DE

RESINA ELASTICA CAJENNENSI.

Inter omnes globi terraquei partes, quas perlustravit hominum curiositas, nullam certe indagationem nostram magis mereri, quam ingens ille terrarum tractus, qui Novi Orbis nomen gerit, nemo inficiabitur: Admirabilis sane et nostra indagatione perquam dignissima tellus, praeiertim cum talia spectemus producta, quae in mortalium solamen ibi crescere iussit Summus omnium rerum Creator. Superbiat aestuans Asia PALMIS apicibus suis nubila petentibus; fragrantibus LAURIS varia in usus medicos et culinares praebentibus producta; pluribus AMOMI speciebus aliisque calidioribus aromatibus in perniciem luxurantium gulonum saepe transmissis: Mittat et eadem utramque THEAE speciem, potum gratissimum multis exhibentem; binasque KAEMPFERIAS alteram [*Galangae Radicem*] in Vertigine, Singultu, Ventriculi debilitate, aliisque morbis merito laudatam, alteram [*Zedoariae Radicem*] in Hysteria, Asthmate, Nausea cet. maxime efficacem; Praestantemque in Ictero CURCUMAM, menses provocantem, valida resolvendi virtute pollentem; in Diarrhoea Dysenteriaque pertinaci tantis encomiis nuper elatas LOPESIANAE et COLOMBAE radices. Largiatur et valde nutrientes ORCHIDEN [*Salep*] ac CYCAN [*Sago*] viribus exhaustis blandissimum praebentes nutrimentum; SANTALAEque varia; PANACEN famosam SIUMque pretiosum [*Rad. Ginseng et Ninsi*]; Variosque succos ex arboribus et plantis stillantes, uti ex CAMBOGIA *Gummi Guttam* valida vi aquas pellentem; ex ARECA et PTEROCARPO *Terram Catechu* et *Sanguinem Draconis* adstringente facultate praeditas; ex FERULA *Affam Foetidam* Hystericis et verminosis jure commendatam; ex ALOES foliis succum purgantem, vermibus infestum, Hae-

morrhoides mensesque provocantem; et ex PAPAVERE SOMNIFERO *opium*.

Mittat, inquam, Asia tot tantaque haud spernenda in vita communi ac Medicina dona, haud pauciora, haud minora, dicamne plura et valentiora, praebet recentius detectus orbis terrarum tractus, America: mittamus nobilia metalla atque gemmas pretiosas, quibus luxuriat in damnum incolarum infelix America; et oculum vertamus ad ea, quae in levamen calamitatum humanarum ibidem larga manu sparfit Divina Providentia: quae enim morbis mederi, artibus atque scientiis utilia esse possunt, abunde suppeditat tellus Americana.

Quot, quantisque haec confirmare possem exemplis? sufficiant pauca, SACCHARUM, COFFEA, BROMELIAE [*Ananas*] MUSAEque Variæ, EPIDENDRON [*Vanilla*], CONVOLVULUS [*Jalappa*], HIBISCUS [*abelmoschi semen*], TAMARINDUS, CASSIAque FISTULA, nam licet haec ex utraque adveniant India, majori tamen copia vel virtutibus eminentia ex Occidentali advehuntur, et hinc haud immerito huic attribui putarem gratissima illa Oeconomiae ac Pharmaciae dona.

Mittit et America NICOTIANAM, aliis culpatam, aliis laudatam, in Medicina saltem maximi usus.

Quantumne lenimen nobis praebet THEOBROMA [*Cacao*], five cum Vanilla mixtum emaciatos refocillet aegros, five oleo suo lubricante atroces Haemorrhoidum dolores leniat: Quantum in primarum viarum debilitate, febribus aliisque morbis expugnandis usum praebet QUASSIAE LIGNUM: ejusque Affinis SIMAROUBAE CORTEX (a), quem non sine summa, qua pollet sapientia, ibi

*) Simaroubam voco Quassiae affinem praeunte Aublet, qui in opere suo, *Histoire des Plantes de la Guiane Française etc.* Tom. II. Pag. 859, descriptionem ac delineationem arboris hujus dedit: quinque illa arbor praecipuis materiae medicae auctoribus, Crantzio, Vogelio, Linneo, Rutty aliisque ignoretur, non inutile fore spero, si hanc arboris simaroubae descriptionem breviter tradam. Refert ergo Cl. Aublet eam ad classem VII. Continentem Monoecias Decandrias et sequentes ejus Characteres Genericos tradit.

crescere jussit Optimus Creator, ut habitualement Diarrhoeam, Dysenteriamque pertinacem, tum climatis fervore tum aliis ex causis saepius ortam, tolleret: Quantum et his adhuc longe excellentior CINCHONAE CORTEX praestat in

Masculi flores.

Cal. Perianthium monophyllum, quinquedentatum; denticulis subrotundis, acutis.

Cor. Petala quinque, albicantia, lanceolata, calici inserta ad ambitum disci.

Stam. Filamenta decem, corollae longitudine, disco inserta infra germen. Antherae oblongae, incumbentes, biloculares, Squamulae decem, subrotundae, villosae, basi filamentorum interiori adnae.

Pist. Germen sterile, subrotundum, depressum, quinquestriatum, squamulis filamentorum tectum. Stylus nullus, stigma nullum.

Femin. Flor.

Cal. Perianthium ut in masculo.

Cor. Petala ut in masculo.

Stam. Nulla. Squamulae decem, villosae, germen ambientes.

Pist. Germina quinque, coadnata, disco carnosio, orbiculato insidentia. Stylus carnosus, quinquestriatus, stigmata quinque patentia.

Per. Capsulae quinque, subcarnosae, nigrae, ovatae, laterales, distantes, receptaculo carnosio, orbiculato insertae, uniloculares.

Sem. Ovarum, testa fragili inclusum.

Simarouba Amara.

Euonymus fructu nigro, tetragono, vulgo simarouba. *Barr.*
Franc. aequ.

Arbor trunco sexaginta pedali, ad summitatem ramoso; Ramis longis, late et undique sparsis; Ramulis foliosis. Folia alterna, pinnata; Foliolis utrinque binis, quatuor usque ad novem, ovatis, acutis, glabris, rigidis, integerrimis, subflessilibus, utrinque alternatim costae cylindratae, in acumen longum desinenti annexis. Flores in amplas paniculas dispositi axillares et terminales. Ramis, ramusculis et pedunculis florum, ad basim squamula munitis; e floribus alii sunt masculi alii feminei, in eadem panicula.

Cortex trunci et radicum incisus, lacteum et amarum succum effundit: lignum leve, album, amarescit.

Florat Novembri et Decembri; fructum fert maturum Martio et Aprili.

Ex hac Aubletii descriptione patet Simaroubae corticem non e Burseria provenire, quin ne quidem ad eandem classem pertinere, Burseriam enim refert Linn. ad Hexandrias Monogynias.

febris putridis aliisque morbis, tantum quidem, ut, ubi omnia incassum fuerunt adhibita, ille solus haud raro morbos atque letalia fuget pericula: Quantum GUAJACUM, LAURUSque SASSAFRAS, binaeque SMILACIS species *Sarsaparilla et China* viribus fudoriferis, antivenereis, antiscorbuticis, antipodagricis celebres efficere valent: Quantum LONICERAE IPECACUANHAE radix vi resolvente, Diaphoretica, Emetica, Antidysenterica, Antispasmodica pollens: RICINIque oleum, taeniam pellens, ac dirissimos, quibus haud raro infestantur Americes incolae, Pictonum dolores colicos miranda vi leniens; nec non CISSAMPELOS [*Pareirae brauae radix*] Ischuriam, Cruciatusque Nephriticos, Podagricos ac Calculosos mitigans, in asthma humorali, ulcere Renum, Icteroque maximopere laudata, levaminis adferunt.

Non hic radicis CONVOLVULI, *Mechoacan* dicti, ecoproticas, non CORTICUM WINTERANIAE CROTONISque [*Cascarillae*] Vires stimulantibus roborantes, nec ARISTOLOCHIAE [*Serpentariae Virginianae*], nec DORSTENIAE [*Contrajervae*] Alexiterias, aut POLYGALAE [*Radic. Senegae*] resolventes, diureticas, Diaphoreticas et purgantes virtutes efferam.

Non dicam de LOBELIA, certo, ut aiunt, in Lue Venerea remedio: non de SPIGELIA, GEOFFRAEA (*), DO-

(*) Plures, saltem binas, Geoffraeae seu Geoffroae species praebet America, nempe: *Spinosam*, cujus mentionem facit Linnaeus sp. Pl. 2. Tom. II. Pag. 1043. et Jacquin select. stirp. Amer. hist. pag. 207. et *Inermis*, cujus descriptionem ac delineationem dedit Cl. Wright, additis nonnullis de usu hujus corticis medico.

Vid. Philosophical Transactions anni 1777. vol. LXVII. Pag. 507. seqq. Medical and Philosophical Commentaries Vol. V.

Pag. 400. nec non L'Esprit des Journaux Mars 1779. Pag. 324.

Accepinus autem Ao. 1772. ex colonia surinamensi corticem quendam virtute anthelmintica ibidem celebratissimum; ex floribus vero fructibusque in liquore spirituofo transmissis, hunc ad Geoffraeas pertinere cognovi, ex foliis vero, comparatione cum illis *Inermis* instituta, vidi non esse eam a Cl. Wrightio descriptam speciem; videtur potius esse *spinosa* Linn.: hujus jam Geoffraeae Corticem in innumeris aegris exhibitum vidi, viderunt et amici nonnulli Medici, quibus huncce corticem dedimus, eo cum effectu ut, si aegri illum sine magno incommodo debita doli ferre

LICHO PRURIENTE Vermes fugantibus, non de innumeris aliis dicam plantis, quarum usus Americanis fatis notus, nobis vero, quod dolendum, saepe latet.

Quot non et salutares Resinas, Gummata, Balsama stillant Arbores variae, **COPAIFERA**, **PERUIFERA**, **HYMENAEA**, **CARANNA**, **ELEMIFERA**, **TOLUIFERA**, **RHUS**, **LAURUS BENSOIN**, **LIQUIDAMBAR**, et plures aliae, quas omnes enumerare vel diem poscerent.

Inter ea autem, quae mittit America e vegetabilibus producta, sane omnem nostram attentionem meretur **RESINA** illa **ELASTICA**, quae mirandis, quas possidet, proprietatibus, non tantum Physicorum perscrutinium meretur, verum et Chemicorum industriae materiam suppeditat accurato examine dignam. Atque hanc ob rationem est, quod resinam hanc pro subiecto Dissertationis inauguralis elegerim, et eo lubentius quidem, quum a paucis haecenus examinata fuerit; quum et, quae cum ea fecerim tentamina, aliorum pericula tum numero excedant, tum processum eventibus ad illis aliorum aliquomodo discrepent: quae igitur ab aliis relata fuerint, quae ipse instituerim, tentamina candide exponam, eaque benevolo Lectoris Iudicio subiciam.

Ne tamen L. B. in juvenilibus hisce tentaminibus Cultioris Styli Amoenitates aut Rhetorum flosculos expectes; haec barbara ignorat Chemicorum lingua, qui de verbis, quibus utuntur, non ita solliciti sunt, quam quidem de Corporum, quae examinant, natura et proprietatibus detegendis.

Ut vero ordine quodam procedamus, videbimus

I^o. Historiam originemque Resinae Elasticae et methodum, quam ad Varia ex ea paranda utensilia adhibeant Americes incolae.

II^o. Examinabimus Resinam per se.

potuerint, vix ullum medicamentum sit, quod tanta vi anthelmintica gaudeat, ac tam cito et valide agat in tenacissimam pituitam primas vias occupantem, quam idem hicce Cortex: Horum autem tentaminum summam alia occasione publici juris facere animus est.

III°. Videbimus quomodo se habeat ad Aërem, Aquam et Ignem.

IV°. Quomodo ad varia menstua.

V°. Dein nonnulla addituri de praecipitatione Resinae, eo scopo, ut inde instrumenta Chirurgica parentur.

C A P U T I.

CONTINENS HISTORIAM ORIGINEMQUE RESINAE ELASTICAE ET METHODUM, QUAM AD VARIA EX EA PARANDA UTENSILIA ADHIBENT AMERICANI.

Corpus illud singulare, quod Resinae Elasticae Cajenensis, Gummi Elastici, Caoutchouc, Cahuchu, nomine innotuit, definiri potest: quod sit succus, qui, dum ex arbore fluit, lacteus fluidusque est, dein vero Caloris ope ficcatus solidescit, quique magnam in moderato atmosphaerae calore extensilitatem et elasticitatem habet, nec in aqua nec in Alcohole solvitur, imo vix in iis notabiliter mutatur.

Productum hoc Regni Vegetabilis valde singulare non diu fuit cognitum, et ante medium circiter labentis seculi, tantum in Gazophylaceis Historiae Naturalis scrutatorum inveniebatur; Illius autem origo densis eo temporis tenebris obvoluta erat, talisque mansit, donec Illustris DE LA CONDAMINE Ao. 1735 — 1743 iter faciens per Americam meridionalem, ad ripas Fluvii Amazonum et in Provincia Smaragdina, aliquam illius mirabilis succi notitiam acquisiverit: misit enim Ao. 1736. Sociis A. R. Sc. Par. hujus resinae portionem, et cum illa societate communicavit, arborem, ab accolis hujus fluvii *Hhévé*, Hispanis *Jévé* dici solitam, sola incisione facta, huncce fundere succum, addiditque, ex succo hoc ab Incolis parari Cereos et Ampullulas. Haec fuerunt omnia, quae illustris ille Academicus Societati tunc temporis communicavit: nil tamen hac de materia typis fuit mandatum ante Ann. 1749, quo anno Celeberr. CONDAMINE dedit relationem itineris sui, quae legitur in *Comment. A. R. Sc. Par. ad Ann. 1745. Pag. 391, seqq. Editionis in Quarto*, in qua relatione hujus Resinae mentionem facit, nihil tamen addit de Arbore succum hunc

fundente: Astronomicis enim et Topographicis laboribus obrutus vix potuit debitam Historiae Naturali operam navare, quapropter illam provinciam mandavit socio suo in itinere Don PEDRO MALDONADO, Provinciae Smaragdinae Gubernatori, qui vir magnam adhibuit curam, ut omnia, quae de hac resina detegi et cognosci poterant, colligeret, praematura vero morte sublatuſ suas observatio- nes non potuit in lucem emittere, sicque illae magno scien- tiarum damno perierunt.

Posthaec Nobilis Gallus nomine FRESNEAU, qui in Provincia Cajennensi per quatuordecim annos Architecti mi- litaris munere functus fuit, anno hujus seculi quadragesimo tertio in Sylvis Cajennensibus eandem arborem detexit, il- liusque descriptionem ac delineationem dedit in *Actis Ac. R. Sc. Par. ad Annum 1751*; desiderabatur autem adhuc accuratior hujus Arboris cognitio, etenim in delineatione, quam dedit FRESNEAU, deerant flores, neque ex ipsius descriptione poterat dignosci, ad quamnam classem natu- ralem vel artificialem haec arbor pertineret, donec Cl. AU- BLET accuratiorem illius dederit descriptionem et delinea- tionem in opere eximio, nec satis pro meritis in nostra Pa- tria cognito, cui titulus: *Histoire des Plantes de la Guiane Françoise, rangées suivant la methode Sexuelle par M. FUSEE AUBLET. IV. Volum. C. Figuris copiosissimis Paris. 1774. in 4to.*

Utrum tamen Celeberrimus ille Botanicus omnem par- tem impleverit, ex postea dicendis patebit.

Quoniam vero in descriptionibus, a Cl. FRESNEAU et AUBLETIO traditis, nonnulla inveniuntur, quae in al- tera deficiant descriptione, utrasque breviter tradam, et quidem primo FRESNEAU, quae sequens est.

„Arbor haec in insignem altitudinem recte excrescit, comam parvam habens, nullosque alios ramos nisi in sum- mo apice: Crassities summa est ad diametrum duorum pe- dum: truncus hujus arboris versus basin majorem diame- trum habet, ibique squamosus est adinstar Pini fructus: nullae radices extra tellurem sunt compicuae: Folia similia satis sunt foliis Iatrophae Manihot, id est, folia in eodem ramulo sunt plura, nunc quinata, quaternata alias, ut plu-

rimum ternata, inaequalis magnitudinis, longissima quae centrum occupant, tres circiter pollices longa ac tres quartas pollicis partes lata sunt, superne amoene viridescunt, inferne vero magis pallent.

Fructus hujus arboris est drupa triangularis, figuram exhibens feminis Ricini Palmae Christi, multo tamen major est: Drupa haec crassa, lignosa ac trilocularis, in singulis loculis continet semen unicum ovatum, nucleum amygdali-forme exhibens.“ Vid. saepius jam memoratorum Comm. Annum 1751. Pag. 329.

Sequitur jam AUBLETII descriptio, cujus vestigia sequar, in succincta hujus arboris historia tradenda.

Nomine HEVEAE GUIANENSIS retulit Cl. Auctor Arborem hanc ad Classiem Monoeciae Dodecandrae, sequentes vero Characteres tradit: „ARBOR TRUNCO sexaginta pedali, ad summitatem ramoso; RAMIS longis, nudis, late et undique sparsis; RAMULIS foliosis, et fructiferis. FOLIA alterna, dense posita, ternata: FOLIOLIS ovatis, acutis, superne glabris, integerrimis, inferne cinereis, subsessilibus, ad apicem longi petioli adnexis: FLORES non observavi *).

FRUCTUS spicati, terminales. PERICARPIUM; Capsula glabra, oblonga, trigona, apice acuto, trifurcata, trilocularis, singulis loculis bivalvibus, valvulis crassis lignosis extrorsum elastice dehiscentibus: SEMINA duo, tria, quandoque unum, ovata, testa e cinereo et ferrugineo variegata, tenui, fragili, tecta, introrsum angulo valvularum affixa.

NUCLEUS edulis et dulcis. Fructum ferebat Aprili et Martio.“

Habitat in Sylvis Guianae et in variis Americae Meridionalis partibus: Nomen Caribaeum *Hhévé*, *Hévé*, *Jévé*, *Kaothove*, *Cahuchu*, *Caoutchouc*: Lusitanis *Pao de Seringa*

*) Si flores non observaverit Cl. Auctor, nescio, quo fundamento arborem hanc ad Monoeciam Dodecandram retulerit: nisi forsan Cl. Bernardo de Jussieu hanc partem debeamus; celebris enim ille Botanicus Aubletii delineationes cum plantis siccatissimis comparavit, synonyma, citationes ac terminos technicos addidit. Vid. Aublet, hist. in praefat: pag. 29.

vel *Xiringa*, Gallis *Bois de Siringue* dicitur. Quicumque jam attente utriusque Viri Clarissimi descriptionem secum invicem comparet, fatebitur illas satis bene congruere, singulare autem est, quod nec FRESNEAU nec AUBLET florum aliquam mentionem faciant, in utraque etiam delineatione desiderantur: praeterea aliqua differentia habetur in delineationibus foliorum, et majus adhuc discrimen in figura fructuum, quod ipse animadvertit AUBLET, dum ait, „*on trouve une mauvaise figure de cet arbre, de ses feuilles et de son fruit, Planche 20, Mèm. de l'Ac. Roy. des Sciences 1751.*“

An forsan illa AUBLETII est varietas illius, quam descripsit FRESNEAU?

Quod usum hujus Arboris attinet, varius est: lignum enim leve et flexile, cortice griseo non crasso instructum, quumque in sat altam longitudinem recte excrescat truncus, malis navalibus minoribus parandis optime inservit. Americani praeterea in itineribus suis has arbores offendentes, earum fructus avide colligunt ac comedunt, testaturque Cl. AUBLET, se his fructibus magna sat copia usum fuisse absque ullo incommodo: dein ex hisce nucleis contusis coctione extrahitur oleum pingue, quod ad usus culinares apud Indigenas loco butyri adhibetur, praecipuus tamen usus, quem praebet Hevea, est, quod truncus ejus leviter decorticatus emittat succum lacteum, qui inspissatus exhibet Resinam sic dictam Elasticam: ut vero majorem hujus succi copiam acquirant, sequenti methodo procedunt Americes Incolae: Lavant scilicet inferiorem trunci partem, tumque ad basin arboris faciunt incisionem horisontalem per integrum Corticem penetrantem; dein incisionem faciunt perpendicularem a superiori trunci parte inferiora versus usque ad incisionem horisontalem, ac denique plures laterales faciunt incisiones, sic dispositas, ut ex harum prima in secundam, ex hac in tertiam, et sic porro, stillet succus, donec ad ultimam pervenerit, cui vas quoddam recipiens applicant, sicque satis copiosam hujus succi quantitatem acquirunt. Hic jam succus in initio fluidus lacteusque brevi tamen, solis radiis expositus, inspissatur, nigricans redditur ac in resinam mollem mutatur: quamdiu haec succus fui-

dus est, ex eo varia Utenfilia formari possunt, quod sequenti modo fieri solet: Parant scilicet Indi ex argilla pingui Formam, quae instrumentum parandum v. gr. Ampullulam exacte refert; formam hanc undiquaque illiniunt succo hoc lacteo, eumque exponunt fumo denso foci, cavendo tamen, ne flamma attingat succum, quod si fieret, resina in bullulas elevaretur et foraminula contraheret: quamprimum jam succus hic flavescit et tangenti digito non amplius adhaerescit, altera succi portione primum stratum iterum illiniunt, similique ratione siccant, et hoc modo pergunt donec desideratam crassitiem acquisiverit, tumque, antequam plane ficcus et durus evaserit succus, ope instrumentorum ligneorum varias imprimunt figuras: hoc facto, omnibusque rite siccatis, comprimendo frangunt formam, ac in ampullulam modo paratam aquam immittunt, sicque remanentem argillam eluunt.

Dicto jam modo, mutatis mutandis, in Indiis Occidentalibus parant varia Utenfilia, inter quae omnium frequentissime occurrunt Ampullulae pyriformes *), cavae, quas ope epistomii ex arundine facti occludunt, filo lineo ampullulae collo circumdato; talem jam ampullulam, aqua tepida repletam, comprimunt, comprimendoque evacuant, sicque haec ampullula effectum exserit syphunculi vulgaris, excepto quod non indigeat embolo. Hocce instrumentorum genus valde in usu est apud Omaguas, ceterosque Maranonis fluvii accolae, quando enim hi alicujus festivitatis causa conveniunt, Pater familias suam urbanitatem monstrat, cuique convivarum ampullulam talem offerendo, cujus usus semper praecedere solet solemnibus eorum conviviiis: hoc autem imitati sunt in America degentes Lusitani; hinc arborem resinam hanc fundentem vocarunt Pao de Xiringa. Variorum praeterea ex illa Resina parant Incolae imagines Animalium, Equorum, Ovium, Boum, Avium etc.

Ex eadem materia parantur et Annuli, qui in initio digitum accurate complectentes, postea carpum armillae

*) Hae ampullulae praeterea adhiibentur ad thermometrorum globos accuratissime formandos, uti testatur Cl. *I. H. Magellan* Essai sur la Nouv. Theor. du Feu Element: avec la description de nouveaux Thermometres. Lond. 1780. p. 189.

instar amplectuntur, et dein ad priorem mensuram contrahuntur: quod vero annulus hujusmodi dīgito accomodatus adeo possit extendi, ut collaris, quin et cinguli vice fungatur, uti nonnulli perhibent, nimium exaggeratum esse satis constat. Magis adhuc manifeste falsum est illud, quod nonnulli de hac resina testantur *), parari scilicet ex eadem Globos lusorios, qui in pavementum cadentes ad majorem altitudinem profiliant, quam ex qua profecti sunt; hoc, inquam, manifeste falsum est, non tantum enim hoc legibus Physices plane contradiceret, verum etiam, si assertum illud verum esset, necessario sequeretur, quod globus istiusmodi in planum horizontalem libere impingens, ac alternatim in altum profiliens, iterumque cadens, continuo altior saltum faceret, sicque acciperet motum, quoad altitudinem immensum, quoad durationem aeternum, quod nemo, cui mens iana est, facile affirmabit. Hoc vero certum est, quod hi globi, quomodocumque tractentur, recuperent figuram suam sphaeroidaeam, et quod in planum aliquod cadentes ad satis magnam altitudinem resiliant.

Linteamina quoque hocce succo, dum adhuc in statu fluido est, imbuunt, quae exsiccata pluviis sunt impenetrabilia, iisdemque intervium usibus, ad quos apud nostrates lintea cera imbuta adhibentur.

Parant et Americani ex Resina hac Faces, quae $1\frac{1}{2}$ vel 2 pollicum diametrum et duorum pedum longitudinem habent, quasque involvunt folio duplicato Musae cujusdam, Bihai cognomine notae, eo scopo, ut ardentes et liquefactae melius possint contineri; hoc modo paratae faces non indigent ellychnio, ardentes haud ingratum spargunt odorem, flammam lucidissimam edunt, ac in quiete repositae, nec vento agitatae per 48. horas ardere possunt et quidem absque quod ullae guttae depluant. Hujus generis faces multi harum Regionum incolae adhibere solent, quin et Cl. de la CONDAMINE, iter nocte continuans, talibus taedis per saepe fuit usus.

Denique Indi ex eadem materia formant Ochreas, quae et pueri et adulti pedibus ita sunt accomodatae, ut eos ac-

*) Vid. Histoire de saint Domingue par le Père de Charlevoix
Amst. 1733

curate amplectantur: hae jam ochreae aquis sunt inperviae, nec facile aëris injuriis ac attritu consumuntur, ceterum hae satis bene corium simulant, praesertim ubi fumo ficcatae fuerint.

Binas tales Ochreas a Cl. FRESNEAVO Indorum more paratas et figuris ornatas, a Cl. DE LA CONDAMINE Academiae R. Sc. Par. oblatas fuisse constat ex *Comm. ejusd. Acad. Anni 1768.*

Pictoribus ac delineatoribus Europaeis porro haec resina infervit ad lineas et figuras delendas, si forte illas minus accurate pinxerint Molybdaena [*Belg. Potloot.*], cui scopo tam egregie satisfacit, ut nullam in charta relinquat maculam.

Ex illa tandem tentarunt varia efformare Instrumenta Chirurgicis usibus destinata, sed ea de re alio loco paulo fufius agemus.

C A P U T II.

EXAMEN RESINAE ELASTICAE PER SE.

Ut jam accuratius in naturam Resinae Elasticae inquiramus, videndum primo est, quatenam sint ejus proprietates externae, quae statim sese offerunt; inter eas autem proprietates est mirabilis ista facultas, quae nulli alii corpori adhucdum cognito eo gradu competit, Extensilitatem volo ac Elasticitatem: harum vero, ut aliquam mensuram acquirerem, sequentia institui pericula.

EXPERIMENTUM I. Sumsi frustulum Resinae, quod, quantum fieri potuit, ubique aequalis erat crassitie, illudque in formam parallelepipedeam redegei, tumque, superius et inferius inter binos posui afferculos, quos dein ab utraque parte cochleis firmavi, et ita idonei apparatus ope pependi, ut perpendicularem situm haberet et ab omni tactu liberum esset; hoc facto, hamulo inferioris cochleae apposui pondera, et notavi, in quantum ab appensis singulis ponderibus extenderetur resinae frustulum: Eventus fuit sequens *).

*) [Notandum autem quod in dimensionibus nostris usi fuerimus mensura Anglicana, in qua singulae Unciae pollicares constant 10. lineis.]

A. Primi parallelepipedi pondus erat XXIX. granorum.

	unc.	pol.	dec.
ejus Longitudo	I.		7.
Latitudo	O.		4.
Craffities	O.		I.

Pondus totius apparatus, inter quem parallelepipedum inferius continebatur, Unc. IV. dr. V. gr. X.

unc. p. dec.

Longitudo inter afferculos erat	I.	I.	*)
ope libij civilis extendebatur ad	I.	6.	ergo incrementum 0.5.
— libij — — —	2.	0.	— — 0.9.
— libij — — —	3.	2.	— — 2.1.
Rumpitur ad	3.	3.	— — 2.2.

B. Alterum parallelepipedum ponderabat XXXIX $\frac{1}{2}$ gran:

unc. p. dec.

Longitudo ejus erat.	I.	3 $\frac{1}{2}$.	inter afferculos	0.9.
Latitudo — —	O.	7.		
Craffities — —	O.	1 $\frac{1}{2}$.		

Pondus apparatus ut supra.

Ope libij civ. extend. ad	I.	0.	ergo increment.	0.1.
— libij — — —	I.	1.	— — —	0.2.
— $\text{libij}\frac{1}{2}$ — — —	I.	2.	— — —	0.3.
— libij — — —	I.	6.	— — —	0.7.
— $\text{libij}\frac{4}{6}$ — — —	2.	5 $\frac{1}{4}$.	— — —	1.6 $\frac{1}{4}$.
— $\text{libij}\frac{7}{6}$ — — —	2.	8 $\frac{1}{2}$.	— — —	1.9 $\frac{1}{2}$.
— $\text{libij}\frac{7}{6}$ — — —	3.	1 $\frac{1}{2}$.	— — —	2.1 $\frac{1}{2}$.
— $\text{libij}\frac{8}{6}$ — — —	3.	2.	— — —	2.3**)
— $\text{libij}\frac{9}{6}$ — — —	3.	3.	— — —	2.4.
— $\text{libij}\frac{10}{6}$ — — —	3.	4 $\frac{1}{4}$.	— — —	2.5 $\frac{1}{4}$.
— $\text{libij}\frac{11}{6}$ — — —	3.	5.	— — —	2.6.

Rumpitur ad extremum inferius.

C. Tertii parallelepipedi pondus erat granorum LXXXV.

Pondus apparatus inferioris ut in praecedentibus.

*) haec Longitudo tantum computari debet, quia illa resinae pars, quae afferculis et cochleis continetur, non potest extendi.

**) Latitudo nunc erat 3 dec: poll. craffities I. dec.

	unc.	poll.	dec.		
Longitudo	2.	0.		inter asserculos	I. 4.
Latitudo	0.	6.			
Craffities	0.	2.			

¶ Civilis nullam dabat extensionem.

Ope ¶ij civ: extend. ad I. 6. ergo increm. 0. 2.

— ¶ij	—	—	I.	8.	—	—	0.	4.
— ¶v	—	—	I.	9.	—	—	0.	5.
— ¶v	—	—	2.	I.	—	—	0.	7.
— ¶vi	—	—	2.	7.	—	—	I.	3.
— ¶vii	—	—	3.	4.	—	—	2.	0.
— —viii	—	—	5.	I.	—	—	3.	7.
— —viii $\frac{1}{2}$	—	—	6.	0.	—	—	4.	6. Rump.

D. Quarti Parallelepipedum pondus erat CXI.VI $\frac{1}{2}$ granorum.
Apparatus ut supra.

	unc.	p.	dec.		
Longitudo	2.		8 $\frac{1}{2}$.	inter asserculos	2. 0.
Latitudo	I.		I $\frac{1}{4}$.		
Craffities	0.		I $\frac{1}{2}$.		

Ope ¶ij	Civ. extendeb. ad	unc.	p.	dec.				
— —ij	—	—	2.	3 $\frac{1}{2}$.	—	—	0.	3 $\frac{1}{2}$.
— —ij $\frac{1}{2}$	—	—	2.	4 $\frac{1}{2}$.	—	—	0.	4 $\frac{1}{2}$.
— —iiij	—	—	2.	6.	—	—	0.	6.
— —iv	—	—	2.	8.	—	—	0.	8.
— —iv $\frac{1}{2}$	—	—	3.	0.	—	—	I.	0.
— —v	—	—	3.	2.	—	—	I.	2.
— —v $\frac{1}{2}$	—	—	3.	5.	—	—	I.	5.
— —vj	—	—	3.	8 $\frac{1}{2}$.	—	—	I.	8 $\frac{1}{2}$.
— —vii	—	—	4.	6.	—	—	2.	6.
— —vii $\frac{1}{2}$	—	—	5.	I.	—	—	3.	I.
— —viii	—	—	5.	5.	—	—	3.	5.
— —viii $\frac{1}{2}$	—	—	6.	3.	—	—	4.	3.
— —viii $\frac{3}{4}$	—	—	6.	6.	—	—	4.	6.
— —ix	—	—	7.	0.	—	—	5.	0.
— —ix $\frac{1}{4}$	—	—	7.	5.	—	—	5.	5.
— —ix $\frac{1}{2}$	—	—	7.	7.	—	—	5.	7.
— —ix $\frac{3}{4}$	—	—	8.	0.	—	—	6.	0.
— —x	—	—	8.	4.	—	—	6.	4.

Rumpitur ad extremum inferius.

Sic videmus in experimentis nostris summum extensionis incrementum fuisse in frustulo

- A. [Quod long. habebat 1 unc. poll. 1 dec. inter asserc.] ^{unc. p. dec.} 2. 2.
id est duplum longit. suae.
- B. [Quod long. habebat 9 dec. poll.] 2. 6. i. e. $2\frac{8}{9}$
long. suae.
- C. [Quod long. habebat 1 unc. p. 4. dec.] 4. 6. i. e. $3\frac{2}{7}$
long. suae.
- D. [Cujus longit. erat 2 unc. poll.] 6. 4. i. e. $3\frac{1}{5}$
long. suae.

Notandum autem, quod, dum haec pericula fecerim, altitudo mercurii in Thermometro 72° . esset; hocque ideo monendum, quia magna inveniretur differentia, ubi haec experimenta in frigidiori caperentur atmosphaera.

Cl. ACHARDS, qui unicum tale extensionis exemplum adfert, sequentia expertus est:

Frustulum scilicet R^{ae}. E^{ae}. debito modo inter binos asserculos firmavit; sicque extremo inferius balancem adaptavit, ut in illam pondera possint immitti.

Sumfit autem frustulum, cujus longitudo erat 12 linear. poll., latitudo $5\frac{1}{2}$, crassities $\frac{3}{4}$ lineae poll.

Vis Hb id est apparatus inferioris, extensionem faciebat 2 lin.

— —ij extensionem producebat 4 linearum.

— —iiij — — $7\frac{6}{10}$ —

— —iv — — $16\frac{4}{10}$ —

— —v — — $24\frac{9}{10}$ —

— —vj — — $32\frac{7}{10}$ —

— —vij — — $37\frac{8}{10}$ —

— —viij Rupturam resinae effecit.

Dein addit „Extensionem resinae, ac vires adhibitas „lineis pollicaribus expressi, exinde observavi in extremitate „lineam curvam regularem describi, ita ut formulâ algebrarum „ca proportio inter abscissas et ordinatas hujus lineae possit „calculari, et definiri quantum Resina Elastica extendi debeat ad datas Vires trahentes“ *).

*) Vid. Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde. Dritter Band, pag. 358.

Gravitas specifica resinae elasticae ad bilancem hydrostaticam explorata est ad illam aquae uti 920: 1000. vel uti 92: 100.

C A P U T III.

EXAMEN RESINAE ELASTICAE AD AEREM, AQUAM ET IGNEM.

Historiam Resinae Elasticae Chemicam perscrutaturi, illam valde imperfectam adhucdum invenimus: pauci enim Auctores de mirabilis hujus Regni Vegetabilis producti Analyfi Chemica scripserunt, et, si quid hac de re in lucem emisserint, longe tamen abest, ut omnem paginam absolvisse videantur.

Etenim ab illo tempore, quo Resina haec inter Europaeos innotuit, proprietates singulares eique privatae effecerunt, ut principes Chemicum in id praecipue incubuerint, ut invenirent aptum huic corpori menstruum, quo scilicet solveretur, ac dein, quomodo e menstruo hoc expelleretur, non mutatis proprietatibus illis, quae resinam hanc ab omnibus aliis corporibus distinguant.

Hocce Problema dissolvere omnium primus tentavit Illustrissimus DE LA CONDAMINE, sed infausto successu, ne quidem enim hanc Resinam dissolvere potuit: Illo vero felicior Nobiliss. FRESNEAU solutionem obtinuit, Resinam in Oleo Nucum diutissime digerendo, haec tamen solutio scopo suo nullo modo sufficiebat *).

Dein bini Gallorum Chemicorum Principes, MACQUER et HERISSANT eodem tempore, licet sibi invicem non communicaverint ideas, in illud omnem suam attentionem fixerunt, ut perfectam ac dictis conditionibus praeditam Resinae solutionem acquirerent, nec spes fefellit eos, uterque enim invenit hanc methodum, scilicet spiritum Aethereum Vitriolicum seu Naphtham Vitrioli rectificatissimam jungendo cum Resina hac. Horum tentaminum relatio legitur in *Historia Ac. R. Sc. Par. A.* 1763. Pag. 49. Ha-

*) *Vid. Memoires de l'Ac. Roy. des Sciences de Paris. Ann. 1751. Pag. 333. Memoires de Mathem. et de Physique, même année pag. 509.*

bentur et plura experimenta hunc in finem a Cl. MACQUER instituta in *Actis Memoratae Acad. ad Ann. 1768. Pag. 209.* Horum autem Clarissimorum Virorum industria sola hujus solutionis inventione fuit limitata, nullumque, quantum scio, Resinae Elast. ulterius examen fuit institutum, donec Celebrerrimus Germanus nomine ACHARDS nonnulla instituerit experimenta, quae facerent ad melius cognoscendam Resinae nostrae naturam, quae tentamina exstant in libro A. 1777. Berlini Germanico Idiomate edito, cui titulus *Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde, Tom. III. Pag. 356. seqq.*

Licet autem Cl. ACHARDS plura, quam reliqui memorati viri, instituerit tentamina, eaque diversae indolis, non tamen hanc materiam ita exhaustit, quin plura restent cum eadem instituenda experimenta. Post eum vero nemo aliquid novi hac de re in lucem prodidit, licet enim in multis scriptis periodicis hujus Resinae Elasticae mentio fuerit facta, illorum tamen scriptorum auctores materiam suam e Commentariis Ac. Parisinae hauserunt, immo nonnulli verbotenus, mutato tantum Idiomate, dissertationes Gallorum descripsere.

In Experimentis autem ACHARDSII nonnulla occurrunt, quae quoad eventum differunt a nostris tentaminibus, sicuti illud loco suo pace Viri Clarissimi ac decenti cum modestia indicabimus. Interea omnem curam adhibuimus, ut experimenta nostra sint accurata et cum veritate exacte quadrent: nonnulla quoque pericula (uti Exp. IV. V. IX. XIII.) feci sub Oculis Celebrerrimi NAHUSII, Praeceptoris nostri ad rogam usque colendi, qui, praeter alia in me collata beneficia, suo consilio et in hac materie mihi adesse non fuit designatus.

Omnia instrumenta Chemicorum activa, quae adhibui, Menstrua, cet. quantum fieri potuit, ipse paravi, vel, si hoc fieri non potuerit, ut omnia purissima ac sui generis optima fuerint, curavi, si minus pura vel suspecta fuerint, addito epitheto *Venali* indicavi.

His praemissis, transeamus ad Historiam Resinae Elasticae Chemicam, et quidem videamus primo, quid AER, AQUA et IGNIS in illam valeant.

In AERE moderate calido suam elasticitatem, extensilitatem ac mollitiem retinet, quam primum vero frigus glaciale adest, mutatur Resinae color ex nigro in cinereum, induratur et fragilis aliquomodo redditur, plurimumque de extensilitate sua amittit: hoc autem satis diu durat, licet enim medio Aprili satis moderatus fuerit atmosphaerae calor, nondum tamen pristinam suam mollitiem et extensilitatem recuperavit: et haec est causa, quare in Exp. I. indicaverim, in instituendo illo experimento caloris aliquam rationem esse habendam.

In AQUA non dissolvitur, licet in ea satis diu coquatur, imo Cl. MACQUER resinam in olla Papiniana cum aqua tractavit, nulla subsequente solutione, forsan, inquit Cl. Auctor; in summo caloris gradu notabiliter fuit emollita Resina, quum tamen eo tempore absque periculo vix potuit aperiri olla, illum apparatus relinquere fuit coactus, donec aliquomodo refrigeratus fuit, tuncque aperta olla invenit Resinam majorem duritiem et naturam corneam induisse. *Vid. Memoires de l' A. R. des sc. A. 1768.* Ut autem, viderem, qualem mutationem aqua induceret Resinae nostrae, sequens institui experimentum.

EXP. II. Sumsi frustulum Resinae, illudque scissi in formam parallelepipedi, cujus pondus erat gr. XXVII. Longitudo 18. dec. poll., latitudo 12. dec. poll., crassities $3\frac{1}{2}$ dec. Per frustulum hoc filum trajeci, illique aliquod pondus appendi, ut praecaveretur, quo minus semper aquae innataret Resina. Hoc facto immisi apparatus hunc in ollam aqua calida repletam, et in olla illa per 6 horas ebullire jussi, tumque sequentes inveni mutationes.

1. Resina parum non tamen notabiliter emollita fuit.
2. Ejus color griseus evasit.
3. Striae pulcre in Resina apparebant, oriundae a stratis Resinae sibi successive impositis.
4. Pondus, longitudo ac latitudo non fuerunt mutata.
5. Crassities autem post ebullitionem per $\frac{1}{10}$ pollic. fuit aucta.

IGNIS effectus in Resinam variat, pro vario modo, quo illi applicetur; triplici ergo modo Resinam ad ignem

tractavi, 1^o. nempe ad candelae flammam accendi. 2^o. in vase aperto eam igni imposui. 3^o. idem feci in vase clauso.

EXP. III. Frustulum Resinae elasticae ad flammam candelae admotae satis bene et cito flammam capit, lumen lucidum et flavum edit, odorem vix ullum, saltem non ingratum, spargit, fumum densum nigerrimum emittit: Guttulae Resinosae depluentes, ubi colliguntur, sunt pingues, fluidae et referunt Resinam secundum seq. experimentum liquefactam; atque adeo erroneum videtur illud assertum FRESNEAVI, quod scilicet guttulae hae collectae novis formandis facibus inservire possint, eodem modo, ac ante liquefactionem. *Vid. Mem. A. 1751. Pag. 333.*

EXP. IV. Immisi in Crucibulum portionem Resinae Elasticae in frustula discissae, igne applicato leni non multum mutatur Resina, sed adhibito majori caloris gradu (Sec. Cl. ACHARDS calor 100 grad. in Scala REAUMURI requiritur.) intumescit, sensim incipit fluere, mutaturque in massam nigram viscidam, Balsamum referentem, odoris ingrati empyreumatici, quaeque frigefacta non amplius concrefcit: haec jam materia pinguis viscida sequentes dotes habet:

1^o. In aqua ebulliente non dissolvitur, nec in Alkali fixo.

2^o. In Sp. Vini Rect. ex parte solvitur, maxima tamen pars indissoluta manet, coquendo enim Resinam hoc modo liquefactam in Sp. Vini Rectif: acquisivi Tincturam flavescen-tem, cujus aliquot guttae in aquam immissae sat notabilem lactescentiam effecerunt.

3^o. Miscui portionem hujus materiae Resinosae cum dr. iij. Spiritus Nitri Fumantis; mox oritur ingens tumultus ac calor, vaporesque ruberrimi copiosi producuntur, licet autem pluries hoc experimentum repetierim, nullam tamen videre inflammationem mihi contigit, uti ACHARD-SIUS sibi contigisse scribit *Exp. XVI*. Sic jam acquisivi solutionem ex rubro fuscam pellucidam, quae sequenti modo sese habebat:

α. Per aquam destillatam turbabatur et praecipitabatur pulvis flavus.

β. Spiritu Vini Rect. diluebatur, non vero turbabatur solutio.

γ. Oleum Tartari per deliq., et Sp. Sal. Ammoniaci huic solutioni addita prodixerunt effervescentiam et calorem: Sp. vero Salis Ammon. praeterea albos, copiosos, vapores expulsi: Statim ubi Alkali affusum fuerit, color solutionis in flavum vertitur et praecipitatio obtinet, ubi tamen ultra saturationis punctum affusum fuerit alcali, pelluciditas redit et color intense ruber evadit, quae rubedo, affuso acido, in flavedinem denuo vertitur, iterumque turbatur liquor.

4°. Praecedens experimentum (3°.) repetii, fumendo tamen Olei Vitrioli et Spiritus Nitri fumantis aequalem portionem, et ne tum quidem inflammatio fuit exorta; eventus autem non multum fuit absimilis praecedentis.

Viso jam, quomodo se habeat Resina Elastica, quando igni nudo vel et in vase aperto applicetur, videndum sequitur, quomodo se habeat, ubi in vasis clausis ad ignem tractetur, destillationem itaque siccam institui.

EXP. V. Immisi Unc. VI. Resinae Elasticae, in frustula minora discissae, in retortam vitream quadruplo capaciore, illamque in B. A. ita posui, ut fundus retortae fundum ollae ferreae fere tangeret, supposui in initio parum tantum ignis, atque lenissimo eo caloris gradu dr. β. liquoris subflavescentis pellucidi transiit, licet Resina Elastica haecenus ad oculum, introspeciendo retortam, nullam mutationem subiisset: quum vero nihil ulterius transiret, novum apposui excipulum et ignem aliquomodo adauxi, atque tum liquefieri coepit Resina, simulque emittere Fumum et Vapores albos, qui in excipulum transibant, elevari quoque coepit Oleum pellucidum ex flavo rubicundum sub forma parvarum guttarum ad supremam retortae partem, illudque, una cum exigua Liquoris fusci intermixta copia, depluere continuavit guttatim, tardissime tamen, in vas recipiens, fumi autem illi brevi cessabant, et, quia vix quid ulterius transibat, coactus fui notabiliter adaugere ignem, antequam fumi iterum apparebant, et liquor ita stillabat, ut octo inter

binas cadentes guttas numerari possent *), hoc quum locum habebat, eum caloris gradum conservavi, sicque per tres horas continuavi, usque dum Olei spissioris et minus pellucidi guttae apparebant, separavi tum excipulum atque liquorem intus contentum effudi, qui pondus habebat Unc. iij β . novo applicato excipulo, ignem sensim auxi ad summum, qui adhiberi potest in Balneo arenae, gradum usque, superimpositis tandem prunis ardentibus et olla ferrea ad perfectam candescentiam exalefacta; eoque caloris gradu tamdiu adhibito, usque dum dimidiae horae spatio nihil prorsus transfret. Vario hoc caloris gradu destillant adhuc Olei spissioris opaci profunde fusci dr. x, atque una cum eo transferunt Spiritus tenuioris pellucidi subflavescentis dr. v β . In diffracta retorta restabant Carbonis nigri spongiosi, non tamen multum tumefacti, extus splendentis dr. ij.

Producta igitur, quae destillatione obtinentur ex Resina Elastica, sunt:

1°. *Phlegma*, quod parva quidem quantitate sed, leni calore, volatile redditur. Phlegma illud, affusum succo Vegetabilium violaceo, vix ullam ipsi inducit mutationem, solutioni autem Mercurii Sublim. Corros. dum affunditur, levem post aliquot minuta producit turbulentiam et praecipitationem dein pulveris grisei.

2°. *Oleum tenue*, fluidissimum, coloris ex flavo rubicundi, illudque notabili prorsus copia, acquisivi enim ipsius Unc. iij β . Oleum illud odorem habet haud multum diversum ab eo Olei Cerae.

3°. *Spiritus*, profunde fuscus et aliquomodo turbidus. Spiritus hic quidem exigua quantitate Scr. ij. prodiit, sed examinatus manifeste alcalinus volatilis est, Syrupum Vio-larum enim colore viridi tingit et Mercurium Sublimatum Corrosivum ex ipsius solutione pro magna parte colore gri-seo prompte praecipitat, cum acidis autem non effervesceat.

4°. *Oleum spissius*, profunde tinctum opacum et paulo fortius olens, denuo insigni calore et satis bona copia elicitur, dr. x. enim hoc modo destillarunt.

*) Cave tamen, ne nimis intendatur ignis, guttaeque citius quam dicto numero depluant, quia tum magno cum impetu vapores densi prorumpunt, et calor transeuntis liquoris vasis fissuram produceret.

5°. *Spiritus subflavescent*, pellucidus, una cum oleo spissiore transit, atque spiritus hic manifeste quoque naturae alcalinae volatilis est, quemadmodum apparet, si Syrupo Violarum et solutioni Mercurii Sublimati Corrosivi affundatur, prioris enim colorem violaceum in viridem mutat, ex posteriore autem Mercurium colore griseo pro parte praecipitat, cum acidis autem non effervescebat.

6°. *Carbo* tandem niger remanet, non tamen magna copia, quum vigesimam quartam partem Resinae Elasticae adhibitae tantum constituat, atque carbo ille super patinam calcinatoriam calcinatus decrevit pondere dr. j. et gr. xvj., et in pulverem coloris ex flavo subrubelli conversus est, qui pulvis aqua elixatus nulla signa salis alcalini exhibuit, parum tamen salis marini continere videbatur, quia plumbum ex aqua forti aliquomodo praecipitabat.

Proportio autem, quae inter diversa modo dicta producta locum habuit, talis est, ut acquisiverimus:

Phlegmatis subalcalini	dr. β.
Olei tenuioris	Unc. iij. et dr. iv.
Sp. Alcalini volatilis paulo fortioris	scr. ij.
Ol. spissioris	Unc. j. et dr. ij.
Sp. alcal. volat. minus fort.	dr. vβ.
Carbonis	dr. ij.

Omnia producta simul sumpta exhibent pond. Un. v. dr. vj. et scr. ij

Idcirco tantum perdidimus scr. iv, qui sub operatione vel in auras avolarunt, vel lateribus vasorum adhaerentes manserunt.

Cl. ACHARDS etiam destillationem Resinae elasticae instituit, quam in *Exp. II.* sequentibus describit verbis.

„Resinae Elasticae dr. ij. in minora frustula discissi, et immisi in retortam vitream, ac, applicato recipiente, destillationem institui ex B. A. leni igne: peracta destillatione inveni in recipiente oleum ex fusco flavum, valde fluidum, odoris laedi affati. In retorta granum dimidium capitis mortui supererat.“

Duplex itaque fuit ACHARDSII ex hac destillatione productum, alterum fluidum, nempe oleum, alterum soli-

dum, nempe carbo. Quanta ergo differentia cum nostro experimento, in quo sex producta acquisivimus. Hujus autem discriminis ratio ex eo est petenda, quod Cl. ACHARDS vel non habuerit, vel saltem non adhibuerit, sufficientem hujus Resinae copiam.

Sed redeamus ad destillationem nostram, et pauca videamus de productis, imprimis de oleis. Oleum ex Resina Elastica destillationis ope productum duplex est, alterum tenuius primo, alterum spissius secundo prodeuns, in utroque autem adest oleum essentiale, adest et oleum pingue, quod sequenti demonstrabitur experimento.

EXPER. VI. 1°. Sumsi portionem *olei tenuioris*, per destillationem ex Resina acquisiti, miscui illam cum Spiritu Vini rectificato, statim color spiritus flavescit, et adhibito calore rubescit, ac pro maxima parte solvitur oleum, reliqua in fundo indissoluta relicta.

2°. Sumsi quoque *olei spissioris*, per destillationem acquisiti, portionem, et cum Sp. Vini rect. eodem tractavi modo, eventu haud dispari: illa tantum intercedit differentia, quod hujus color sit intentior et fluiditas minor, quam prioris.

EXP. VII. Scr. I. *olei tenuioris* et simili quantitati *olei spissioris* addidi duplum *Spir. Sal. Ammoniac. c. calce parati*, turbantur liquores, solvuntur olea, solutione flava turbida: Oleum autem spissius paulo tardius ac minori copia solvitur, quam tenuius. Duabus dein portionibus horum oleorum addidi *lixivium alcalinum fixum*, in utraque eadem fere conspiciuntur, quae cum Spir. Salis Ammoniaci contigerunt, sed tardius solvitur oleum spissius, praeterea dum per $\frac{1}{2}$ horae spatium steterint solutiones, utrumque oleum expellitur e menstribus suis, iisque innatat, dum interea lixivium pelluciditatem suam plane recuperet.

EXP. VIII. Miscui *Oleum Vitrioli rect.* et oleum tenuius ad aequales circiter partes, oritur calor, vapores sulphurei producuntur, oleum paulisper inspissatur et Balsami consistentiam acquirit.

Mista autem aequali quantitate Olei Vitrioli Rect. cum Oleo Spissiore, vapores sulphurei vix apparent, calor exoritur et inspissatio, similisque Balsamus producitur. Utraque

haec Balsama solvuntur in aqua et in Vini Spiritu, melius tamen in hoc quam in illa: Si vero solutioni spirituosae addatur oleum Tartar. per deliquium, oritur effervescentia, et statim solutio mutatur in massam solidam fuscam, offam referentem: hoc non ita accidit in solutione aquosa.

EXP. IX. Combinationem quoque feci horum oleorum cum *Spiritu Nitri fumante*, itaque

A. Olei tenuioris, destillationis ope acquisiti, dr. ij. affudi aequalem portionem Spir. Nitri fumantis, strepitus, displosio, fumus densus, ruber, et vehemens ebullitio quidem producebantur, nulla autem continebat inflammatio.

B. Eadem locum habebant cum simili quantitate olei spissioris et Spir. Nitri fumantis, sed omnia tamen paulo mitiora erant.

C. Eidem quantitati olei tenuioris affusa aequalis portio Olei Vitrioli rectific. et Spir. Nitri fumantis momento citius vehementem producit inflammationem ac dissectionem materiae.

D. Idem tentatum cum oleo spissiore non successit, sed eadem tantum observata fuerunt phaenomena, ac in B. paulo tamen fortiora.

EXP. X. *Spiritus salis Acidus* oleum tenuius satis bona copia solvit, olei autem spissioris aliquid, sed non multum, dissolvit, hisce solutionibus addito spiritu Salis Ammoniaci, praecipitatio obtinetur olei colore aurantio turbido.

C A P U T IV.

EXAMEN RESINAE ELASTICAE AD MENSTRUUA.

Postquam vidimus, quomodo se habeat Resina Elastica ad Aërem, Aquam Ignemque, nunc videndum erit, quomodo se habeat ad varia Menstrua: in applicatione autem Menstruorum eum ordinem servabimus, ut primo inquiramus quid in Resinam valeant Acida, dein Alcalia, tum Saponacea, posthaec Media, postea Spirituosa, denique Oleosa, tandem Varia alia; videamus itaque, quid faciant

I. MENSTRUACIDA.

Acidum Vitriolicum.

EXP. XI. *Die 26. July 1779.* dr. j. Resinae Elast. affudi Olei Vitrioli rectificati unc. j. Statim coloris mutatio oritur et oleum Vitrioli ex limpido fit fuscum, parum spissescit, leniter intumescunt Resinae frustula: Vapores prodeunt sulphurei volatiles.

27. *Ejusd. Mensis.* Jam profundius adhucdum tingeretur oleum, colorem enim ex rubro nigrum induit, frustula magis sunt nigra et erosa, quam antea.

3. *Aug.* Jam omne fere oleum in se susceperant Resinae frustula, ideoque de novo affudi unc. j. Ol. Vitrioli rectificati.

13. *Ejusd.* Iterum omne oleum fuit absorptum, quapropter denuo unc. j. olei Vitrioli addidi. Statim oleum affusum tinctum fuit colore ex rubro nigricante: tum vero dimidium hujus liquidi separavi: remanentem autem liquidi copiam, una cum frustulis Resinae nondum dissolutis, leni igni exposui, post semihoram obtinui solutionem nigram, quae, dum adhuc calebat, leni concussione insigniter spumescebat, odorem fortissimum Sulphureum spargens.

Sic duplicem acquisivi Resinae Elasticae in Acido Vitrioli concentrato solutionem, alteram sine igne, alteram cum igne paratam. Harum jam proprietates sunt sequentes.

Solutio *cum igne* parata per aquam destillatam turbatur, pulvisque niger ex ea praecipitatur, qui pulvis neque in aqua, nec in Oleo Tartari per deliquium, aut Spiritu Salis Ammoniaci cum Sal. Tart. parato solvitur.

Eadem solutio per Spiritum Vini rectificatum turbatur, oriturque praecipitatio pulveris nigri.

Eandem solutionem Oleum Tartari per deliquium turbat, et ex ea expellit resinam sub forma pulveris grisei.

Spiritus Salis Ammoniaci cum Sal. Tart. par. illam turbat, et praecipitationem pulveris nigricantis producit.

Per Spirit. Sal. Ammon. c. Calc. par. huic solutioni affusum turbatur, ingens ebullitio, calor, vaporesque albissi-

mi producantur, ac praecipitatio sub forma grumulorum nigrorum.

Solutio *sine igne* facta per additam aquam destillatam turbatur, et Resina ex ea expellitur sub facie pulveris subrubelli.

Eandem quoque turbat Spiritus Vini rectificatus, et praecipitationem pulveris ex fusco cinerei producit.

Per Ol. Tartar. p. del. turbatur haec solutio, fitque praecipitatio pulveris albi.

Spir. Sal. Ammon. c. Sal. Tartari solutionem hanc turbat, et ex ea expellit Resinam forma pulveris ex nigro purpurei.

Spir. Sal. Ammon. cum Calce par. illam quoque turbat, ingentem producit ebullitionem, calorem, ac praecipitationem flocculorum purpurascentium.

Quum jam Resina facillime in Acido Vitrioli concentrato dissolveretur, tentavi, utrum etiam solveretur in acido illo dilutiori, itaque

EXP. XII. Immisi in Vitrum quintuplo capacius unc. β . Ol. *Vitriol. Rectif.*, aquae purae unc. $i\beta$. et Resinae Elasticae gr. xx., licet autem haec miscela diutissime steterit, nulla contigit mutatio, ubi vero ad ebullitionem perducta fuerit, eroditur Resina, colorque liquidi nigrescit, nulla tamen subsequitur dissolutio, nisi prius abundans humidum fuerit difflatum, atque adeo Acidum tantum concentratum, quantum ante additionem aquae fuerat.

Acidum Nitrosum.

EXP. XIII. Immisi in urinale purum ac siccum dr. j. Resinae Elasticae, in frustula discissae, addidi unc. j. *Spir. Nitri fumant.*. Statim ad contactum horum ingens motus, calor et vapores ruberrimi producantur, qui copiosissime prodeuntes insignem Acidi jacturam fecerunt, adeo ut, cessantibus his motibus, vix dr. $i\beta$. liquidi superfuerit, illud vero erat coloris intense flavi, Resina in initio fuit emollita, postea tamen eam longe duriores, ac crusta flava quasi salina obsessam inveni.

Sic duplex ex hoc processu acquisivi productum, alterum fluidum, nempe solutionem parvisima copia; al-

terum solidum, nempe crustam flavam, cujus dotes demonstrant, esse Resinam Elasticam per acidum nitrosum erosam, omnes enim habet proprietates, quas habet Resina in Sp. Nitri fum. soluta, ac per aquam ex eo expulsa, de qua mox plura videbimus.

Ne vero tantum fiat Spiritus Nitrosi dispendium, sequenti methodo institui Resinae solutionem.

Immisi scil. unc. iv. Spiritus Nitri Fumantis in Vitrum capacius, eique ita adaptavi epistomium vitreum, ut maximae parti vaporum exitum denegaret, non tamen exacte clauderet vasis orificium; jam huic Spiritui immisi pauca Resinae Elasticae frustula, quae eroduntur et post breve tempus solvuntur, quibus solutis novam portionem Resinae addidi, sic sensim circiter dr. iij. Resinae fuerunt solutae absque magno illo tumultu, jactura quoque longe minor fuit, nam ex dicta quantitate Spiritus et Resinae acquisivi solutionem saturatissimam aurantii coloris, pondere unc. iij.

Hujus solutionis sequentes sunt proprietates.

1^o.) Aqua destillata addita turbidam et flavam reddit eam et praecipitationem produxit flocculorum flavorum, quos ope chartae emporeticae separavi, sic acquisivi aquam flavescens, quae adhuc aliquid Resinae continebat, etenim lixivium alcalinum ei additum colorem ejus flavum in rubrum mutavit, qui color affuso acido denuo in flavum fuit versus: Flocculi autem et crusta illa flava, de qua modo mentionem feci, sequentes monstrarunt proprietates.

α) In aqua non dissolvuntur.

β) In Spiritu Vini Rectif. dissolvuntur, majori tamen copia si caleat, quam si frigeat, Spiritus, hujus solutionis color est flavus; huic addita aqua Resina expellitur.

γ) In Alcalicis Fixis & Volatilibus solvuntur facile, solutio est profunde rubra, huic solutioni Acidum Vitrioli additum effervescentiam, spumamque copiosissimam producit, color vero liquoris in citrinum vertitur, nulla tamen obtinet praecipitatio.

δ) In Oleo Vitrioli Rect. solvuntur, non tamen in illo aqua diluto.

ε) Flocculi hi, ubi in vase vitreo vel figulino lenissimo imponantur igni, mox fluunt, leniter ebulliunt, ac uno quasi ictu & cum strepitu quodam emittunt vaporem densum, non tamen inflammantur, sed in carbonem nigerrimum vertuntur.

2°. Spiritus Vini rectificatus non praecipitat, verum diluit tantum hanc solutionem.

3°. Solutioni huic Ol. Tartar. p. deliquium, Sp. Sal Ammoniaci cum Sale Tartari & illum cum Calce viva paratum addidi, ab omnibus his oritur effervescentia, & Resina sub forma flocculorum flavorum expellitur: praeterea statim, ac quis ex his alcalinis liquoribus attingat solutionem, color fit ruber, pellucens, qui tamen momento citius per concussionem evanescit, nisi plus alcali addatur, quam ad saturationem acidi requiritur, tunc enim Resina Elastica, prius praecepta data sub forma flocculorum flavorum, iterum resorbetur, solviturque in alcalicis quibuscumque, tumque producitur solutio ruberrima, quae solutio pro lubitu aqua potest dilui absque turbatione.

4°. Huic solutioni si Oleum Vitrioli Rectif. addideris, oriuntur pauci vapores albi nitrosi, nulla tamen effervescentia & praecipitatio; sed color solutionis in flavum pelluentem mutatur.

5°. Spir. Salis Marini huic solutioni additus effecit praecipitationem flocculorum flavorum.

6°. Solutionem saturatissimam per 30 circiter dies in vitro rite clauso seposui, quo spatio elapso, in fundo vitri inveni Crystallos teneras, proxime ad figuram Rhomboideam accedentes: hae jam Crystallosi succos Vegetabilium coeruleos reddunt purpureos, quod tamen videturtribuendum acido nitroso extus illis adhaerenti, [crystallos enim rite abluere nimis parca earum copia vetuit.] Hoc confirmatur eo, quod neque cum Alkali Fixo aut Volatili effervescentiam, neque Mercurii Subl. corros. in aqua soluti praecipitationem produxerint.

7°. Saturatissimam vero solutionem, ex qua Crystallos praedictae sponte sua elapsae fuerant, igne leni evaporavi ad mellis fere consistentiam, i. e. ad remanentiam $\frac{1}{3}$ partis:

tumque quiete seposui vitrum per aliquot dies, quo temporis lapsu cryſtalli apparuerunt minores, ejusdem naturae ac illae, quae sponte fuerunt elapsae.

Quum in praecedentibus vidimus, Resinam Elasticam non solvi in Acido Vitrioli, nisi concentratum fuerit illud acidum, videndum erit, utrum eodem modo res sese habeat cum Acido Nitroso.

EXP. XIV. *Die 26. July 1779.* dr. j. Resinae Elasticae addidi unc. iß. *Aq. Fortis Venalis.*

3. *Aug.* Aq. fortem non coloratam, frustula Resinae non intumefacta, sed externe fissa et colorem flavum habentia inveni, interne tamen nigredinem suam servarunt: durities eorum valde aucta est, adeo ut ad vitrum tangentia sonitum quasi lapillulorum edant: striae a stratis resinosis productae pulcre conspiciuntur.

13. *Ej.* Leni colore citrino tineta apparet Aq. fortis; nullaque alia facta fuit mutatio, dum ad diem 8. *April.* 1780. absque igne steterit miscela.

Postquam autem igni modico, scilicet cineribus calidis, hanc miscelam exposuerim, magis coloratur Aqua fortis, frustula Resinae, licet non fuerint emollita, spongiosa tamen, parvisque pertusa foraminulis, copiosasque bullulas aëreas sibi adhaerentes monstrantia, apparent; sic tandem diuturnioris digestionis ope acquisivi solutionem flavam pelluentem.

Eodem etiam modo acquisivi solutionem Resinae Elasticae in Spiritu Nitri fumante triplo aquae diluto.

Hic iterum differo ab ACHARDSIO, qui in *Exp. suo XII.* frustulum Resinae coxit in Spir. Nitri concentrato, non tamen fumante, eo cum effectu, ut, dum omnia fuerint refrigerata, Resinam viderit externe erosam et in flavam fragilissimam substantiam mutatam: interne vero immutatam mansisse et omnem suam elasticitatem conservasse testatur.

Redeamus ad solutiones nostras R. E. in Acido nitri debilitato, utraque solutio sequentes dotes habet.

1°. Per Aquam additam diluuntur et leniter turbantur.

2°. Cum oleo Tartari per deliquium, effervescentia; color turbidus intenso flavus producitur.

3°. Idem facit Spir. Sal. Ammoniaci cum Sal. Tart. paratus.

4°. Spir. Sal. Ammoniac. c. Calce par. solutionem Resinae Elasticae in aqua forti turbat colore intenso aurantio, solutionem vero in Spir. Nitri diluto colore flavo.

5°. Idem est effectus, ubi Liquor Alcalinus Phlogisticus additur, praeterea effervescentia producitur.

In omnibus his post moram aliquam praeceptis datur pulvis flavescent: ex illa autem solutione, quae per Spir. Nitri dilutum peracta fuit, sponte sua etiam elabatur pulvis albus.

6°. Spir. Vini rectificatus diluit, non vero turbat solutiones.

7°. Oleum Vitrioli nullam notabilem solutionibus mutationem infert.

8°. Spir. Salis Marini leviter turbat solutiones.

Acidum Salis.

EXP. XV. Conjunxi dr. j. Resinae Elasticae et unc. j. *Spir. Salis Marini*. Licet haec miscela per plures septimanas frigide steterit, nulla tamen subsecuta fuit solutio, ne quidem acidi aut Resinae color mutatus fuit. Protracta vero digestionem calida, aliquid, non quidem multum, de Resina solutum fuit, color Spiritus Salis idem est ac ante solutionem.

Haec solutio sequenti modo sese habet.

1°. Aqua pura illi affusa diluitur, levissima tamen exorta lactescentia.

2°. Per Spiritum Vini rectific. diluitur, nec turbatur.

3°. Per Alkali Fixum color mutatur in rubrum, pulvere copioso ex flavo cinereo fundum petente.

4°. Per Alkali Volatile color in initio fit ruber, pulvis fuscus praeceptis datur, quo expulso, color liquidi pellucidus evadit.

5°. Spir. Sal. Ammon. c. Calce illi additus colorem mutat eodem modo ac No. 4.

6°. Spir. Nitri fum. triplo aquae dilutus nil in illam solutionem efficere videtur, verum illam tantum diluit.

Aqua Regia.

EXP. XVI. Miscui scr. j. Resinae Elasticae cum unc. j. *Aquae Regiae*; licet per 7 menses frigide steterit miscela, nulla contigit in Acido aut in Resina mutatio, multo minus solutio.

Postquam vero ignem applicaverim huic miscelae, sensim sensimque eroduntur Resinae frustula, colorem acquirunt ochraceum, coalescunt, bullulaeque copiosae aëreae in illorum superficie spectantur, color liquoris vix mutatur.

Sic tandem taediosa satis digestionem aliquid de Resina solvitur: Solutio haec pellucida flava per Aquam et Spir. Vini diluitur, nec praecipitatur; per Alkali vero Fixum levis lactescentia producitur, parvaeque pulveris flavescentis copia fundum petit.

Acetum.

EXP. XVII. *Aceti destillati* unc. j. et Resinae Elasticae dr. j. frigide per plures menses steterunt, quin et per longum satis tempus in Aceto hoc cocta fuit Resina, non tamen obtinui solutionem, nec ullam quidem mutationem in Aceto aut Resina accidisse observavi, nisi quod Resinae color sit magis cinereus, durities aucta, extensilitas vero imminuta.

Eundem eventum expertus fui, ubi sumserim Acetum concentratissimum, methodo *Westendorffiana* paratum, illa tamen cum differentia, quod in hoc color Aceti fiat intense fuscus.

II. MENSTRUUA ALCALINA.

Alcalia Fixa.

EXP. XVIII. Dr. x. *Ol. Tartari per deliquium* addidi dr. j. Resinae Elasticae; licet autem per 7. menses steterit, quin et satis diu cocta fuerit haec miscela, nil tamen de Resina fuit solutum.

EXP. XIX. *Liquorem Alcalinum Phlogisticum* eodem modo adhibui ac praecedens Oleum Tartari, effectu haud

diverso, Resinae autem frustula colorem induerunt variegatum.

EXP. XX. Dr. j. Resinae cum unc. j. *Liquor. filicum* solito conjunxi more, eventus idem fuit ac in Exp. XVIII.

EXP. XXI. Miscui *Lixivii Saponariorum* unc. j. cum dr. j. Resinae Elasticae, lixivii color paulo magis fuscus evadit. Resina indurata griseum variegatum colorem induit. Solutionem protracta coctione obtinere non potui.

Alcalia Volatilia.

EXP. XXII. *Spiritus Salis Ammoniaci ope Salis Tartari paratus* cum Resina coctus nullam huic mutationem induxit, nisi quod color ejus in cinereum fuerit versus, color quoque Spiritus subflavus et minus pellucens fuit redditus.

EXP. XXIII. Miscui unc. β. *Spirit. Sal. Ammoniaci cum Calce viva parati* cum dr. j. Resinae Elasticae; post bi-horium jam color Spiritus fit flavescent, dein ruber, denique fuscus; parumper intumescunt Resinae frustula, grisea evadunt ac magis opaca, striae resinosae pulcre visui sese obferunt: nulla tamen solutio secuta fuit, licet per plures dies calide tractaverim hoc mixtum.

EXP. XXIV. Dum Resinam ad ignem tractaverim cum *Spir. Cornu Cervi Rect.*, idem fuit eventus ac in Exp. XXII.

III. MENSTRUUA SAPONACEA.

EXP. XXV. Sumsi portionem *Solutionis Saponis Veneti et Nigri*, ac in singulis horum aliquid Resinae satis diu coxi, quae tum colorem griseum acquisivit, nulla praeter hanc inducta mutatione.

EXP. XXVI. Cum *Melle Massiliensi* etiam conjunxi Resinam Elasticam, sed sive frigide, sive calide tractaverim hanc miscelam, nullam hoc modo solutionem efficere potui.

IV. MENSTRUUA SALINA.

EXP. XXVII. Combinavi etiam Resinam cum *Solutionibus Salium praecipuorum*, nempe

Salis Tartari Vitriolati.

— Mirabilis Glauberi.

Salis Ammoniaci Secreti Glaub.

— Nitri.

— — Cubici.

— — Flammantis.

— Marini.

— — Regenerati.

— Ammoniaci.

— Tartari Tartarifati.

— — Solubilis.

— Terrae Foliat. Tartari.

— Polychrest. de Seignette.

— Sedativi Hombergii.

— Aluminis.

— Boracis.

— Vitrioli Martis.

Has miscelas per longum satis tempus coxi cum Resina, cujus color in plurimis mutatur, in quibusdam griseus evadit, in nonnullis variegatus, in aliis non mutatur, striae quoque a stratis Resinae productae egregie spectantur, nulla autem praeter haec a salibus memoratis Resinae mutatio fuit inducta.

EXP. XXVIII. Miscui unc. j. *Sp. Mindereri* cum dr. β . Ref. El., nullam mutationem observavi, nisi quod Resina colorem induerit griseum.

MENSTRUUA SPIRITUOSA.

EXP. XXIX. Frustula nonnulla Resinae immisi in vitrum, dr. vj. *Alcoholis vini* continens, satis diu frigide illud seposui, tumque inveni Resinam colorem variegatum induisse, strataque ejus pulcre conspici, reliqua non mutata: quapropter per plures septimanas digestionem calidae tradidi hanc miscelam, et alcohol cum Resina ad ebullitionem perduxim, leviter tingitur alcohol, nulla tamen subsequente solutione, imo et nulla notabili mutatione.

Eundem eventum expertus fuit Cel. MACQUER, licet in Machina Papini cum Alchhole tractaverit Resinam hanc.

EXP. XXX. Combinavi Resinam cum *Liq. Anod. Min. Hofmanni*, et cum *Spiritu Salis Dulci*; in singulis horum per longum satis temporis spatium Resinam coxi, eventus

fuit similis in utroque, Resina enim non emollita fuit, sed colorem assumpsit ex flavo albicantem, liquores vero levi flavedine fuerunt tincti.

EXP. XXXI. Miscui unc. β . *Spir. Nitri Dulcis* et Scr. j. R. E., post 8. dies Resinae color variegatus, Spiritus vero non mutatus fuit. Caloris vero ope acquisivi Tincturam rubicundam, Resina valde emollita fuit, non tamen dissoluta.

Sumsi et, loco Spiritus hujus, illum Spiritum Nitri Dulc., quem paravi affundendo Ol. Tartar. p. Deliq. liquori remanenti a praeparatione Aetheris Nitrosi, et addidi nonnulla Resinae frustula, quae eodem modo fuerunt emollita, et multum de sua elasticitate ac consistentia amiserunt, color autem Spiritus fit saturate ruber, pellucens, sensimque intenditur, ac tandem ex rubro nigricans redditur.

EXP. XXXII. Jam ordo requirit, ut transeamus ad celebrem illam Resinae Elasticae solutionem, quae fit ope *Aetheris Vitriolici*, in quo tentamine necesse erit, ut breviter indicemus modum Naphtham hanc ita parandi, ut huic scopo sufficiat: igitur sequenti modo instituatur operatio.

Rx. *Alcoholis purissimi* ℥vj.

Partitis vicibus addatur aequalis portio *Olei Vitrioli rectificatissimi*, tumque immittantur in retortam puram ac siccam, applicetur vas recipiens, quo probe luto clauso, leni igne fiat ex B. A. destillatio, a qua desistendum, ubi vapores albi et striae apparere incipiant, quibus apparentibus dematur recipiens, in quo tunc invenietur liquor fragrantissimus ad pondus circiter unc. XLIX, huic affundatur aliqua Ol. Tartari per deliquium quantitas, ut sic absorbeatur acidum, quod forte in excipulum transiit; quo facto, immittatur liquor in retortam puram siccam, et eodem modo sed lenissimo igni fiat destillatio, abstrahantur circiter unc. IX. Liqueoris Aetherei, qui satis bonus est, sed scopo nostro nondum sufficit: sumsi enim dr. vj. hujus Aetheris, ac in vitrum epistomio vitreo, cera et vesica fuilla clausum immisi; addita Res. Elasticae dr. j. per 7. menses hoc servavi, aliquo modo tingitur aether, Resina albicat, leviter intumescit, non tamen solvitur; et licet leni igni imposuerim

vitrum et per plures horas coxerim Resinam in hoc Aethere, non tamen successit solutio.

Itaque altera destillatione hujus Aetheris rectificatio est instituenda, cujus formula sequens est.

Rx. *Aetheris praecedentis unc. IX.*

Immittantur in retortam minorem siccam, applicato excipulo, luto pingui rite clauso, substruatur ignis lenissimus, sufficit frustulum prunae digiti longitudinem habens, ac hoc modo fiat destillatio. Prima Uncia transeuns separatur et servetur titulo Aetheris rectificatissimi, Sequens autem Aetheris Uncia quoque separanda est, illa enim plerumque resinam solvere valet.

Jam gr. XX. Resinae Elasticae addidi unc. β . Aetheris hujus rectificatissimi, mox intumescit Resina, opacatur, valde emollitur, absorbetur liquor, non tamen sufficit haec aetheris quantitas, addidi itaque ejusdem aetheris dr. ij, quo facto post paucas horas soluta fuit resina, solutio est alba, spissa, opaca, mucilaginem referens.

EXP. XXXIII. 15. *Aug. 1779.* immisi in vitrum rite clausum unc. j. *Aetheris Nitrosi* et dr. j. Resinae Elasticae, post paucas horas frustula Resinae intumescencia albicant, liquor levem colorem citrinum habet.

3. *Janr. 1780.* Sensim sensimque liquor intensioris fit coloris, frustula nunc quoque flavent.

28. *Mart.* Quum jam per 7 menses nulla mutatio facta fuerit, vitrum aperui, inveni frustula colore intenso flavo tincta, externe parum emollita, interne fragilissima.

Liquor autem continet portionem Resinae solutam, quod docet color flavus, et praecipitatio, etenim si guttae aliquot in aquam immittantur, post pauca minuta in superficie aquae innatat pellicula flavescens, quae si dematur, est vera resina, omnem tamen molliem, extensibilitatem ac elasticitatem amisit, estque valde dura et fragilis.

Die 2. April. 1780. Alteram portionem Aetheris Nitrosi et Resinae, quam etiam per 7 menses servaveram, in vitrum amplissimum transfudi, et vitrum vesica fuilla rite clausum igni imposui, adeo ut per tres dies leniter ebulliret, tumque inveni Resinam ex parte in aethere dissolutam, ex parte vero mutatam in materiem fragilissimam vix cohae-

rentem, quin et inter digitos in pulvem terendam, quae puls cum Aqua Calida in mortario trita pastam quandam cohaerentem plus minusve tenacem refert, ubi autem haec pasta fuerit frigefacta, vix amplius cohaeret, sed inter digitos est friabilis, in Spiritu Vini rectificato maxima ex parte solubilis.

Solutio autem, quam hoc modo ex aethere nitroso obtinui, erat spissa, turbida, coloris aurantii saturationis, post moram vero 12. horarum pars resinae sub forma mucii flavi fundum petit, supernatante liquore pellucido, pulcre rubro.

Haec solutio, eodem modo, uti vidimus in solutione absque calore acquisita, per aquam affusam dimittit Resinam, quae tunc tenacitatis et elasticitatis experts insignem subiit mutationem.

VI. MENSTRUA OLEOSA.

Videndum jam est, quid Olea in Resinam Elasticam efficere valeant, et quidem primo Olea Pinguia, dein Essentialia.

Nobiliss. FRESNEAU primus omnium Resinae Elasticae solutionem fecit, et quidem in Ol. Nucum, videturque in illa opinione fuisse Vir. Clar. illud Oleum unicum esse Resinae hujus Menstruum, sed, uti videbimus, immerito.

Olea pressa.

EXP. XXXIV. die 26. Julij 1779. Unc. j. *Ol. Olivarum* et dr. j. Resinae Elasticae miscui:

3. *Aug.* Sensim magis magisque intumescunt Resinae frustula, quae jam sunt coloris cineritii, subpellucidi: olei color non mutatur. 6to nil amplius fuit mutatum, quapropter ignem adhibui, et sic diuturnioris digestionis ope acquisivi solutionem fuscam, opacam.

EXP. XXXV. Idem accidit ubi *Ol. Amygdal. Dulc.* unc. j. et Resinae Elasticae dr. j. conjunxerim.

EXP. XXXVI. *Ol. Papav.* unc. j. et gr. X. R. E. miscui: Oleum, quamdiu friget, nullam in resinam potentiam habet, taediosa vero digestionem calida, aliqualis obtinetur solutio, colore profunde fusco.

EXP. XXXVII. *Ol. Lini.* unc. j. et Resinae Elasticae dr. β. combinavi, frustula Resinae magis inagisque intumescencia subpellucet, non tamen solvuntur, dum frigent, adhibito autem calore ac diuturniori digestionem acquiritur solutio fusca spissa.

EXP. XXXVIII. Unc. β. *Ol. Ovorum* et dr. j. Resinae Elasticae miscui licet per 7 menses absque calore fuerint seposita, nulla tamen contigit solutio, frustula vero notabiliter intumuerunt, igne adhibito acquisivi dissolutionem fuscam pellucidam.

EXP. XXXIX. *Ol. Ricini* Unc. β. addidi Resinae Elasticae gr. XX. Frigide nullam subierunt mutationem, neque protractiori digestionem calida, quin et ebullitione per tri-duum fere continuata potui obtinere solutionem, e contrario vix et ne vix quidem fuit mutata Resina.

Olea stillatitia.

EXP. XL. die 26. *Julii* 1779. Immisi in Vitrum, sex circiter Uncias capax, dr. ij. Resinae Elasticae et Unc. j. *Ol. Therebinthinae Venalis*, seposui absque calore, de tempore in tempus vas concussi, sic sensim omne oleum in se trahunt frustula Resinae, intumescunt, fiunt pellucida, quasi cornea; postquam per 5 horas stetit miscela, omne oleum fuit absorptum, quapropter novum oleum Thereb. ad Unc. j. addidi.

27. *Ej.* Iterum oleum fuit absorptum. Resina emol-lita, perfecte referebat gluten in aqua calida maceratum; addidi dr. vj. *Ol. Thereb.*

28. *Ej.* Omne rursus liquidum fuit absorptum, frustulaque Resinae magis adhuc expansa integrum replebant vitrum.

29. 30. 31. Ejusdem nil mutatum.

1. *Aug.* dr. iij. hujus massae cum dr. VI. *Ol. Thereb.* miscui et frigide seposui, solutionem tamen non obtinui, licet hoc modo ad diem 8. *April.* 1780. servaverim.

Illud autem quod reliquum erat igni exposui, sicque diuturniori Coctione bona resinae copia fuit soluta, solutio fusca est et saturatissima, saltem frigore iterum expellitur

Resinae pars sub forma mucis flavescentis, tumque liquidi color pellucidus et intense flavus evadit.

Eundem effectum expertus fui, dum loco Venalis The-rebinthinae Olei, adhibuerim Oleum ejusdem purissimum, a me destillatione paratum, quodque erat multo volatilius et subtilius.

EXP. XLI. 26. *Julii*. 1779. Conjunxi *Olei Foeniculi* Unc. j. et dr. j. Resinae Elasticae.

Postquam haec circiter per quadrihorium conjuncta fuerint, Resina intumescit, absorbetur liquor: iterum addidi Unc. j. Ol. Foeniculi: hoc autem die 27. *ejusd.* plane fuit consumtum, frustula magis sunt intumefacta, emollita, opaca ac grisea, striae a variis Resinae stratis productae pulcre conspiciuntur.

28. *Ejusd.* ad 1. *Aug.* in eodem statu, addidi Unc. β . Olei Foenic.

3°. *Ejusd.* Jam oleum non amplius absorberi videtur.

9°. *Ejusd.* nulla amplius mutatio accidit, quapropter miscelam hanc igni exposui, sicque brevi Resina plane fuit soluta, solutio fusca turbida ac spissa.

Licet autem Resina per plures menses in sufficiente hujus Olei Foenic. quantitate frigide fuerit macerata, nulla tamen absque calore adhibito contigit solutio.

EXP. XLII. Unc. β . Olei, quod ex *Seminibus Anisi* destillatione accepi, miscui cum Scr. j. Resinae elasticae.

Post biduum omne fere oleum fuit absorptum, frustula albicantia intumefacta pellucunt: Vitrum autem hanc miscelam continens igni exposui, sicque brevi post acquisivi solutionem fuscam, sat spissam.

Idem et contigit, dum *Oleo Anisi Venali* usus fuerim, in hoc tamen paulo tardius acquiritur solutio.

Tentavit etiam Cl. ACHARDS solutionem Resinae in Oleo hoc efficere, sed frustra, nullam enim, inquit, notabilem potentiam in Resinam Elasticam habet Anisi Oleum, nihilque de ea dissolvit: ita quoque de Oleo Papaveris et Lini testatur quod Resinam emolliant, vix tamen solvant, haec tamen cum Experimento nostro XXXVI. et XXXVII. minus congruunt: videtur sane Clarissimus Auctor citius, quam par est, ab experimentis suis destitisse, nec dubito,

quin, si digestionem illam longius protraxisset, solutionem satis bonam acquisivisset.

EXP. XLIII. 4^o. Aug. 1779. miscui Unc. β . *Ol. Cerae* et dr. β . *Resinae Elasticae*.

5. *Ejusd.* Senlim omne oleum fuit absorptum, frustula intumefacta ac pelluentia colorem induunt fuscum.

18. *Ejusd.* Quum jam valde intumefacta ac emollita fuerint frustula, portionem hujus mixti in mortario marmoreo aliquamdiu trivi, eo cum effectu, ut acquisiverim massam laevem, aequabilem, tenacem, viscidam, balsami consistentiam habentem.

19. *Ejusd.* reliquam vero partem igni apposui, post breve digestionis tempus Resina integre soluta fuit, solutio fusca, opaca, sat spissa.

EXP. XLIV. miscui Unc. β . *Ol. Succini rectific.* cum \mathfrak{z} . *Resinae Elasticae*, brevi post Resina valde intumescit, fitque pellucida, Striasque Resinosas pulcre monstrat; maxima pars Olei absorbetur, non tamen solvitur Resina licet per 7 menses absque calore quieverit, ubi autem per sesquihoram ignis fuerit applicatus, solutio obtinetur fusca, pellucida.

EXP. XLV. miscui portionem *Resinae Elasticae* cum sufficiente quantitate *Ol. Cajapouti*, *Camphorae*, *Cardamomi*, quae Olea ex Indiis Orientalibus ad nos advehi solent quorum ergo puritati non multum fidere licet: in singulis his oleis resina emollitur, intumescit, fitque pellucida, olea absorbentur, non tamen solvitur nisi juvante calore, tunc vero acquiritur solutio spissa, rubra vel fusca.

VII. MENSTRUUA VARIA.

EXP. XLVI. Conjunxi Unc. j. *Ol. Petrae Venalis* et dr. ij. *Resinae Elasticae*.

Eodem prorsus modo res sese habuit cum hoc ac cum *Ol. Therebinth*; vid. EXP. XL. Solutio autem fuit fusca, opaca, valde spissa.

Eundem expertus fui eventum, ubi loco Olei Petrae sumserim *Naphtham Fossilem*, paulo tamen citius solvitur resina.

EXP. XLVII. Eadem Resina cum *Venalibus Terrae et Spicae Oleis* cocta, taediosa satis digestionem, aliquali ex parte solvitur.

EXP. XLVIII. Miscui gr. x. Resinae Elasticae dr. i. *β. Ol. Animalis Dippelii*, color frustulorum fit griseus, liquor paulum turbatur: postquam per 3 dies Calore Atmosphaere steterit miscela, inveni oleum colore rubello tinctum, frustula parum emollita, non tamen dissoluta, quapropter ignem applicavi, sic mox liquoris color intenditur, fit rufus, nigrescens, quin et niger, ubi autem per triduum leniter ebulliverit, frustula inveni emollita nigra, ubi vero haec cum aqua calida terantur in mortario, coeunt, aliquam tenacitatem et elasticitatem monstrantia.

Oleum autem valde nigricat, nulla tamen indicia, aliquid de Resina dissolutum fuisse, apparent.

EXP. XLIX. Miscui Scr. j. Ref. El. cum Unc. *β. Ol. tenuioris ac primi* per destillationem ex Resina Elastica [Exp. V.] acquisiti.

Miscui quoque eandem Resinae quantitatem cum Unc. *β. Ol. spissioris* ex eadem destillatione.

In utroque post biduum Oleum fere plane fuit absorptum, frustula intumefacta pellucunt: Sic digestionem calida aliquot dierum acquisivi solutiones intense fuscas, cum Oleo vero Primo solutionem obtinui fluidiorem, magisque pelluentem, quam cum Oleo Secundo.

EXP. L. die 1. Septembris 1779. immittendo bonam Camphorae partem in Vitrum sufficientem aquae fortis copiam continens, acquisivi Unc. ij. *Olei Camphorae*. Quas, in 2 partes aequales divisas, in vitra bina 3plo capaciora ac epistomiis vitreis instructa immisi, sicque alterum vitrum quiete seposui, addidi autem Oleo in altero Vitro contento dr. *β. Resinae Elasticae*, utrumque vitrum vesica fuilla rite clausum fuit.

2^o. *Ejusd. Mens.* Oleum flavo colore tingitur, frustula Resinae flavescentia, in unam quasi massam coalita, in superficie durissima, in interioribus minus dura, exterius quoque crusta quadam Camphorea obducta fuerunt, pars quoque Camphorae praecepta datur.

10°. *Ejusd.* De die in diem magis exaltatus fuit olei color, qui jam fere aurantius est, sensim plus de Camphora praeceptus datur, quod partim in fundo sub forma pulveris profunde flavi conspicitur, partim Resinae et collo vasis sub forma crustae salinae flavae adhaeret.

13°. *Ejusd. mensis* pergit Camphora praecipitari, ac, licet sumserin vitrum instructum epistomio vitreo, orificium illius exacte claudente, crusta tamen Camphorea extra orificium vasis expulsa vesicam et superiorem ac exteriorem epistomii partem obtegit.

17°. *Ej. ad 15um Octobris* Licet de tempore in tempus vitrum hoc ejusque epistomium mundaverim, dummodo per tres dies steterit, nova iterum crusta superiori ac exteriori vitri parti nec non epistomio superius adhaerescit, donec tandem omne fluidum fuerit expulsum, massa solida friabili flava in vitro remanente, frustula vero Resinae extus erosa, flavo colore tincta, interne splendentia, sunt multo fragiliora, quam antea fuere. Massam illam Camphoream friabilem aliquam Resinae partem in se continere docet color flavus, dum enim illam in Spiritu Vini rect. igni exposuerim, facile fuit soluta, color solutionis intense flavus est.

23. *Mart. 1780.* Alteram autem portionem Ol. Camphorae, quam die 1. *Sept.* paravi, nullam subiisse mutationem vidi, tam quoad colorem, quam quoad fluiditatem.

Itaque, additis gr. XV. Resinae Elasticae, Oleum hoc immisi in vitrum 6plo capacius, illudque leni igni exposui, mox ebullire incipit, solviturque Resina, dum per horam ignis fuerit applicatus, tumque repperi in vitro massam flavam, friabilem, non multum a praecedenti discrepantem.

Haec jam massa in Sp. Vini rectificato caloris ope tanta copia solvitur, ut post refrigerium solidescat.

EXP. LI. Miscui dr. j. Resinae Elasticae cum *Therebinth. Venet.* Unc. j. hancque miscelam per plures dies digestioni calidae tradidi, sic sensim sensimque subtiliores Therebinthinae partes in auras avolarunt, illud, quod reliquum erat, inspissatur, colorisque fusci evadit: Resina emollita apparet; ut autem facilitetur solutio, addidi dr. j. β . Ol. *Therebinth.* purissimi, et denuo igni apposui miscelam, sic tandem bona pars Resinae fuit soluta: solutio haec *Therebin-*

thinam coctam referebat, colorem tamen magis fuscum habebat.

EXP. LII. *die 26°. July 1779.* Miscui Unc. β . *Balsf. Copaivae* cum dr. j. Resinae Elasticae.

3°. *Aug.* Sensim sensimque color frustulorum resinorum mutatur in bruneum pellucidum, eaque intumescunt; Balsamus aliquo modo, non tamen plane, absorptus fuit; addidi Unc. β . *Balsf. Copaivae*.

6°. *Ejusd.* Iterum Unc. j. Balsami addidi, sicque dimidiam hujus miscelae partem igni exposui, ac diuturnioris digestionis ope acquisivi solutionem spissam tenacem, ac in longissima fila trahendam, coloris purpurascens, Balsamum Peruvianum reterentem.

Illa autem pars, quae ignem non fuit passa, nequidem fuit soluta *die 10. May 1780.*

EXP. LIII. Miscui Unc. β . *Balsami Houpae* *) cum dr. j. Resinae Elasticae, statim ignem adhibui, sic frustula Resinae intumescunt, emolliuntur, solvuntur; solutio est fusca, opaca, spissa.

EXP. LIV. Miscui dr. ij. *Axung. Viperarum* et Scr. j. Resinae Elasticae, frigida nullam vim in resinam habet axungia, digestionis vero ope solvitur resina, atque sic massam pinguem, profunde fuscam, butyri consistentiam habentem, acquisivi.

EXP. LV. *Aquam Calcis Vivae* cum Resina Elastica ebullire sivi per aliquod tempus, color Resinae sensim variegatur, tantum autem abest, ut intumescat vel solvatur, ut potius compactior reddita videatur.

EXP. LVI. Coquendo Resinam in *Solutione Hepatis Sulphuris* nullam tamen ipsi mutationem inducere potui.

EXP. LVII. *Die 27°. July 1779.* Conjunxi Unc. ij. *Urinae recent.* cum dr. j. Resinae Elasticae.

*) Balsamum hunc, paucissimis adhucdum cognitum, ex Colonia Surinamensi nuperrime accepimus, odorem habet Balsami Copaivae, iique est simillimus, excepto, quod magis sit fluidior: Incisionis ope ex quadam arbore, ibidem *Houpa* dicta, provenit. Hic jam Balsamus egregii usus est in doloribus Rheumaticis, a frigida causa oriundis, uti in binis casibus vidit Medicus, in hac Urbe prudentissimus, mihiq. amicissimus F. I. VOLTELEN.

3°. *Aug.* Urina jam magis foetere incipit, turbatur: Resina non tumefacta, sed cineritia evasit.

16°. *Septemb.* Quum jam per 50. dies frigide steterit miscela, nulla oborta mutatione, ignem applicavi per mensem et ultra, solutionem vero, ullamve aliam mutationem, factam fuisse non vidi.

27°. *July 1780.* In eodem statu inveni omnia, licet jam per integrum annum sibi relicta fuerint frustula resinae, eandem duritiem, quin et paulo majorem habere videntur.

Atque haec sunt L. B., quae institui tentamina, quoad Resinae Elasticae dissolutionem, tentavit nonnullos alios liquiores Cl. MACQUER, tentavit paucos alios Cl. ACHARDS, horum autem experimentorum nonnulla imitandi defuit occasio, aliorum imitatio minus necessaria visa fuit, sufficiat itaque breviter illorum virorum relata indicasse:

Cl. MACQUER Resinam Elasticam solvit in *Oleo Lini cum Lythargyrio Costo*; sed ubi haec solutio exsiccat, omnem suam cohaesionem et elasticitatem amisit.

Camphoram quoque in parca Spiritus Vini quantitate solutam cum Resina hac conjunxit, pars Resinae fuit soluta, sed separata Camphora, Resina prodiit anelastica.

Lacteos nonnullorum vegetabilium *Succos* quoque applicavit Resinae Elasticae, sed frustra, nulla enim desideratae conditionis successit solutio.

Fecit et Solutionem Res. Elast. in *Oleo Therebinthinae* repetitis destillationibus supra calcem vivam ad summam volatilitatem redacto; haec tamen solutio, ubi cum spiritu vini tractetur, non plane solvitur Ol. Therebinth. in Spir. Vini Rectif. sed maxima ejus pars cum Resina mixta manet.

Cl. autem ACHARDS sequentia habet tentamina:

Frustula aliquot Resinae Elasticae posuit in vitro, in quo *Aether* erat, cujus basis erat Acidum Salis Marini: post paucas horas frustula erant valde intumefacta et alba, concutiendo plane dissolvebantur eodem modo ac in Aethere Vitriolico: si hac solutione illiniatur proplasma quoddam, diffatur Aether, remanetque Resina, eandem habens elasticitatem, quam antea habuit.

Naphtha Aceti etiam digestionis ope parum agit in Resinam Elasticam, quae non notabiliter intumescit, nec facile erat cognitu, aliquid de Resina fuisse solutum.

Oleum Cumini, testante Cl. ACHARDS plane dissolvit Resinam Elasticam, idem faciunt *Olea Essentialia Rorismarini, Nucis Moschatae, Semin. Angelicae, Myrrhae, Chamomillae; Lign. Guajaci.*

Ol. Caryophyllorum, Animale Dippelii, Lavendulae, teste eodem, emacerant, sed non dissolvunt Resinam Elasticam; *Ol. Anisi, Papaveris, Lini* eundem effectum praestant, sed de tribus posterioribus, uti vidimus, hoc minus veritati consentaneum est.

Ol. Cinnamomi, Naphthae, Melissae, Nucum etc. parum de Resina solvunt.

C A P U T V.

CONTINENS VARIA DE METHODO PRAEPARANDI INSTRUMENTA NONNULLA CHIRURGICA EX RESINA ELASTICA.

Ad ultimam properamus nostri propositi partem, nempe de methodo varia instrumenta Chirurgica ex hac Resina parandi nonnulla dicturi. Huic autem scopo, jam ab illo tempore, quo primum in Europa innotuit, Resinam Elasticam fuisse destinata nemo mirabitur, qui modo proprietates illius mirabiles, eique privas, paulo attentius consideravit. Etenim 1^o. satis magnam habet soliditatem, firmitatem ac robur, una cum mollitie et immutabilitate in calore moderato, liquoribus aquosis, spirituosis, acidis minus validis, alcalinis, mediis ac saponaceis etc. itaque resistit omnibus corporis nostri humoribus, urinae, puri, cet. hinc ex Resina hac parari possent Catheteres solidi et cavi; Cerei, ad varios viarum urinarum morbos utiles, qui in tenerrimis illis ac sensilissimis partibus absque magno incommodo relinqui possunt, longe diutius ac instrumenta ejusmodi ex metallis parata, quae partim duritie et gravitate sua incommodant aegros, partim acrimonia humorum eroduntur, sicque varias in corpore turbas excitare valent.

2do. Maxima gaudet extensilitate cum summa tenacitate et elasticitate juncta, hinc fit, ut ad varias fascias, et perizomata, partes de sede sua elapsas coercentia, optime adhibeatur, atque fasciae illae, ad omnes corporis figuras ac positiones sese accommodantes, aequabilissimam pressionem exerant.

Ut jam huic scopo inserviat Resina Elastica, illud efficiendum esset, ut

1º. Vel in regionibus Americanis Succus HEVEAE, dum adhuc lacteus ex arbore stillat, in varias redigatur formas, pro variis Instrumentis Chirurgicis ex eo parandis: hoc videntur fecisse Angli, illis enim in usu sunt varia instrumenta, nobis non ita cognita, uti Siphunculi ad clysmata infantibus injicienda, liquores nonnullos in urethram immittendos, et lace puerperarum et nutricum mammis extrahendum accommodati.

2º. Vel idem HEVEAE succus, adhuc dum fluidus, in vase clauso ad nos adferatur, ut sic Europaeus artifex optatum scopum feriat.

3º. Vel adhibeatur tale liquidum, quod, licet non dissolvat Resinam, illam tamen tantopere emolliat, quantum ad usus praedictos requiritur, dummodo liquidum illud facile a resina secedat, eamque relinquat suis proprietatibus non privatam; tale liquidum Ol. Animale Dippel. esse videtur. Vid. Exp. XLVIII.

4to. Vel adhibeatur liquidum, Resinam perfecte dissolvens, dummodo detur methodus resinam nostram ex tali liquido recuperandi iis dotibus praeditam, quibus antea fuit gavisa: Hoc jam liquidum esse Aether Frob. purissimum crediderunt nonnulli Chemicis, et quidem omnium primus hoc excogitavit Cl. HERISSANT (Vid. *Histoire de L'Ac. R. D. S.* 1763), dein Cel. MACQUER methodum suam proposuit (*Memoires* 1768), denique alii; et certe, si solvitur Resina haec in purissimo illo Aethere Vitriolico, illaque solutio aëri libero exponitur, vel, si hujus aliquot guttae infundantur aquae, tunc, diffuso menstruo, prodit resina, sub forma solida, digitis non adhaerens, tenax et Elastica, non tamen eundem tenacitatis et elasticitatis gradum recuperare, minorem quoque molliem habere videtur, quam ante

folutionem. Jam nihil facilius videretur quam, secundum propositum Cell. eorum Chemicorum, Cereos et Catheteres ex hac Resina formare, modo sufficientem quantitatem Resinae et Aetheris purissimi possideamus, sed nihil difficilius, et dubito, ullum mortalium ad hunc usque diem fecisse Catheterem ex Resina Elastica ope Aetheris Frobenii, nec credo, fore, ut umquam hoc modo acquiratur tale instrumentum debitis qualitatibus praeditum, etenim, praeter satis insigne menstrui pretium, nulla arte potest Resina ad debitam crassitiem aequabiliter extendi circa corpus quodcumque pro basi inserviens, menstruo enim citissime in auras avolante fieri nequit, quin strata resinosa fiant inaequalia et aspera, quod recte animadverit Cel. MACQUER: nonnulla praeterea nascuntur obstacula, non praevidenda, quae tamen, ubi manum operi admovemus, felicem successum impediunt. [Ceterum de methodo, qua usi sunt varii, videantur *Memoires de L'Ac. R. D. Sc. loc. cit. et Heelkundige Mengelstoffen door D. van Geffcher* pag. 376. seqq.]

Ne tamen quis credat, nimis audacter fuisse pronunciatum, scilicet fieri non posse, ut Catheteres etc. hoc modo formentur; meque illud posuisse, dum minus faustus eventus nostris tentaminibus successerit propter incuriam nostram et dexteritatis defectum: Celeber enim instrumentorum Chirurgicorum et Anatomicorum opifex, dexterissimus GOBELS eundem sortitus fuit eventum, et quanquam, secundum monita ab Expert. GESSCHERO exhibita, omnem suam curam huic rei impenderit, nullo tamen modo scopum ferire potuit *).

*) Pace Expert. GESSCHERI, dexterrimi ceterum et apud Amstelredamenses de Arte Salutari optime meriti Chirurgi, pauca hanc partem attinentia ut moneam jubet veritas: Etenim quamprimum in lucem prodierunt Cel. Viri Miscellanea Chirurgica, plures Medici ac Chirurgi, imo nonnulli nomine variorum Collegiorum Chirurgicorum, litteris ad dextr. GOBELS datis, ab eo petierunt, ut Catheteres ex Resina Elastica secundum GESSCHERI praecepta formatos ipsis transmitteret; nec mirum, expert. enim ille Chirurgus in praefatione laudatorum miscellaneorum lectoribus omnibus ideam excitat, ac si dicti Catheteres, eodem modo, uti cetera instrumenta Chirurgica, in officina Gobeliana venales prostant, vel saltem ab illo artifice parari possent; Audiamus ipsius verba: „*Dit vooruysicht* (sc. difficultas, quae

Est et altera istiusmodi instrumenta parandi methodus, a Cl. ACHARDSIO proposita, quae obtinetur Oleis vegetabilium Essentialibus: Scilicet, uti Experimentis XL — XLII. constat, R. E. satis bona copia solvitur in Oleis illis stillatiis, v. gr. Anisi, Foeniculi cet. jam haec Olea, uti satis notum est, solvuntur in Rectificato Vini Spiritu, non vero Resina nostra, si itaque solutioni Resinae Elasticae in Oleo Destillato factae addatur Spiritus Vini Rectif. solvitur oleum, remanente resina sub forma mucii plus minusve spissi, qui secundum Cl. ACHARDSIUM aëri libero expositus sensim sensimque exsiccat ac consistentiam elasticitatemque pristinam recuperat.

Dum hanc ACHARDSII methodum consideramus, illam certe Theoriae Chemicae sanissimae optime quadrare unusquisque facile videbit; et sane, si hoc modo procedentes scopum nostrum feriremus, haec methodus aliis longe praeferenda esset, tum propter simplicitatem, tum propter sumtum dispendium; in hac enim methodo sumtus exigui sunt, majori enim copia solvitur Resina in Oleo, praeterea oleum, quod ad solutionem fuit adhibitum et ope Spiritus vini abstractum, affusa aqua facile e spiritu vini expellitur, tumque iisdem denuo usibus inservire potest; dein spiritus adhibitus simplicis destillationis ope ab aqua separatur, adeoque fere nulli, saltem exigui, sunt sumtus.

Sed videamus an Theoriae Praxis respondeat. Plura itaque adhibui Olea, uti *Oleum Anisi, Foeniculi, Cardamomi,*

oritur, dum verbis exprimere conamur illud, quod ad facta magis pertinet et quod visu addiscere debemus) heeft my bewoogen, om onzen Werktuigkundigen Instrumentmaaker, den Heere ANTHONY GOBELS, aan te zetten tot het saamenstellen deeser Werktuigen, en hem hierin de noodige onderrigtingen te geeven. Zy derhalven, welken zich van deese Catheters voorzien willen, ZULLEN DEZELVEN BY HEM BEKOOMEN KUNNEN.“ Quis certe, auctoritate viri, fide profecto dignissimi, adductus, non credidisset, instrumenta memorata jam satis facile comparari posse? Sed nihil minus; videtur nimis praeceptis et magis Theoretice quam Practice illud scripsisse Expert. GESSCHERUS, eo enim tempore, quo Miscellanea Ipsius Chirurgica in lucem prodierunt, de his parandis instrumentis nequidem cogitavit dexterr. GOBELS; quumque postea Solutionem Resinae accepisset, omne oleum operamque hac in re perdidit.

Balsamum de Copaiwa, Houpae etc. quoniam vero eventus in omnibus haud dispar fuit, ex pluribus pauca adferre, et *Oleum foeniculi* speciminis loco adhibere lubet.

EXP. LVIII. Solutioni Resinae Elasticae in Oleo Foeniculi addidi sufficientem quantitatem *Spir. Vini rectific.*, Resina statim fundum petit sub forma mucii fulci parum cohaerentis, hunc jam mucum a liquore supernatante separatum per 5 menses libero aëri exposui, sed illum viscidum et digitis adhaerentem remansisse inveni.

EXP. LIX. Simili solutioni addidi *Spir. Sal. Ammoniaci cum Calce viva parati* portionem, oritur lactescentia et emulsi species, Resina expellitur forma guttarum, parca tantum copia superficiei liquoris innatantium.

EXP. LX. Immisi in Vitrum dr. ij Resinae Elasticae, addita Unc. j. Ol. Foeniculi, vitrum igni exposui, sic sensim intumescunt et emolliuntur Resinae frustula, quo facto, miscelam in mortario subegi, hoc modo acquisivi massam satis spissam, laevem et aequabilem, huic jam addidi portionem *Sp. Vini rectif.*, et terendo oleum, quantum fieri potuit, separavi, illudque aliquoties repetii novam spiritus vini portionem addendo, tumque acquisivi massam tenacem, digitis tamen aliquomodo adhaerentem, plus minusve elasticam, hanc massam per binos menses in loco calido, scilicet supra clibanum, sepofui, sed, hoc tempore elapso, tantum abfuit, ut majorem consistentiam acquisiverit, ut potius magis viscida et fluida, ac digitis plus adhaerens evaserit.

EXP. LXI. Resinae Elasticae eodem modo per Ol. Foenic. emollitae et subactae trituratione addidi *Spir. Sal. Ammon. cum Calc. par.*, similis tunc massa tenax et subelastica oritur, quae eidem calori exposita eundem effectum produxit ac praecedens.

EXP. LXII. Resinam dicto modo subactam in *Aqua* per 24 horas coxi.

Eodem modo coxi alteram ejusdem massae resinosae portionem in *Spiritu vini rect.*, tertiam in *Spir. Sal. Ammon. c. Calc. par.* quartam in *Liquor. anod. min. Hofmanni*. In omnibus his maxima ex parte oleum dissipatur, remanentibus massis resinosis, digitis vix adhaerentibus, sube-

lafticis, quae tamen per binos menses calori expofitae, magis vifcidae evaferunt.

EXP. LXIII. Refinae Elafticae Oleo Foeniculi fubactae et Spiritu Vini Rect. praecipitatae portiones binas expofui frigori fatis *intenso*, fcilicet alteram pofui per 6 horas in vale plurima glaciei frufta continente, alteram per 8 dies pofui in cella fubterranea glaciei confervationi dicata: in utraque eventus fimilis fuit, fcilicet fere nulla contigit Refinae mutatio, faltem majorem confiftentiam, tenacitatem ac elafticitatem non acquifivit.

Sic videmus ratiocinium, quod primo intuitu magnam veri fpeciem prae fe ferebat, non tamen confirmari experientia, faltem in noftris tentaminibus, quod valde doleo, dum methodus haec prae ceteris propter fimplicitatem fuam et fumtuum difpendium fe commendet; forfan alius me felicior fcopum defideratum attinget, meretur fane haec res Chemicorum ulteriorem indagacionem; et in hac palaefta etiam plures, quam memorati viri, defudaffe ex Publicis Novellis accepimus, fic fcilicet legimus Cl. BUCHOLTZIUM in conventu *Academiae Electoralis Moguntinae*, quae *Erfordiae* eft, communicaffe tentamina, quae inftituit ad diffolutionem Refinae Elafticae, et formationem vaforum nonnullorum ex illa *); nec non Cl. TROJAM, Medicum Neapolitanum, in conventu nuper habito *Acad. Reg. Chir. Parif.* differtationem exhibuiffe de nonnullis fuae inventionis fasciis Chirurgicis ex Refina Elaftica paratis **).

Et, quod his adhuc longe praefat, nuperrime legimus Cl. BERNARD ex Refina hac feciffe et exhibuiffe Academiae modo memoratae Catheterum flexilem, illumque Catheterem a Sociis illius Academiae comprobatum fuiffe ***). Sic quoque accepimus Dexterr. GESSCHERUM in Noſodochio Sancti Petri, quod Amftelaedami eft, in viro quodam Ifchuriâ laborante adhibuiffe Catheterem ex

*) Vid. Noordhollandſche Courant van 30. Juny 1779.

**) V. Genees - Natuur - en Huyshoudkundige Jaarboeken, Eerſte Deel, Derde ſtuk.

***) V. Ibidem Derde deel, Tweede ſtuk.

Resina Elastica paratum, illumque per satis longum tempus in urethra reliquisse, (nisi memoria fallat, per 12 vel 14 dies), absque ullo incommodo. Hoc quum intellexeram, statim Amstelædamum petii, eo scopo, ut quid hac de re esset, inquirerem, GESSCHERUMque adii, et ab illo humaniter petii, vellet mecum communicare, quid de methodo hac ipsi cognitum esset, sancte promittens, me non tantum honorificam mentionem eorum, quae mecum communicaret, facturum, verum etiam, si in scriptis mihi tradere vellet ea, quae hac de re detexerat, me totam ipsius epistolam dissertationi meae inserturam. Non obstante hoc, recusavit constanter hac de re mihi quid patefacere, nisi quod, viso Cathetere Parisino, olfecerit methodum illos parandi, methodumque illam toto coelo differre ab illa in ipsius Miscellaneis Chirurgicis proposita *); gloriabatur porro, se secundum illam methodum absque magnis sumptibus et laboribus varia instrumenta et utensilia parare posse. Haec fuerunt omnia, quae (pro humanitate sua) Exp. GESSCHERUS mecum communicare voluit, pauca sane! Catheterem quoque videre mihi petenti non contigit.

Expectandum igitur, donec labores memoratorum virorum ad nos perveniant. Interea nulla alia methodus parandi ex Resina Elastica instrumenta magis videtur optanda, quam ut in loco natali ex succo lacteo Heveae nondum inspissato parentur desiderata instrumenta, vel ut succus ille lacteus in vase rite clauso ad nos transferatur, tum enim nullus dubito, quin peritus artifex desideratum scopum facile feriat.

Ut autem fasciae et perizomata ex Resina Elastica formantur, non necesse fore putarem, adventum succi praedicti ex America expectare: vidi enim nuper binas ex hac Resina confectas ampullulas, quarum diameter tanta est, (circiter 4 vel $4\frac{1}{2}$ pollic.) ut in hominibus non valde obesis, saltem in pueris, huic scopo sufficiant, modo ex amplissima harum ampullularum parte circulus desumatur, qui

*) Hoc facile crediderim, quum a nemine, methodo ibidem tradita, unquam bonum Catheterem paratum fuisse, aut parari posse, antea vidimus.

dein sensim extendi & ad partes elapsas continendas facile accommodari potest.

Haec sunt B. L. quae de Resina hac, corpore admodum singulari, dicenda habebam, vela igitur contraho, pauca tantum ex ante dictis subnectens.

C O R O L L A R I A.

α) Resinam hanc Elasticam prorsus diversam esse ab omnibus productis vegetabilibus, hactenus cognitis, tam per singularem ipsius vim elasticam, quam per alias quamplurimas dotes supra memoratas, apparet, imo male prorsus nomen RESINAE ipsi impositum esse et adhuc minus congrua denominatione dici GUMMI, quia neque in Alcohole, neque in Aqua dissolvitur, quin nequidem in his liquoribus notabiliter mutatur: (Vid. Exp. II. et XXIX.) Meliori itaque jure huic corpori nomen SUCCI HEVEAE INSPISATI tribuerem.

β) Differre et a ceteris Resinosi corporibus principiis suis constitutivis, etenim, uti constat praecipuorum Chemicorum suffragiis, principium Acidum cum Oleoso efficit Balsamum; (Vid. Exp. VIII.) a Balsamo autem Resina tantum consistentia differt. Quae Synthesis etiam Analyti confirmatur, Resinae enim Vegetabiles ad ignem tractatae fundunt Aquam, Oleum, Spiritum et Sal Acidum, denique paucissimam Terram; Noster vero Heveae succus, in initio praebet parum Phlegmatis Subalcalini, dein Oleum Tenuius, tum Spiritum Alcalinum Volatilem, post hunc rursus Oleum sed Spissius, dein iterum Spiritum Alcalinum praecedenti debiliorem, postea Caput Mortuum sed exigua quantitate (Vid. Exp. V.) Toto ergo coelo differt Resina nostra a Regni Vegetabilis Resinis.

γ. Miras esse mutationes, quas subit succus Heveae, dum cum Fumante Nitri Spiritu tractetur; [cum hoc certe inter reliquos liquores maxima affinitas locum habere videtur, siue enim concentratum fuerit acidum, siue minus, satis bene solvitur succus. Exp. XIII. XIV.] Sic enim ex parte in Aqua, Alcohole, et Salibus Alcalinis solubilis redditur, et ubi saturatior solutio succi hujus in Spir. Nitri fumante diu satis quieti fuerit tradita, Crystallus emittit teneras, ad Rhomboideam figuram proxime accedentes: Unde hoc? Brevi dicam: nescio! Hoc scio, quod Gummi Arabicum cum eodem Acido Nitroso tractatum etiam lapsu temporis Crystallus ejusmodi emittat, quarum tamen indoles nondum satis constat.

δ.) Coloris illam mutationem, quam nonnulli patiuntur liquores, dum cum succo hoc tractentur, videri attribuendam fuligini, sese inter exsiccationem succo insinuantem, quae tum per varios liquores v. g. Spiritum Sal. Ammon. c. Calce, Alcohol etc. plus minusve extrahitur, eosque tingit. Vid. Exp. XXIII. XXIX. XXX. XXXI.

ε.) Singulare praeterea esse phaenomenon illud, quod Resinae contingit, dum cum Oleo Camphorae (Exp. L.) conjungitur, liquidum enim tum eo usque expellitur, ut postea nihil nisi massa solida friabilis remaneat. Unde hoc? non facile dicam! Videtur autem illud non solum acido nitroso attribuendum, hoc enim (Exp. XIV.) dum ininus concentratum fuerit, tardissime et debilissime agit in succum nostrum, et dum frigide sibi relinquitur horum corporum miscela, per plures mentes absque notabili mutatione possunt asservari, cujus contrarium in Experimento hoc locum habet. Et dum Ol. Camphorae cum succo Heveae ad ignem tractatur, mox post horulam solutio obrinetur, quae alias in debilitato Nitri acido, non nisi taediosa satis digestionem et diuturna ebullitione acquiritur.

ζ.) Solvi tandem succum hunc in Acidis fortioribus, omnium optime tamen in Acido Nitroso, liquoribus purissimis Aethereis, et Oleosis, tam Volatilibus quam Pinguibus; unicum enim Ricini Olei exemplum, in quo dissolutionem obtinere non potui, licet diu satis et in illo Oleo, ex America transmissio, et in Oleo, quod pressione ipse paraveram, ad ignem tractaverim Resinam, tantum hujus regulae exceptionem facit.

A D D E N D A.

Quum jam dissertatio haec maxima ex parte typis fuerit mandata, ex Annalibus Medicis cognovi Pharmacopolam Hamburgensem, nomine THOREY, tentamina nonnulla instituisse cum Resinis Elasticis, quae descripta exstant in libro Germanico Idiomate conscripto, cui titulus: *Chemisches Journal für die Freunde der Naturlehre, etc. Entworfen von D. LORENZ CRELL. Zweyter Theil Lemgo 1779*, quorum experimentorum summam brevi tradere lubet:

Resinae scilicet Elasticae, ab auctore descriptae, e China proveniunt triplicis generis, a se invicem colore distinctae, datur scilicet *Coerulea, Flava et Rubra*; cum his experimenta instituit, illam semel tantum vidit. Haec jam Resina flava (quae Succini ad instar plerumque pellucet) a vulgari nigra variis proprietatibus differt, praesertim elasticitate, cujus exiguum quidem gradum possidet, adeo ut leviori tantum extensione, quin et frequentiori in terram lapsu, fissuram et rupturam patiatur: Flammae candelae admota et calori exposita eodem modo se praestat ac nigra: in *Liq. Anodyno Hofmanni, Rectificatissimo vini Spiritu, Spiritu salis Ammoniaci, Oleoque Therebinthinae* ex parte solvitur: *Naphtha* vero *Nitri, Spiritus Salis et Nitri dulces, Oleum Petrae, Acetum destillatum, Aqua Regia et Spiritus salis acidus* solutionem non efficiebant, in plerisque horum liquorum tantum mutabatur Resinae color: perfecte autem solvitur in *Oleo Vitrioli, Spiritu Nitri Acido, Liquore Salis Tartari, Oleo Anthos ac Chamomillae*, in ultimo vero hoc Oleo illud singulare locum habebat, quod, post 48 horarum digestionem, illa Resinae pars, quae nondum dissoluta erat, colorem acquisiverit profunde coeruleum, et facta fuerit friabilis, praeter bina frustula, quae, dum superiorem partem occuparunt, viridem colorem induerunt, ac tenacitatem suam conservarunt.

Plura cum Resina hac instituere experimenta non potuit Auctor propter defectum Resinae illius, quae rarissima

est: (adeo ut in Patria nostra illam, data opera, acquirere non potuerim, quin ne quidem in hisce terris cognita sit, vidi equidem binas Resinae Elasticae species, praeter *Nigram* scilicet vulgarem, et *Subflavam* vidisse memini, quae omnibus dotibus nigram aemulabat, excepto colore, quod discrimen vel methodo exsiccandi vel arbori magis minusve inveterataetribuendum esse censeo:) Auctor praeterea noster suspicatur, nec sine ratione, tres hujus Resinae species unius indolis esse, et colorem illum esse factitium.

Experimenta autem cum *Rubra* instituta conveniunt cum illis, quae cum *Flava* instituit, ergo illa repetere supervacuum foret.

II.

DR. GUILIELMI PUSEY HAYLE

DISSERTATIO MEDICA

QUAEDAM

DE CANTHARIDUM NATURA ET
USU COMPLECTENS.

LUGDUNI BATAVORUM,

1 7 8 6.

10

1001

1001

1001

1001

THE AMERICAN UNIVERSITY

WASHINGTON, D. C.

1944

1001

DISSERTATIO MEDICA

QUAEDAM DE CANTHARIDUM NATURA
ET USU COMPLECTENS.

CANTHARIDES quanquam medicis per longum notae fuerunt tempus, et frequenter in medicinae praxi adhibitae, suum tamen usum, qui nunc longe lateque obtinet, non nisi commodis nuper compertis, praecipue debent. Itaque notitiam quam maximam parare de re tanti momenti sollicitus, et candidatus honorum medicinae appetens, nequaquam dubitavi, tum studendo, tum varias scriptorum opiniones investigando, de iis, utpote de argumento dissertatione inaugurali haud indigno, tractare. De epispasticis, seu de cantharidum usu externo, in animo est praecipue loqui, pauca autem necessarium puto praefari:

1. De earum historia naturali.
2. De earum dotibus chemicis.
3. De earum effectibus, sive sint externe, sive interne applicatae.
4. De morbis, contra quos laudantur cantharides.

Postremo, de morbis praecipue, in quibus epispastica utiliter sint adhibenda.

HISTORIA NATURALIS.

Ex historiis certissimis et optime comprobatis patet, cantharides indigenas esse Hispaniae, Italiae et Galliae Meridionalis: apud Germanos quoque inveniuntur, sed raro, unde etiam migrare, ac quibusdam tantum tempestatibus ibi sese ostendere putantur *). Maximae, atque ad res medicas aptissimae, secundum cel. *Lewis* sententiam, ex Italia deferuntur **). Afferuit tamen *Cartheuser* minimas anteponendas esse, quippe natura magis acri gaudent. Plurimae in Hispania abundant, ubi eas primum inventas, nec

*) Carth. mat. med. Tom. I. p. 496.

**) Lewis mat. med. new. Edition p. 183.

alibi inveniendas, et inde ad nos translatas fuisse, olim creditum fuit. Hinc forsan nomen: *muscae Hispaniae*, quod adhuc gerunt, ut quidem nuper observavit Auctor *).

Complures scriptores, ad varias cantharidum species recensendas describendasque, multa protulerunt, praecipue autem ille vir de rebus physicis historicus celebrer. C. Linnaeus. Duas praesertim species habet; quarum alteram ita dignoscit, „quae elytra habent abbreviata absque alis,“ alteram hoc modo „quae elytris gaudent longitudine corporis alas tegentibus.“ Hanc iterum dividit in species quatuordecim; quarum autem singulas dicere, nec dissertatio hujusmodi sufficeret, nec multum foret commodi. Lectorem igitur ad ipsa auctoris clariss. opera relegabo **). Quoniam vero harum quatuordecim species prima, a Linnaeo *Meloë vesicatorium*, vocata, cantharis officinarum vera esse videatur, ideoque a nobis nunc tractanda. Ejus historiam naturalem leviter tangam.

Haec species plerumque pollicis dimidium longitudine aequat, colore viridi corusco misto, cum aliquo caeruleo aureoque, et ad partem inferiorem fere lurido, gaudet; sapor est illis primo levis, postea vero acerrimus exurensque, odor recentibus leviter ingratus.

Hae muscae, abeunte vere, ac menses circiter Junium Juliumque capiendae sunt, utpote tunc temporis plurimae optimaque existimantur. Captae et bene exsiccatae, per longum viribus integris servari possint. Si autem inter servandum diffringantur, ac in pulverem redigantur, corruptae inutilesque evadunt. Admodum pigrae sunt, adeo ut facillime prehendi possint, quod ita efficitur.

Sub arboribus dumetisque, quibus cantharides confidunt, pannus sternitur latus ampliusque, in quem ramis leviter motis, vel baculo percussis, magna copia decidunt. Postea aceti vapor obnoxiae occiduntur, per methodum a Dioscoride jam dudum propositam, et plerumque ad hunc diem usque adhibitam. „Eas (cantharides) in vas non picatum immittito, ac ipsius osculum raro puroque linteo obligatum

*) Forsten. hist. nat. Canth. p. 4.

**) System. natur. Edit. xij. Tom. I. Part. II. p. 697.

circumvertito ad vaporem ferventis aceti quam accerrimi, tandiuque universum fictile contineto, donec illae suffocentur, tandem lino transfixas reponito *). „Posthac soli exponendo exsiccantur, et corpora ob causas supra dictas integra servantur. Haecce tamen methodus haud omnino *Neumanno* placuit, qui aceto anteponit spiritum vinosum in millepedibus curandis etiam adhibitum: „The Steams of Spirit of Wine, says he, or the liquor itself sprinkled upon them, not only soon killing the Insects, but embalming them as it were, and preserving them from decay **).“

Quasdam harum partes tantum servare monent aliqui, e. g. corpus solum, capite, membris, alisque abjectis ***): alii autem his servatis, illud abjicere volunt; quippe quibus sententia est, in his partibus solum cantharidum acrimoniam propriam inesse. Has autem opiniones aequae ineptas nunc satis constat; si enim hi ita diverse sentientes, quisque invenerint, partes ab se conditas vim cantharidum causticam habere, tunc certe omnes in universum partes idem valere, nobis concludere fas sit. Ad hoc ex *Galenii*, *Dioscoridis*, *Plinii*, *Aëtii*que scriptis ****) apparet, caput, alas, membra corpori trunco (quippe in quo earum virus contineri opinio fuit) quasi antidotum existimata, eoque hoc simul cum illis semper applicatum.

DE CANTHARIDUM DOTIBUS CHEMICIS.

Animalia ad res medicas adhibita, adeo sunt pauca, prae vegetabilibus, ut parvi quidem momenti illorum analysisin chemicam parare, multis visum sit. Haud parum tamen conjecturae de horum insectorum partibus efficacibus prolatum fuit, et quaedam experimenta, illorum principia investigandi causa, per analysisin instituta fuerunt. Haec autem plerumque vel parum vel nihil valent, et res adhuc videtur atra caliginemersa. Vegetabilia per ignem distorquere ac consumere, ut eorum principia inveniantur, jam-

*) *Dioscorid. L. 2. C. 65. p. 102.*

**) *Vid. Neumanni Chem. p. 495. N. P.*

***) *Hipp.*

****) *Vid. Alstons Mat. Med. vol. 2. p. 500.*

dudum exolevit. Nobis enim bene persuasum est, pleraque, fere omnia vegetabilia multo igni exposita, similia praebe-
re; ideoque eorum naturam, non per combustionem nec calcinationem, aliave id genus investigare conamur; sed iis menstrua varia affundimus, ut effectus, quos edunt, liqui-
do et manifeste observentur.

Idem de animalibus non sine causa dici queat. Haec omnia igni objecta, in eadem principia abire videntur: nec est, cur nonnulli putarent, se tali operatione veram invenisse naturam ejus cantharidum partis, in qua earum posita est vis stimulans. Quid in conclusionibus adeo incaute factis sit falsum, ostendere haud difficile; et quanquam partium hujus muscae maxima vi pollentium propria explicare non possumus, hypotheses tamen de hac re oblatas experimentis paucis ac planis refellere conabimur. Nonnulli principium cantharidum efficiens in sale volatile tenui sive oleo essentiali, manere contenderunt: alii et inprimis *Cartheuser*, esse acidum: dum alii omnino diverse sentientes, vim stimulantem alkali attribuerunt: pauci, eas vi mechanica praeditas, per filamenta parva et villosa, super corpora membraque sua eminentia, agere existimarunt. Hoc quidem adeo absurdum, ut vix refutationem mereat. Nemo certe ignoret, cantharides stimulo haud mechanico, sed chemico gaudere. Quomodo, re aliter sese habente, spiritus vinosus earum vim parare posset.

Quod ad opinionem de sale volatili, nobis, si vera esset, certe concludendum, aquam cantharidum solvens chemicum fortissimum fore. At non est: *Neumannus* *) enim narrat, ipsos hanc opinionem tenentes, ad cantharidum vires eliciendas, non aquam, (quae salem optime solvit) sed spiritum vinosum affundere, quod suae theoriae omnino adversum.

Cantharidi nullum inesse acidum, periculum quod sequitur simplex, eam nempe cum infusu vegetabili miscendi, docet. Syrupo violarum paululo aquae diluto, cantharidum pulverem tenuem ad grana pauca addidi, ac prope simul commiscui. Mistura rite observata, non modo non

*) Vid. *Neumanns Chemistry*. p. 195.

colorem rubrum, sed nullum acidi signum ostendit, et in sententias fere omnino adversas ire coegit. Liquor enim colatus, plane viridis fuit, et ita aliquid salis alkalini adesse notavit. Inde autem dicere, horum insectorum vim stimulantem alkali inesse, non liceat; imo, rem longe aliter sese habere multa demonstrant. Acetum enim et alia acida cantharides semper aciores reddunt; alkali autem neutrum inersque. Ad hanc rem plenius investigandam, complura emplastrula vesicantia ex cantharidum pulvere super emplastrum commune trito formata, variisque liquoribus madefacta, femori meo applicavi: id quod aceto madefactum multo acrius erat, quam caetera. Cantharides quidem si unguento vel emplastro probe fuerint mistae, adeo ut cuti continuae adhaereant, suam operationem absque acido edere possunt. Acetum tamen non solum ad vesicantium vim augendam, verum ad eorum effectus certiores faciendos, ex multa experientia saepe adhibetur. Hinc igitur credamus salem alkalinum; quem his iniectis adesse monstrat syrupus violarum, parum abundare; nec ab hoc ullo modo pendere eorum stimulum vel acrimoniam: cujus natura vera forsitan nos semper fallit. Tentamina autem de hac re non contemnenda; quippe quae, per varia et adhuc, jam notis, efficaciora addita, quibus Cantharidum vires augere, temperare, minuere possumus, denique invenire valeant.

Quoniam spiritus vini resinas optime solvit, cantharidumque vires admodum bene eliciat, nonnulli forsitan earum acrimoniam cuidam resinae sui generis inesse putent. Multum vero investigationis, multaue experimenta adhuc sunt peragenda, antequam de hac re certe loqui detur. Et quidem, ut dubitarem, magis adducor, quum auctoris praeclari de his nuper scribentis conclusionem perpendam, qui, multis periculis maxima cura ac labore perfectis, his utitur verbis:

„Dum itaque varia tentamina chemica, igne fortiori vel lenissimo instituta, nil adeo certi demonstrent, ut auctorum dissensus componi possit, locus videtur opinionibus et hypothesebus probabilibus relictus. Ad me vero quod attinet, satius duco, hic nihil determinare, et iudicium meum suspendere, donec chemicorum industria proferantur expe-

rimenta omni exceptione majora, quae naturam horum insectorum adeo intricatam et absconditam demonstrent *).“

DE CANTHARIDUM IN CORPUS HUMANUM EFFECTIBUS.

Quantumcumque de cantharidum parte partibusve, quibus earum adsunt vires, disputatum sit, hoc certe nemo negabit, acrimoniam quam maximam iis inesse, qua ubicunque applicatae, irritant, incendunt, exulcerantque. Sive externe, sive interne adhibitae, renes praecipue afficere videntur. Interne et copia haud ita magna acceptae, symptomata saevissima, et quidem lethalia excitant. Primo meatus urinarios, partesque vicinas, dolore, inflammatione, ulceratione occupant; totum corpus cito laborat; torret sitis ora; pyrexia invadit; aeger delirio, furore, ac ipsa demum morte corripitur. Cuivis externae parti admotae stimulum suum ostendunt, cutim inflammant, et cuticulam in vesiculas liquore tenui oppletas elevant; ad hoc, renes et vesicam adeo afficiunt, ut stranguria vel urinae suppressio gravi cum dolore sequantur.

Ad haec explicanda phaenomena non omnes idem putarunt medici. Alii ea ad consensum partem inter vesicatam, ac organa urinaria referri volunt: alii autem, quod verisimilius, ac, ni fallor, plurimis creditum, ad hujus muscae particulas tenuiores acrioresque, quae per vasa lymphatica transmissae, et cum toto sanguine mixtae, ad renes maximae collectae esse videntur, et mala jam dicta afferunt. In hanc quam illam sententiam ire malo; eadem enim observantur signa, et ubi cantharides, vel per se, vel liquore solutae in ventriculum acceptae, et ubi epispastica, ex his praecipue composita, externe admota fuerunt. Contra autem, ubi quaevis alia epispastica cuicunque parti applicata sunt, nil tale sequitur, quod vel minimam probabilitatem hypothese de partium consensu daret. Dum enim aeger stranguria ex cantharide laboret, atque partes vesicatae cum aqua tepida et lacte foveantur, si aliquid sequatur auxilii, hoc non relaxationi ad partem incipienti, et per consensum (ut putatur) renes vesicamque attingenti,tribuendum;

*) Forsten, *analys. chem. Canth.* p. 55.

sed magis quarundam muscae particularum, quae cuti adhaerent, ablutioni, et quae diutius adhaerentes, dolorem magis saevire, et morbum longius permanere facerent. Ad hoc, ablutio sola auxilium parvum et tardum praebet, nisi potus tenuis magna copia simul subministretur.

Cantharides vi sanguinis attenuandi, et usque dissolvendi, ejusdemque putredinem augendi, esse praeditas creditum fuit. Idcirco earum in febribus, praecipue in specie putrida, applicatio, sub forma epispastici, (cujus exinde usus adeo feliciter evenit) per longum omissa erat. Experimenta autem Doctorum *Percival*, *Pringle*, et aliorum monstrant, hoc omnino falsum, atque nullam cantharidum cum sanguine misturam chemicam fieri posse. Alii vero ruborem, inflammationem et dolorem, quae semper vesicatorium parti applicatum comitantur videntes, id praecipue per suam vim stimulantem agere, eoque in morbis cum sanguinis impetu aucto noxium, nec nisi cum debilitas valeat, prodesse existimarunt. Quae tamen auctoribus probis optimisque nuper observata, ratiocinationes hujusmodi ineptas esse, ostendunt. Nec quidem mirum est medicos tunc sic errasse. Hi enim ubi talia crederent, corporis humani structuram functionesque parum notas habebant. Vis stimulans qua gaudent vesicatoria omnibus apparet: simul vero satis constat, effectus quos edunt, saepe vix ultra partem vesicatam sentiri; totum igitur corpus, minus quam putatum est, iis affici; denique, non modo vasorum sanguiferorum actionem non esse auctam, sed, in febribus ac inflammationibus, si adhibeantur, pulsus tardiores et debiliores reddunt, aliaque symptomata graviora levant atque tollunt. Non tamen negandum, quin epispastica aliquando symptomata gravissima maximeque timenda, calorem nempe auctum, sitim arentem etc. excitarunt; quod forsan eorum usum minus frequentem effecerit. Haec mala, me iudice, non ex cantharidum vi propria oriuntur, quippe quas, si res ita sese haberent, eosdem semper effectus in omnes aegros, et, in singulis omnium morborum gradibus, edere necesse esset; magis vero ex corporis tunc temporis conditione singulari, quod propter suam mobilitatem, a morbo fortasse auctam, facilius epispasticis afficitur; quo et alia stimulantia externa

eadem excitarent signa. Haec igitur incommoda non epispasticis ipsis, sed epispasticis intempestive ac imperite usurpatis, attribuenda: quod omnis medicinam exercens scire debet, ne in talem errorem incidat. In eandem sententiam dicit clariss. Gregorius medicinae theoreticae Edinburgi Professor. „Nonnullis ob singularem corporis constitutionem pene intolerabilia sunt, eosque plurimum et pessime irritant, et calefaciunt, et sitim, et magnum dolorem, et tremores, et demum convulsiones excitant. Plerumque flaccidi, pituitosi, torpidi, quam firmi, ficci, atque mobiles, infantes quam adulti, feminae quam viri, frigidarum quam calidarum regionum incolae, *Vesicatoria* melius patiuntur *).“

Praeter inflammationem ex cantharidum applicatione externa ortam, nonnulli multum ab humoris effusione, quae earum sequitur usum, pendere existimarunt.

Haec autem evacuatio plerumque parum abundat, nisi unguentum partim ex cantharide compositum, parti vesicatae saepe admoveatur. Ubi hoc fit, effectus iis setaceorum vel fomiculorum similes videntur. Quoniam vero medici vesicatoria propter evacuationem eorum usum sequentem raro adhibent, de hac re nil amplius dicturus sum **).

Ab sanguinis quantitate, quam ad partes externas deducunt vesicatoria, aliqua ex parte discimur, quomodo ad sanguinis in partibus internis congestiones tollendas, e. g. quae adsunt apoplexiae, epilepsiae etc. prodesse possint. Hoc autem postea plenius dicendum, ubi de singulis morbis, quibus cantharides esse remedium idoneum docuit experientia, tractatum erit. Earum enim modus operandi, forsitan variet pro aegri morbo, corporis habitu, aliisque rebus, quibus prius explicatis, ille clarius apparebit.

Nunc fortasse operae pretium erit, paucis dicere, quomodo, quae haec insecta sive externe adhibita, aliquando afferunt incommodis obviam ire possumus, vel ea jam instantia levare. Cantharides per se interne praebere haud saepe licet. Tinctura plerumque adhibetur, et ne haec

*) Consp. Med. theoret. Vol. 2. p. 604.

**) Vid. Gregory, Consp. Med. Theor. Vol. 2. p. 593. et 594.

quidem, nisi remedia mucilaginosa et diluentia simul addantur. Quod ad eorum usum externum; ubi capiti vesicatorio applicato opus est, pridie abradatur capillitium, si hoc morae res sinant, ita enim ad leves novaculae incisuras sanandas tempus datur: ubi vero vesicatorium statim applicare necesse est, vulnuscule ne cantharidum actioni pateant, emplastro adhaesivo (super frustra lintea extenso) tegere oportet, quod quidem necessarium, si quando epispastica iis applicentur partibus, quae jam antea scarificatae, quibusque cucurbitulae cruentae impositae erant. Semper, ut stranguriam ac irritationem parum necessariam vitemus, cavendum ne epispasticum nimis longe applicatum relinquatur, ac ne, vesicatorio amoto, partem nudatam statim unguento molli tegere omittatur. Si inflammationem excitare, cuticulamque paululum elevare valeant vesicatoria, plerumque satis erit; haec enim sunt commoda ex illorum usu maxime quaerenda. Porro saepius praestabit partis vesicatae cuticulam elevatam relinquere, donec sua sponte separetur: si enim prius divellatur, quam renovari incipiat, aegro multum irritationis ac doloris efficit. Stranguria quae nonnunquam epispasticam applicatum sequitur, aequae ac si a cantharidum usu interno orta fuisset, per medicamenta diluentia, mucilaginosa levatur; et multis testantibus medicis, probabile fit, camphoram sive interne adhibitam, sive forma pulveris super vesicatoria tritam, aliquid valere, ad cantharidum vires moderandas, et symptomata ante dicta arcenda.

DE MORBIS, QUIBUS MEDENDIS CANTHARIDES INTERNE ADHIBITAE, LAUDATAE FUERUNT.

Haec insecta saepius vetustis quam hodiernis medicis interne praebebantur. Eorum vim diureticam praecipue laudarunt Hippocrates et Galenus, qui ea per se adhibere ausi sunt, quanquam mala nonnunquam sequentia illis non celata fuerunt. Haec autem mala magis magisque observata, et non solum a medicis, sed poetis *) quoque tradita,

*) Vid. Nicandri Theriacam adnexam Tract. Grevini de venenis Antwerp. 1571. p. 316. Conf. etiam de iis Paulus Aegineta lib. V. Cap. 31.

multos a cantharidibus interne administrandis deterruerunt. Medicinam tamen exercentibus bene notum est, tincturam cantharidum interne, dosibus idoneis, praecipueque cum mucilaginosi, diluentibus, vel aliquando laudano conjunctam, tuto adhiberi posse; talibusque moderatam, morbis quibusdam inveteratis remedium bonum existimari. Hos morbos nunc dicere aggrediar, qui adeo sunt pauci, ut eos in ordines proprios speciesve colligere non necesse sit. Incipiam a morbis cutaneis chronicis, qui et symptomatum varietate, et natura inveterata, saepe nullis ne quidem fortissimis medicamentis vincenda, sunt insignes. Quo nomine appellari debent, saepe non liquet, plerumque autem vel herpes vel lepra vocantur. Mercurii praeparationes variae, vel interne vel externe, vel utroque simul adhibitae cum balneo tepido, remedia fere sunt efficacissima *). Ubi haec morbum depellere non possint, alia, antimonium nempe multimodis praeparatum, decoctum lignorum, ac tinctura cantharidum laudata sunt.

Hanc tincturam duobus aegris morbo cutaneo diuturno laborantibus, praescriptam vidi, a viro dignissimo ac ingeniosissimo doctore Keir, nosocomii sancti Thomae apud Londinum medico, cujus immatura mors omnibus medicinam literasve colentibus maxime est deplenda. Eorum morbum esse illum saepe lepram graecorum dictum existimavit. Maculae rubrae diversa magnitudine varias corporis partes, praeter faciem, occuparunt, aliquando distinctae, aliquando inter sese conjunctae, crustisque albis squamosis tectae, quae subinde decedentes cito renovatae sunt. Pruritus adfuit, at humoris fluxus nullus. Alteri morbus intra tertiam hebdomadam omnino sanatus fuit; et alter quamquam cutis affectio non ut a priore penitus sublata, tamen intra dies octo insigniter levatus, nosocomio discessit. Uterque tincturae cantharidum guttas XV. pro dosi ter vel quater in die sumere incipiebat. Haecce dosis gradatim ad guttas LX. vel LXX. singulis aucta est, et uni ad guttas centum usque, sine ullo magno incommodo. Stranguriae levia symptomata, quae supervenerint, per potum mucilaginosum diluentemque subinde praebitum, amota sunt. Non-

*) Gregory clinical Lectures.

nullis sententia est, cantharides perspirationem augendo hic prodesse. Quantum ita sit nescio, sed ita esse multum dubito: nullam enim perspirationem auctam in exemplis supra dictis sentire non potui, Cantharides per longum laudatae fuerunt, propter vim diureticam. Eas in hydropes curando, et Hippocrates et Galenus adhibere suaferunt; quod etiam quidam nostra aetate medici experti sunt, quanquam satis notum, hoc remedium incaute praebitum, urinam magis inhibere, quam ciere.

Ab iis, quae de hac re cognovi, hoc conficio, quod cantharidum pulveris granum unum cum camphorae granis duobus vel tribus conjunctum, homines aetate adulta tuto fumere possint: nec dubito, quin ex hujusmodi misturis aliquid auxilii hydropicis nonnunquam afferatur. Doctor Gregory nuperrime hocce remedium duobus hydropes lobarantibus praescripsit, et uni ex his ad cantharidum grana tria, cum camphorae granis sex sine incommodo dedit. Urinam alteri plane auxit; alteri autem neque hoc, neque quodvis aliud remedium (et magna copia tentata) vel minimum auxilium ferre visum est.

Quoniam medicamenta diuretica in genere operationem admodum incertam habent, haud parvi est momenti multa parare: dignum enim notatu est, quod saepe post complura frustra tentata, unum quanquam plerumque vi minore gaudens, ad spem eveniet. Quapropter ubi aliis et mitioribus diureticis infelicititer usi sumus, cantharides forsitan saepius tentari debent.

Cum cantharides meatus urinarios praecipue afficiant, non mirandum, cur a medicis ad multos harum corporis partium et vicinarum morbos graves amovendos adhibitae sint. Quidam medicorum Londinensium, praesertim autem Doct. *Brisbane*, tincturam cantharidum in diabete curando praescripserunt ac laudarunt. Idem ut ischuriae remedium datum; atque Groenvelt medicus Londinensis, qui olim de hac re scripsit, id non solum huic morbo auxilium, sed camphora temperatum, medicamentum tutum egregiumque praestitit dysuriis, stranguriae, vesicae ulceribus etc. Remedium tamen tantis viribus praeditum, in his diversis morbis sine discrimine datum, satis constat pericu-

lofiffimum fore. Nam ifchuriae aliquando a veficae inflammatione pendent, vel fimul invadunt; at nemo certe hic cantharides praebendas effe, unquam fibi in animum induceret. In caeteris morbis nunc dictis, hocce remedium, ut credo, inflammationem ac irritationem magis augeret, quam minueret. Ea infecta, me iudice, his morbis funt remedium idoneum, optimumque eventum promittunt, quibus adfunt *relaxatio*, vel *torpor*, vel *paralyfis*, unum aut plura organa urinaria occupantia. Ita urinae fuppreffio, a veficae ipfius paralyfi, incontinentia, ab ejus fphincteris paralyfi oriri poffunt. In utroque morbo cantharides nec non balfama, terebinthinasque (quae faepe dantur, et praecipue easdem partes afficiunt) feliciter praebere poffumus. Tincturam cantharidum a Doct. *Gregory*, nofocomii Edinenfis medico clinico, aegro urinae incontinentia, fimul et membrorum inferiorum paralyfi laboranti praefcriptam, et prodeffe vidi.

In gonorrhoeis inveteratis hoc remedium propter ftimulum quo urethram afficere poffet, juvare fufpicarer; quod quidem in quibusdam exemplis, ubi tinctura rite adhibita, effe repertum.

Propter uteri, vaginae, ac veficae urinariae vicinitatem, expectandum effe cantharides, ad amenorrhoeam et leucorrhoeam levandam, valere. Has igitur in illis morbis praefcribere certe liceret. Quantum autem prodeffent, nunquam mihi observandi occasio data effe.

Morbis fpasmodicis tribus cantharis adhibita effe, epilepfiae nempe, rabiei caninae et pertuffi; de quibus et praecipue de pertuffi, pauca dicere in animo effe. Quae pro horum morborum remediis fingularibus, et nuper, et olim immerito celebrata fuerunt, nos forfan faciant, ut illud etiam, de quo nunc agitur, parvi pendamus. Nam ii morbi, fanatu tam difficiles quam antea, manent; nec ulla epilepfiae aut hydrophobiae adhuc reperta effe methodus medendi tuta ac profpera: pluribus enim periculis opus effe, prius quam cantharidi multum attribuamus. Hanc tamen in tuffi convulfiva ufurpare fuafuerunt Doct. *Burton* et prae-

cipue Doct. *Letsom* Med. Lond. *): Ille pulverem cantharidum una cum camphora et extracto corticis peruviani dedit, hic anteponebat misturam ex tinctura cantharidum, tinctura corticis peruviani et elixir paregorico ita praebitam, ut levem stranguriam excitet. Ex hac mistura asserit felicissimum sequi successum, ubi cicuta, venaesectio, emetica, cortex peruvianus, opium frustra tentata fuissent. Longe aliter Doct. *Cullen*, qui de materia medica tractans, dicit, Doctorem *Burton*, causa cantharidum acrimoniam moderandi, corticem et camphoram addidisse: se tamen existimare vires hujus misturae ex cortice solummodo pendere, ideoque corticem sine additamento adhibuisse, omniaque totius misturae commoda parasse absque ejus incommodis, quibus medici misturam praescribentes aegros obnoxios fecerunt **).

Vis cantharidum aphrodisiaca diu notata est, multique ex his interne sumptis per aliquod tempus ad libidinem stimulati fuerunt. Ambigitur tamen an ita facere unquam liceat. Illis enim solis qui immoderate ac intemperate vivere assueti, vel quorum aetas jam annis confecta est, vires ad res venereas deficiunt; his autem ex tali remedio, nullo stabili ac fixo permanente bono, ea infecta, tanquam stimulum hujusmodi a medicis nunquam adhibenda, non putare non possum. Verum enimvero multa traduntur exempla, fide haud incerta, quibus ex his horrendis sceleratisque libidinis excitandae conatibus, mala saevissima ac mors ipsa profecta sunt. Quae tamen omnia totum corpus certo robore firmant, e. g. cibus salutaris, aer, exercitatio, remedia tonica, ea aphrodisiaca optima evadunt.

*) See Medical memoirs of the general Dispensary in London for. 1773 et 1774.

**) Mirum fortasse videatur, me auctorum adeo illustrium tam diversas sententias narrasse, ac simul nihil novum propriumve protulisse. Hanc quidem discrepantiam explicare nequeo, qui raro vel hoc vel illud remedium praescriptum vidi. Haec autem eo potissimum notavi ut omnis artem medicam exercens ipse, prout experientia excogitatioque monstraverint, de utroque remedio judicet.

DE MORBIS QUIBUS EPISPASTICA PRAECIPUE
SUNT NECESSARIA.

Quantum epispastica proficere possunt in multis morbis, quodque mirum est, in morbis plane inter sese diversis, satis ostendit et confirmavit experientia. Hoc, ut spero, quodammodo explicare potest: sed quanquam id non attingamus, non ideo epispastica sunt contemnenda; remedium enim utile ac bonum eo rejicere, quod illius modum operandi intelligere nequeamus, prorsus iniquum atque absurdum foret. Nonnulli omnes vesicantium effectus, vel ad vim stimulantem, vel evacuantem, vel antispasmodicam referre voluerunt; atque ex his pendendis, ea in propriis morbis exhibuerunt, eorumque actionem explicarunt. Hi autem effectus incerti videntur, nec satisfaciunt. Nam ut supra dictum liquor per vesicatoria effusus minime abundat; et auxilium allatum saepe effusio admodum parca fuerat, ut in multis inflammationibus internis, de quibus in suo loco plenius dicendum.

Imprimis, quaedam de epispasticorum in febribus usu scripturus sum. In febribus continuis maxime usurpantur vesicatoria; aliquando etiam in intermittentibus; exempla-que illarum quibus hoc remedium proficit, ubi his esset utile, docent. Plerique medicorum inter se conveniunt, affectiones locales cerebri praesertim, aut pulmonum, quae febres comitantur, saepe insigniter sublevari per vesicatoria partibus vicinis applicata. Inde delirio ac stupore in typho prementibus, epispastica fere semper necessaria fiunt, ideoque aliquando capiti, aliquando cervici, admoveantur. Huic autem admota eandem utilitatem paucioraque incommoda habent. Eorum operationis si ratio danda sit, nobis ex eodem principio pendere videtur, quod adest in phlegmatis, mox tractandis. Praeterea omni laesione locali praetermissa, multi clari medici epispastica brachiis cruribusve applicata laudarunt, in febribus ubi aegri summa debilitate laborarent, quippe quae, ut putarunt, pulsus arteriarum firmiores faciunt, et una cum aliis remediis stimulantibus, ad corporis vires incitandas, ac sustentandas, haud parum conferunt. Nec negandum est, quin haec saepe miris

modis perficere valeant; quanquam ut supra notatum, cantharidum stimulus raro totum corpus multum afficit, magis vero parti cui admotus continetur. Horum quae sequitur explicatio, nobis maxime probabilis videtur. Ubi debilitas plurimum grassatur, sanguinis circuitus, ad partes extremas praecipue, languidus sit: his autem, stimulo locali admoto, sanguis majore velocitate transmittitur, quod magis efficitur, si vinum aliaque remedia stimulantia ac tonica simul interne adhibeantur, quae vim cordis et arteriarum sanguinem ad extremas propellentem augent. Ad hoc, vesicantia in his morbis stimulo locali potius quam generali gaudere, ex hoc constat, quod ulli corporis ipsius parti, non adeo ut carpis talisve imposita proficiant; dummodo consilium non sit, morbum cujusdam partis localem sublevare; quod si ita fieret, vesicatorium parti affectae quam proxime imponere semper necesse est. Hoc esse vero consentaneum, ipse qui exempla vidi testari possum. Sed eo magis adducor, ut credam, sciens idem probasse experientiam viri inter medicos clariss. Doctoris Gul. *Saunders* apud Londinum, qui in suis de medicinae praxi praelectionibus hanc rem praecipue notavit.

Quamvis vesicantia, in febribus genere typhode ac nervosis dictis, a multis claro nomine medicis, celebrata fuerunt; alii tamen ea saepe nocere sibi compertum affirmant: nec dubitandum, quin vesicatoria sine discrimine usurpare, vel quod absurdum est, complura simul impondere, incommoda aliquando attulerit, eaque immerito neglecta fecerit. Doctores *Gilchrist* *), *Gregory* **), *Percival* ***), mala a vesicantibus in febre adhibitis orta observarunt. *Baglivius* etiam definite de hac re loquitur, „delirantes ab usu vesicantium plures mortuos vidi, quam sanatos ****).“

*) Vid. Edin. med. essays Vol. 4. p. 298.

**) Praelect. clin.

***) Med. et exp. essays, Vol. I. p. 187.

****) Vid. Dissert. de vesicantium usu et abusu. Op. Om. p. 456.

Hi auctores quidem spectatissimi sunt; nobis autem videtur, vesicatorii incommoda esse pauca ac rara, prae magnis bonis ex eo rite adhibito paratis, quod praecipue confirmavit experientia longe lateque patens Doct. Lind *), qui hocce remedium in suis scriptis saepe summis laudibus effert **).

Sub initio febrium inflammationis signis stipatarum epispastica parum necessaria, vel etiam noxia plerumque putantur, nisi una pars inflammatione praecipue afficiatur. In febribus maxime malignis, (putridis dictis) quidam medici, ne epispastica gangraenam inducerent, timuerunt; quod quidem nonnunquam evenit, et in febribus hujusmodi, et in cynanche maligna, ubi ad ultimum gradum processerint; at per primos utriusque morbi dies, vesicantia applicata saepe multum profuerunt. Chirurgus qui bello ad Indiam occidentalem proxime gesto, multos aegros febre maligna laborantes curavit, me certiores fecit, vesicatorium magnum regioni epigastricae admotum, insigniter valere, ad vomitum violentum compescendum, qui cum inflammatione erysipelatosa ventriculi atque intestinorum simul conjunctus fuit.

*) Vid. Lind on Fevers and infection ; passim.

**) Attamen Doct. *Gilchrist* epispastica in febribus non omnino prohibere voluit, tempus quo, partesque quibus saepe applicantur, tantum reprehendit. Ad eorum incommoda vitanda, ita praecipit. „Upon the first appearance of the head being affected, as when the urine turns pale, when they sigh, and have great Anxiety, are deaf, or the eyes sparkle or look staring.“ tunc toti capiti epispasticum imponere suadet, quod optimos edidisse effectus dicit. Vid. *Edin. Med. essays*. Vol. 4. p. 299.

Hic nobis addere liceat aliquid dignum notatu, quod narrat Doct. *Whytt* (viz) ubi inter delirium in multis febribus premeus, non membranae cerebri, sed cerebro ipso, vesicatoria nil opitulari; semperque se cerebrum ipsum affici suspicari, ubi delirium nullo capitis dolore, vel oculorum rubore praecedentibus, supervenerit. Vid. *Philos. Transact.* Vol. L. P. 2. p. 578.

DEINCEPS DE VESICANTIUM UTILITATE IN VARIIS INFLAMMATIONIBUS DICERE AGGREDIAR.

Morbi in hoc ordine positi adeo abundant, ut eos singulatim recensere, me iudice, non necesse sit; omnibus enim bene noti sunt. Illi maximi momenti quique hujus remedii utilitatem in caeteris phlegmasiis satis monstrabunt, sunt i pleuritis ac Peripneumonia. De vesicantibus in his morbis adhibitis olim dubitarunt medici, cogitantes ea propter suum stimulum morbum augere; pleraque enim stimulantia in Inflammationibus hujusmodi esse noxia notum fuit. Haec autem mera opinio: experientia enim omnes sese doceri cupientes, jam satis docuit, hocce remedium non solum tutum esse, sed inter efficacissima, quae materia medica prae se fert. Illud dixit *Huxham, de Haen, Pringle*, aliique multi: nec multos nostra aetate auctores scio, qui idem non sentiunt. Quibus sententia diversa adhuc manet, qui experientiam omnino contemnunt, quique suis opinionibus ac hypothesebus toti sunt dediti, eos tantum rogo, ut hujus remedii in his morbis periculum aequum facerent, quamprimum illis occasio oblata erit.

Doct. *Whytt*, qui ad vesicantia animum diligenter advertit, multaque de eorum effectibus in lucem prodidit, ea non solum pulsum vim et crebritatem non augere, sed saepe etiam minuere invenit *); quod efficere visa sunt, inflammationem partis internae compescendo. Nam ut jam dudum repertum est, „duobus doloribus simul obortis, non in eodem loco, vehementior obscurat alterum **).“ Sic forsan epispasticum cuti in phlegmasiis quam proxime parti affectae impositum, ad inflammationem minuendam multum conferat. Inflammatio interna, quae hos morbos facit, partes membranaceas occupat, quas physiologi omnes majore sentiendi facultate praeditas sciunt, ac inflammatas multi doloris esse causam. Hic etiam, hae membranae adeo organae vitae omnino necessariis junguntur, ut totum cor-

*) *Whytt's Works*. p. 242.

**) *Hippoc.* lib. 2. Aphor. 46.

pus cito laboret, sanguinis impetus augere, symptomata febrilia saevire incipiant. Ubi vero inflammatio externa excitetur, sanguinis quantitas major ad partem cui vesicatorium admotum transmittitur; vasorum distensio actioque nimia in parte maxime laborante minuuntur; ideoque affectio totius corporis sublevatur: „for as there seems to be only a certain degree of nervous Energy exerted in the body at one time, the increase of its action in one part will necessarily diminish it in another *).“ Inde intelligi potest quomodo vesicatoria sanguinis impetui, ac pulsuum crebritati moderentur. Ita optime explicantur vesicantium operandi modus utilitasque, in omni inflammationis specie. Commoda enim epispasticorum nobis oriri videntur, non a liquore effuso, qui (si solus respiciatur) adeo est parvus, ut pro nihilo habendus sit; sed ab inflammatione ac dolore magis externe quam interne saevientibus, atque a magna sanguinis copia, ex parte interna inflammata derivata, quo auxilium datur, tanquam a sanguinis detractioe locali.

Auctor tamen ille celeberrimus nunc citatus (Doct. *Whytt*) vesicantia his morbis sub initio usurpare non vult **). Idem sentit auctor maxime spectandus Doct. *Cullen*, qui ea non imponere suadet, nisi prius sanguis, quam liberrime liceat, missus fuerat; si enim, inquit, citius applicantur, sua irritatione faciunt, quo minus sanguinis detractio iterata proficiat ***). Attamen celeb. *Pringle* multum in hac re versatus, morari vetat; dicens, se in exemplis, ubi morbus plurimum urgebat, epispastica imposuisse, antequam sanguis vel semel emissus fuerit; credereque satis fore si sanguis mitteretur, priusquam cantharides stimulare caeperint; atque epispastica plerumque citius certiusve opitulari, ubi statim post primam sanguinis missionem admota sint ****). In eandem sententiam iverunt et multi alii, praecipue au-

*) Percival Med. and exper. essays Vol. I. p. 204. n. a.

**) *Whytts Works*. p. 720.

**) Vid. first Lines Vol. I. p. 340.

****) *Diseases of the army* p. 141.

tem Doct. *Gregory*, qui in praelectionibus clinicis affirmat, epispasticum morbi principio adhibitum, ut sanguinem iterum detrahere non necesse sit, facere. Idem etiam, in conspectu medicinae theoreticae, illa, tanquam remedium morbis hujusmodi idoneum, multum commendat, ubi dicit, „et prae omnibus in variis inflammationibus, quarum fere omnibus vesicatoria partibus affectis quam proxime imposita insigniter opitulatur; quod profecto inter certissima et utilissima hujus seculi reperta non immerito recenseri potest *).“ In omnibus inflammationibus internis, praeter eas, quae renes et vesicam urinariam occupant, epispastica utilissime adjuvant. Cur hi morbi excipiuntur, satis constat. Nam cantharides absorptae, proprium stimulum in meatus urinarios ostendunt, ac plane noxiae sunt; ideoque rebus ita sese habentibus a medicis plerumque prohibentur. Earum vice sinapismi et rubefacientia alia sunt laudata; et vesicatorium in his morbis, si unquam utamur, ubi primum aliquid inflammationis levis excitaret, amovere oportet: camphora ante ejus applicationem rite addita, atque medicamentis mucilaginosi diluentibus simul adhibitis.

DE VESICANTIUM USU IN EXANTHEMATIS.

Duo tantum notabo, rubeolas nempe et variolas. In rubeolis ubi symptomata catarrhum referentia admodum ingravescant, vesicantia usui sunt; eadem de causa qua in pleuritide ac peripneumonia juvant. Cum macularum eruptio subito evanuerit, ac simul partes internae multum laborarent, remedium haud parvi momenti aliquando repertum est.

In variolarum quibusdam gradibus, epispasticorum commoda pariter sunt nota. *Huxham* eorum utilitatem in multis exemplis expertus, ea bene commendat. Praecipue necessaria sunt, ubi caput multum laborat, ubi respiratio difficilis est, (quo tempore capiti, cervici, aut pectori optime applicantur) ubi debilitas totum corpus invadit, pustulis depressis, maximeque, ubi manus et pedes non op-

*) *Consp. Med. theor.* Vol. 2. p. 596.

portune tument, quod merito malum putatur. Utcunque enim explicandum sit, satis notum, membrorum tumorem ac inflammationem fere semper indicare, partes internas bene sese habere. Tumefactio mihi videtur, quasi vis vitae index. Si enim debilitas multum urgeat, harum partium tumor et inflammatio plerumque deficiunt. Unde colligere fas est, vesicatoria carpis admota, hic similiter opitulari, ac in typho, antea notavimus. Epispastica enim manibus pedibusve imponendo, id quod natura afferente, salutare est, efficere conamur; et hoc insigniter proficere, observationes Huxham, Hillary, et aliorum demonstrant. Aliquid simile in podagra evenit, morbo forsan rectius inter phlegmasias ponendo, cuius tamen in hoc loco mentionem faciam, quod huius remedii utilitatem magis illustrat, ejusque operandi modum in utroque morbo clarius explicat. In podagra pes inflammatus, mala partes internas occupantia sublevat; si vero pedis inflammatio quovis casu abacta sit, symptomata maxime timenda superveniunt, quae partem per vesicatorium, vel sinapismos irritando optime tolluntur.

Quanquam vesicantium in variolis usus, ex magnis auctoribus pendeat, quidam eorum applicationem vetarunt, duabus de causis. Inprimis, dicunt, cutem satis irritationis ab pustulis frequentibus pati; magis per vesicatoria irritare, inhumanum fore. At si experientia eorum commoda confirmaverit, argumentum hujusmodi pro nihilo habendum sit. Deinde, ne gangraenam variolis confluentibus inducerent epispastica, timuerunt. Hoc quidem in quibusdam exemplis ubi corpus maxime in putredinem est proclive, cavendum. Quoniam vero haecce in putredinem proclivitas raro adsit, aut parum valeat, quoniam epispastica aegris quam plurimis proficere, raro vel nunquam nocere repertum fuit, ea igitur non rejicienda, nobis sententia stat.

IN HAEMORRHAGIIS.

De epispasticorum in his morbis usu, nihil ex propria experientia proferre possum. Nonnunquam feliciter adhi-

bita sunt, ubi morbus fere lethalis fuisset. In haemorrhagiis commendat Clariss. Cullen, qui ea per vim antispasmodicam agere existimat. *). Quatenus haec ita sese habeant, dijudicare non possum; mihi autem videtur hujus remedii operandi modum, et in his et in multis aliis morbis obscuritate involutum latere. Phthisi Pulmonali incipienti saepe profuerunt, ac, ni fallor, inter remedia ad morbum tam perniciosum praecavendum idonea jure sunt ponenda; ubi nempe causae praedisponentes et catarrhus a frigore leviter, sed saepe invadens, morbum instare docent.

IN PROFLUVIIS.

Contra catarrhum ac dysenteriam nonnunquam opitulantur vesicantia. In societatis regiae actis philosophicis Doct. Whytt **) quaedam exempla narravit, quae eorum utilitatem praecipue in catarrho inveterato, satis monstrant.

IN CLASSE MORBORUM QUAE NEUROSES VOCATUR.

Morbi sub hac classe sunt plurimi. Aliis praetermissis hos tantum magni momenti, ac contra quos vesicatoria maxime adjuvarunt, nunc dicam. Horum primis est paralytis sive generalis sive localis. At vesicatorii utilitas in paralyti locali manifestius apparet. Nonnulla traduntur exempla in observationibus medicis Londinensibus, ubi epileptica super os sacrum imposita, vesicae urinariae ac membrorum inferiorum paralytin felicissime sanarunt. Ibi nobis suadent, ut in his morbis vesicarium quam proxime nervis, qui ad partes affectas ducunt, imponamus. Ita enim impositum prodesse multum, minime autem cruribus ipsis admotum, satis confirmavit experientia. Historiam adolelescentulae febre gravissima aegrae, narrat Cl. Dr. *Percival*, quae sub morbi finem multis signis paralyticis, epilepticis, aliisque id genus correpta fuit. Haec

*) Vid. first lines Vol. 2. p. 314.

**) Vid. Vol. 50. p. 2. P. 101.

per remedia idonea sublata sunt. Posthac omnino caeca facta est, sine ulla evidente causa, ac sine vel minimo oculorum dolore. Sagax ille medicus, oculis diligenter observatis, morbum esse guttam serenam, ab retinae paralyfi originem ducentem, suspicatus est. Quamobrem aegrae frontem subinde linimento volatili forti ex Ol. Olivarum et Sp. C. C. cum calce viva partibus aequalibus composito, fricari iussit, et aliquid ejusdem unguenti parti semper admoveri. His remediis visendi facultatem aliqua ex parte recuperavit, quae tamen non permansit. Inde linimentum non satis stimulare existimans, ille vesicatorium fronti admovendum suavit, cujus irritationem ubi primum aegra sensit, res quasi per nebulam videre potuit, et magis magisque dum remedium suos ederet effectus, acies reddebatur, et postea incolumis mansit. *)

In apoplexia aliquando usurpantur epispastica, tardius autem agunt, quam ut multum auxilii afferrent, nisi forsan in levioribus morbi gradibus, quos Doct. *Cullen* in sua nosologia, carum, lethargum etc. nominavit. In hemiplegia, apoplexiam sequente, vesicantia capiti vel nuchae cum bono fructu imponuntur. Nec fortasse inutile foret, epispastica in apoplexia ipsa adhibere, una cum caeteris remediis plerumque in hoc morbo usitatis.

Morbis, qui a debilitate aut motu imminuto in functionibus vitalibus, seu naturalibus pendent, vesicantia non conveniunt: nec saepe in functionum animalium morbis spasmodicis tentantur. Parum utilia in asthma spasmotico vero existimat Doct. *Cullen*, quanquam et *Hoffman* et *Whytt* ea multum contra hunc morbum valere invenerunt. Multis dyspnoea laborantibus vesicantia plurimum proficere (etsi causa saepe fallat) satis certum est.

Vesicantia, ut antispasmodica, contra morbos, qui a partibus, intestinorum spasmodice constrictis pendent, e. g. colicum, propter connexionem et consensum intestina inter corporisque tegmina, saepe usurpantur.

*) *Essays Med. et exp.* Vol. I. p. 210

In motibus convulsivis abnormibus musculos cujusdam partis invadentibus, vesicatorium remedium praestantissimum est, testante Doct. *Wytt*, qui aegrum musculorum abdominalium motibus alternis laborantem, epispasticum abdomini imponendo, sanavit. Idem emplastrum vesicans parti affecta admoveere suadet, ubi primum manifestum erit, epilepsiae paroxysmos ab aura epileptica oriri, quo in casu omnium efficacissimum ducit. *)

In hysteria ad hoc vel illud symptoma levandum conferunt, aut ad paroxysmum arcendum aegrarum animos a quibusdam rebus (quae antea inducere solitae sunt) avertendo; nullo modo autem per se ad curationem perficiendam valeant.

In morbis intellectum afficientibus, e. g. mania, praecipue si recentes sint, saepe utilissima sunt: et hic proficere videntur, partium subjacentium irritabilem naturam tollendo.

Quidam morbi inter *Cachexias* positi haud raro per vesicatoria sublevati sunt. Contra tympanitem, (morbum infrequentem) ea laudat *Percival* ex Auctoritate Doct. *Mead*. In anasarca cruribus aliisque partibus tumentibus, bono successu saepe usurpantur; quippe quae humori effuso exitum vel viam qua effluat, praebeant. At cavendum est, ne eorum in his casibus applicationem excipiat gangraena, quod nonnunquam evenit.

Multi quidem alii sunt morbi, quibus magnopere profuerunt vesicatoria; dolores nempe inveterati in variis corporis partibus, et complures locales. Exempla sunt dolores capitis per longum vexantes; dolores rheumatismi chronici, variae molestiae artus occupantes, quae a tabe venerea, seu scrophulosa originem ducunt **). Tumores icirrhosi colli aliarumve partium glandes obsidentes curatu difficillimi. Ubi hi tumores adsunt, vesicantia quam proxime secundum cursum vasorum lymphaticorum, quae ad glandulas ducunt, imponere debemus, „the finer parts of the

*) *Wytt's Works* p. 687.

**) Epispastica tumoribus spinae adhiberi suadet Cl. *Monro* vid. *Prael. anat.*

cantharides being absorbed by the lymphatics, are carried immediately to the obstructed glands, and by their stimulus tend to discuss those indolent Swellings *).

De his omnibus copiose loqui, et rem tanti momenti ac magnitudinis tam accurate quam aequum est dicere, nec vires ingenii, nec breve temporis spatium sinunt. Spero tamen me morbos gravissimos saepiusque occurrentes selegisse ac notasse. Denique si hoc tentamen ad medicamenti in materia medica locum excelsum tenentis naturam veram utilitatemque investigandam alios minime docuerit; hoc saltem mihi laboris oblectamento et solatio erit, me inter hanc rem indagandam complura perutilia didicisse.

*) Percival's Essays Med. et exp. Vol. I. p. 193.

III.

DR. FERDINANDI DEJEAN

DISSERTATIO CHEMICA,

QUA EXPONITUR

HISTORIA, ANALYSIS CHEMICA,
ORIGO, ET USUS OECONOMI-
CUS SODAE HISPANICAE.

LUGDUNI BATAVORUM,

1 7 7 3.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1900

ADAM SMITH 1723-1790
THE THEORY OF MORALS AND POLITICS
1790

1000 1000 1000 1000

1000

1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000

DISSERTATIO CHEMICO-OECONOMICO-PRACTICA,

QUA EXPONITUR

HISTORIA, ANALYSIS CHEMICA, ORIGO
ET USUS OECONOMICUS SODAE
HISPANICAE.

CAPUT PRIMUM.

HISTORIA SODAE HISPANICAE.

§. I.

Cineres combustionem et calcinationem *plantarum salinarum* variarum, in locis maritimis vel salinis sponte vel cultura provenientium, acquisiti, sive sint pulverulenti, sive in massis durioribus compacti, ex quibus certis encheiresibus elicitur species *salis alcalini fixi*, quod ob peculiarem ipsius dotem *crystallinum, fossile, nativum*, vel *siccum* appellatum fuit, nomine generico *sodae* insignitur.

§. II.

Soda, qua prae caeteris utimur, in littoribus Hispaniae orientalibus praecipue conficitur et ad nos defertur, unde plerumque *soda Hispanica* per excellentiam audit. Nec tamen Hispania harum plantarum salinarum sola ferax est, ut non in aliis regionibus quoque ut indigenae reperiantur, nam et in *Sicilia et Languedocia et Normannia*, Galliae provinciis crescunt, ex iisque simili, qua in Hispania, methodo conficitur soda: sic olim ex *Aegypto et Syria* haec merx in Europam sub nomine *Rochetta Levantica* adferebatur, et adhuc nomine *Cinereum Syriacorum* ad praesens venit.

§. III.

Soda ergo ortum ducit ex *plantis salinis* varii generis, quae prope littus maris, praesertim regionum calidiorum, ut et circa lacus quosdam sale impraegnatos, nec non juxta salinas sponte crescunt: in nonnullis tamen regionibus, ut

ampliores messes colligant, hisce vegetabilibus multiplicandis cultura student indigenae.

§. IV.

Multifariae quamquam sint plantarum falsarum species, illas tamen ad quinque subsequencia genera commodè referri posse arbitror; sunt autem herba *kali*, *salsola*, *salicornia*, *mesembrianthemum*, *fuci* et *algae*.

§. V.

In *Hispania* sodam ex diversis *kali* speciebus comburendo acquirunt; at in *Murciae* et *Granatae* regnis, Regi Hispaniae subditis, prae caeteris *kali Hispanicum*, *sedi foliis brevibus*, culturae subjiçunt. In *Languedocia* e satis feminibus *salicorniae annuae* sibi copiam sodae faciunt. In *Normannia* ad eundem scopum colligunt incolae plantas quas cumque a mari in littus projectas, ut et illas, quas mari recedente ex scopulis nudis relictis excerpunt; has plantas, quas ad *fucos* et *algas* pertinere crediderim, incolae nomine *Vareh*, *Varec* vel *Goemon* insigniunt. In paucis *Angliae* littoribus incolae ex iisdem, quibus Normanni, plantis suam sodam sub nomine *Kelp* praeparant.

§. VI.

Ex diversorum auctorum alto silentio nil certi statui posse mihi videtur circa plantas, quibus *Siculi* ad suam conficiendam sodam utuntur: ex similitudine tamen, quam licuit anno praeterito in Gallia explorare, istius sodae cum Hispanica, pronus sum ut hujus Siculae sodae ortum adscribam herbae *Kali*.

§. VII.

Reliquit nobis in Hist. Natur. Aegypt. PROSPER ALPINUS tres plantarum icones, quae ab Egyptiis *Kellu* dicebantur; ex hisce plantis ad usus artis tum saponariae tum vitriariae confecisse cineres perhibet; primae harum plantarum speciei *Kali geniculati* nomen, secundae *Kali albi*, tertiae denique *Kali Egyptiaci* nomen tribuit. Sedulo examnanti autem apparebit primam esse verae herbae *Kali* spe-

ciem; Clar. LINNAEUS secundam speciem pro *mesembrianthemo nodifloro* habet; dubius tamen haerere videtur perspicacissimus in Botanicis vir ad quam classem tertia Alpini species adscribi debeat; nam nunc ad plantagines, nunc ad *mesembrianthema* refert; in primo casu erit *plantago Indica*, in secundo *mesembrianthemum Copticum*.

§. VIII.

Auctorum nullus, quod sciam, recensuit plantas, ex quibus in Syria cineres acquiruntur, sed Parisiis degens ex AMICO, VIRO NOBILISSIMO et in botanicis acque ac aliis scientiis versatissimo, relatum accepi, quod, dum ante aliquot annos sat magnam cinerum Syriacorum qaantitatem sibi comparaverit, his cineribus admixtus esset insignis ramorum plantae lignosae unius speciei numerus, cumque diversi ramuli adhuc floribus suis instructi erant, facile ipsi fuerit hanc plantam pro *mesembrianthemo* salutare.

§. IX.

Nec tamen, ut jam vidimus, in quibuslibet regionibus contenti sunt incolae plantis falsis ad littus maris sponte crescentibus, sed ut sodae mercaturam extendant et inde lucrum petant, in agris frumentariis mari vicinis semina *kali* terrae committunt, quod praecipue in confiniis urbis *Alicante* (*Alicante*) fieri solet; nec nocent tritico hae plantae, cum versus aestatis finem propullulare tantummodo incipiant, nec plenam maturitatem adipiscantur nisi circa autumnum. Similis fere methodus in usu est in Languedocia, et forte in reliquis regionibus, ubi haec cultura locum habet.

§. X.

Maturas hasce plantas, sive sponte sive cultura acquisite, in areas huic negotio destinatas sternunt, si anni tempestas humidior est; sed caelo sereno sub dio expandunt, ut calore solis exsiccentur; fructus sponte decidentes legunt in futuros usus. Plantae exsiccatae in horreis conservantur, et quando ipsis sat magna harum copia est, ad has comburendas sese accingunt.

§. XI.

Combustio ac calcinatio ubique locorum fere iisdem encheiresibus perficitur: foveis nimirum in terra plus minus amplis ac profundis excavatis, quas *furnos* vocant, bifariam hos furnos interposita ferrea craticula dividunt in partem inferiorem sive cinerarium, et in superiorem, in quam herbas siccatas immittunt, et stramine accenso in cinerarium immisso siccatae plantae flammam capiunt, quam adjectis aliis atque aliis plantis continuo alunt; cineres interim per craticulam in inferiorem furni partem, qua data porta, decidentes sese accumulunt; cinerum sic continuo depluentium calor conservatur,isque adeo incrementum, ut sufficiens sit materierum salinarum liquefactioni promovendae; tandem consumtis sic per flammam omnibus plantis, superaddunt ignem suppressorium, quo torquentur cineres, et accedente demum sensim sensimque frigore concreescunt in glebas terreo-salinas coloris glauci, duritiae rupeas, ut malleorum ictibus repetitis diffringi ab opificibus debeant.

§. XII.

Ex iis, quae §. VIII. dixi, conjecturari licet, in *Syria* simpliciter in aperto aëre comburi hasce plantas fere eodem modo, ac nos utimur, dum ex concrematione plantarum sales fixos obtinere animus est. Hujus conjecturae ratio haec est, quod haec soda nunquam, uti mihi relatum est, in *glebis* conspiciatur, sed semper in *statu pulverulento* divendatur: habent praeterea hi cineres sat copiosas plantarum non combustarum reliquias admixtas, quae plantae certe combustae fuissent, si in furnis supra descriptis calcinatio instituta fuisset.

CAPUT SECUNDUM.

ANALYSIS CHEMICA SODAE HISPANICAE.

§. I.

Ex descripta nunc operatione, ni fallor, patet, salem alcalinum, fixum, nativum hic non purum ac nudum obtineri; violenta enim ignis actio partes vegetabilium crassiores,

terreas a nexu, quo invicem cohaerebant, solvit, easque cum sale intime miscet: forte et aliam materiam addunt opifices, unde et sodae inter se certant pro majori minorive quantitate et puritate salis, quam in suam mixtionem recipiunt. Quamquam hujus rei generalis regula condi nequaquam possit, quoniam forte natale solum, vel ipsa operatio plus minus protracta, vel et additamentum aliqualem differentiam inducere valeant, tamen tuto asserere licet, inter *sodas* primas tenere *Hispanicam*, circa urbem Alone confectam; *Malagensis* et *Sicula* dein sequuntur; tertio veniunt cineres *Syriaci* et *Carthaginenses*; quartum locum occupat soda *Monspeliensis*; infimum denique locum habent *Varech* Normannorum et *Kelp* Anglorum.

§. II.

Characteres, quibus optima soda a viliori dignosci potest, sunt sequentes: 1°. quod glebae sint ex griseo nigricantes, leviter ad caeruleum vergentes; 2°. quod illae sint compactae, ponderosae, sonorae, et si malleorum ictibus diffringantur, quod in fracturis ostendant lacunulas sive foraminula, quae a peritioribus oculis *perdicum* ob similitudinem comparantur; sint 3°. hae glebae ad contactum siccae, nec spirent odorem ingratum; 4°. sapore debent esse salsae alcalinae: His notis, a Clar. Jussieu datis, addi poterit 5°. ut hae glebae, si loco humidiori ac calidiori asserventur, in superficie monstrent puncta alba, efflorescentiae dicta; dein in farinam fatiscant. E contra glebae colore albidiores donatae et quae sapore parum salsae se ostendunt, hae minori quantitate salis alcalini fixi mineralis gaudent. Glebae in totum nigricantes et odorem hepatis sulphuris eructantes salem alcalinum fossilem magis impurum recondunt; hacce etiam de causa a certis opificibus, ut minus idoneae, rejiciuntur.

§. III.

Cum varia opificia utantur soda ob salem alcalinum fixum nativum, quem in sinu suo fovet, operae pretium erit inquirere in aptam methodum, qua hic sal non modo purior, sed et majori quantitate obtineri queat. Erat autem hic scopus, quem mihi proposueram in instituendis

experimentis sequentibus. Hinc sodam Hispanicam optimae notae tundi curavi in pulverem, ut sic aucta ejus superficie aqua undiquaque eam alluere possit, ad omnem contentum salem facilius extrahendum.

§. IV.

Sodae sic in pulverem tusae *libras* x. commisi dolio, superaffudi aquam pluvialem puram frigidam ℥ xl, per mediam horam instrumento idoneo mixturam hanc agitavi; sex horis elapsis aqua saporem falsum urinofum contraxerat; liquor supernatans satis limpidus erat; ejus sumsi ℥ x, filtravi et ad siccitatem evaporavi; obtinui salis ficci *uncias* II, *drachmam* I β . Sex horis denuo elapsis ab eodem lixivio alias x. *libras* desumsi, eoque filtrato ac evaporato ad siccitatem accepi salis ficci *uncias* II, *drachmas* III, *scrup* I. Videns lixivium meum quo diutius steterit super sodam, eo plure sale impraegnatum iri, praevia hinc agitatione facta, per biduum lixivium super sodam remanserat, dein filtrato et evaporato hoc lixivio supererant mihi salis ficci *unciae* XIX, *drachmae* III: sic ut de toto hoc lixivio aqua frigida facto a sodae *libris* x obtinuerim salis ficci fere *uncias* XXIV.

§. V.

Sodae a lixivio residuae novas xl *libras* aquae frigidae superaffudi, et bene subinde agitata hacce mixtura reliqui per triduum; decantatum tunc ac filtratum lixivium supernatans adfudi aliis *decem libris* sodae pulverisatae in secundum dolium, reliqui per XII horas nec intermissa agitatione: decantato tunc liquore eoque filtrato, et ad siccitatem evaporato, accepi salis ficci *libras* III, *drachmas* VI β . Idem opus ad secundam vicem repetii et obtinui salis ficci *libras* III, *uncias* III, *drachmas* I β . Tunc residuae sodae secundi dolii superaffudi *libras* xl, aquae frigidae, qua bene agitata reliqui per triduum, decantavi liquorem superstitem, eumque filtravi et superadjeci aliis x *libris* sodae in tertium dolium immisissae. Mixtura hac subinde agitata per quatri-duum reliqui, decantavi liquorem superstitem et residuo novas xl *libras* aquae addidi, similiter tractavi, mixta haec duo

lixivia et evaporata mihi dedere salis ficci *libras* III, *uncias* II, *drachm.* III β .

Ex processibus §. IV. et V. hujus Cap. apparet, ex *libris* xxx, sodae me extraxisse cum *libris* cc aquae frigidae salis ficci *libras* decem, *uncias* XIV, *drachmas* III, quod pondus ad centenarium applicatum daret circum circa $\frac{36}{100}$; supposito tamen, omnem salem eductum fuisse.

§. VI.

Cum gustu explorarem residua §. IV. et V. saporem manifeste salsum et alcalinum in illis adhuc deprehendi: hinc coctioni repetitae cum aqua haec subjeci usque dum insipida essent, et lixiviis ad exsiccationem deductis, salis ficci adhuc *libras* IV, *drach.* III β . accepi.

Hinc experimentum hoc repetendum duxi, et adhortatione Clar. GAUBII, Praeceptoris mei multum Venerandi, eandem sodae quantitatem, scilicet *libras* xxx, cum sextuplo aquae pondere coctionibus repetitis subjeci; et hae xxx *librae* sodae mihi dedere salis ficci *libras* XVI, *uncias* VII, *drachmas* V. Sic calculo facto, acquirimus ex centenario sodae circum circa salis ficci *libras* LV.

Notandum hic, quod sodam huic operi subjiendam prius in pulverem tusam calcinaverim, et opus hoc taedii plenum esse, quisque mecum experietur, cum nec sextuplum aquae ad sodae pondus sufficiat, ut omnis materia salina elici queat: hinc, ut tamen residuum ab omni sale liberatum haberem, nec lixivium, etiam inspissatum, suo sapore alcalinum maxime se monstraret, ut labori et sumtibus parcerem, aquam ultimis coctionibus adhibitam abjeci. Nec hisce experimentis diffitearis, quaeso, B. L. si non eandem vel majorem ex soda obtinebis salis ficci quantitatem; jam monui §. I. hujus Cap. difficulter hujus rei exactum calculum dari posse ob varias rationes; praeterea et mihi et aliis accidit, sodam quandoque diversis speciebus mixtam divendi.

§. VII.

Observavi in facienda horum lixiviorum evaporatione, si certa aquae quantitas dissipata est, et sal superpondium

acquirat, quod in superficie lixivii hinc inde nascantur parvae pelliculae, quae numero auctae se invicem petunt, et totam lixivii superficiem tegunt; tunc pellicula cito in fundum delabatur. Quum hanc pelliculam cochleari foraminulento extraxi, et examinis causa microscopio subjeci, vidi constanter hanc pelliculam ex numero infinitis crystallulis lamellatis, imbricatim sibi applicatis constare; sed prout evaporatio protrahitur, non amplius haec pellicula conspicitur, nec formatur, sed partes salinae in fundo se colligunt, nec formam distinctam referunt; sensim sensimque materies inspissatur, speciem pultis acquirit, dein sub jugi agitatione ad siccitatem perducitur: cavendum tamen ne pars in fundo concreseat; hinc spatula ferrea continuo materies in fundo agitata, et si, ut fieri solet, sal in grumos cogatur, illi pistillo ferreo contundendi sunt; tandem eodem igne et auctiore calcinatur materies, ut scilicet phlogiston, quo usque fieri potest, excutiat, sicque materies, quae primo utcumque fusca erat, sensim in albedinem transit.

§. VIII.

Ex dictis §. VI. sequitur, quod si in animo sit omnem salis quantitatem in soda contentam extrahere, non sufficere aquae sextuplum pondus superadditum, sed insuper debet ebullitio sodae cum aqua institui, cum aqua frigida non nisi partem salis elicere valeat: quamquam verum sit ex §. IV. quod aqua eo plus sit saturata, quo diutius super sodam steterit: interim mihi videtur commodius, et temporis et sumtum in evaporatione compendium fieri, si sensim portio sodae operi admoveatur, et cum penitus emuncta est talis portio, ultimum lixivium super novam sodae portionem addatur, ut sic ebulliendo se iterum impraegnet sale, quantum fieri possit.

§. IX.

Ut nunc explorarem naturam salis acquisiti per processus descriptos §. IV. V. VI. de hoc sale sicco §. VII. sumsi *libras xxvii*, quantum fere centenarium dimidium, facto calculo, mihi dederat. Nemini mirum videbitur, me tantam salis copiam simul operationi subjecisse: cum ad usum

oeconomicum haec scripta sint, et Chemicis sat notum sit, majore copia operationi commissa, materias diversas, unde constant corpora, sic accuratius examinari et a se mutuo segregari posse, quam si parva modo quantitas adhibeatur. Has XXV II. libras salis ficci aqua pluviali filtrata dissolvi, solutionem filtravi et evaporationi commisi; haec evaporatio continuabatur, donec parva portio de tempore in tempus desumpta et in capsula vitrea deposita, crystallos monstraret frigesacta. Tunc lixivium filtratum in patinas fictiles intus vitreatas et satis amplas reposui, ac loco frigidiori per duos dies servavi; tunc defuso liquore supernatante inveniebantur in fundo vasorum crystalli praegrandes, nitidae, purae. Defusum liquorem 2^{da} et 3^{tia} et 4^{ta} vice evaporavi, ac crystallisationi commisi, et crystallos inde acquisitas vidi prioribus similes. Hisce quatuor crystallisationibus obtinui salis crystallini puri *libras XLIV. uncias II. β.*

§. X.

Quinta vice evaporationi commisi superstitem liquorem, sed forte fortuna evenit, ut per quinque vel sex dies aliis negotiis impeditus ad hunc laborem non attenderim; tunc accedens ad meam crystallisationem, defuso supernatante liquore, vidi attonitus crystallos meas non modo tectas, sed et intra ipsas crystallorum lamellulas sese interposuisse *materiam quasi gelatinosam*. Cum non immerito crederem, hanc materiam aqua esse insolubilem, crystallos una cum hac materie dissolvi, filtravi per chartam emporeticam, mansitque super filtrum materies, quae exsiccata mihi praebebat *terram* quam albissimam, sicque separavi a meo liquore et sale.

§. XI.

Hunc liquorem cum priori §. praeced. superstite miscueram atque novam evaporationem, non tamen adeo protractam, ut crystallisatio instare videretur, institueram: lixivium ergo in vasa fictilia conjeci et reliqui per tres dies; defuso tunc liquore supernatante, parietes vasorum crustula alba obducti erant; illa ablata, adfudi aquam limpidam tepidam, huc illuc agitatione facta, separabatur haec crusta

in duas partes, unam teneriorem, quam cum aqua in filtrum deduxi, ubi inhaesit; altera solidior, lamellosa, videbatur similis illi, quae crystallos §. X. tegebat. Aquam a lotionē residuam asservaveram in patina fictili, sed videns illam turbidam fieri, agitata prius tota hac aqua, dimidiam ejus partem filtravi, et post aliquod tempus rediens vidi in filtro remansisse gelatinosam materiam, amylo albo admodum similem; reliqua dimidia pars aquae in patina relicta in similem gelatinam concreverat: hae gelatinae exsiccatae apparuere mihi similes materiae terrae §. X. ex gelatina acquisitae. Hujus terreae pauculum in fictili cum *unciis tribus* circiter aquae reliqueram, haec aqua post quinque dies in gelatinam pellucidam conversa erat, et haec similis erat carniū gelatinae, et denuo exsiccata praeuit terram modo indicatam.

§. XII.

Monere hic debeo, quod quando institui crystallificationem immediatam lixiviorum, a coctione sodae obtentorum, sine praevia salis exsiccatione, *fere nunquam* hanc terram et gelatinam accepi, sed omni sale, in lixivio contento, exsiccato, inveni semper et constanter, et eo abundantius, quo fortius sal exsiccatum et calcinatum fuerat. Anne per hanc exsiccationem et calcinationem pro parte sal alcalinum destructum fuit?

§. XIII.

His experimentis factis, evaporavi de novo liquorem superstitem, ex quo mihi crusta terrea §. XI. nata erat: interea temporis dum fervebat evaporatio, floccos hinc inde in hoc lixivio natantes vidi; hi filtrationem suadebant; hacque facta remanserat in filtro terra, quae exsiccata coloris minus albidus erat, sed caeterum similis illi, quae gelatinam praebuerat §. X. et XI. Liquorem filtratum tamen de novo evaporationi exposui, usque dum crederem crystallificationem inflare; frigefactus liquor steterat per quatuor dies; decantato tum liquore nullae crystalli, sed potius materia, quam *argillaceam* diceret, parietes vasorum obsidebat.

§. XIV.

Liquorem decantatum denuo evaporationi subjeci ad usque quid salini praecipitari videbatur: crystallulos jam

elapsas separavi et sedulo servavi; erant hae lamellofae A. Liquore supernatante bifariam diviso, in fundo praecipitabantur miculae salinae indeterminatae conformationis B. In superficie et ad latera videbantur crystalluli acus formam referentes; aliquot harum se invicem adeo proxime tangebant, ut plumulae barbam esse diceres C. His crystallis intermixtae erant aliae planae, figuram parallelogrammaticam affectantes D. Quantum potui, separavi a semet invicem has crystallos, opportuniori tempore illas examinaturus.

§. XV.

Liquor supernatans decantatus, denuo evaporatus usque dum similes crystalluli crustosae §. XIV. conspiciebantur, iterum in duas partes divisus, similes crystallulos B. C. D. dedit, hac tamen cum differentia, ut hinc inde intermixtae apparuerint verae crystalluli solitariae salis alcalini fixi mineralis. Steterat decantatus liquor per biduum, et parietes vasis obducti erant veris crystallis salis alcalini fossilis.

§. XVI.

Bis adhuc talis evaporatio et crystallisatio facta fuit, cum simili plane effectu, nisi quod secunda vice praeter crystallos etiam materia argillacea se praecipitaverit in fundum vasis. Argilla haec, aqua pluries abluta, se meram terram monstravit. Interim lixivium spissius et coloratius factum recusabat crystallisari, qua de causa totum inspissavi ad siccitatem.

§. XVII.

Crytalli salis alcalini fixi fossilis, quas §^{is} praecedentibus accepi, ponderabant ℥ II. *uncias* VI ℥ . Sunt hae crytalli, quas Chemicus intendit in depuranda soda, sunt hae, inquam, quae salem alcalinum fixum fossilem vel nativum in puriori forma repraesentant, quae et similes sunt illis §. IX. acquisitis. Est hic ille sal, quem sic depuratum *saponarii*, *vitriarii*, *lotores*, *docimastae*, aliique opifices ad usus suos cupiunt. Inquiram postea in veram hujus salis naturam, sed operae pretium est adducere experimenta, quae

institui ad cognoscendam salium B. C. D. naturam, qui in sua conformatione tam diversos crystallos praebebant.

§. XVIII.

Ergo unicuique salium B. C. D. speciei adfudi separatim acidum vitriolicum concentratum; ut ut nunc erant forma diversae, mirabar ex unaquaque vaporem album, densum, in atmosphaera fluctuantem et omni dote acidum salis referentem eructari: et ut circa acidum nullum dubium mihi superesset, adjeci pauculum istorum salium ad aquam fortem, in qua aurum recusabat solvi, sed quam primum salium horum miculae erant immixtae, solvebatur aurum: unusquisque horum salium prunae inspersus crepitabat. Ex his experimentis, praecipue ex duobus prioribus, aliqua homogeneitas videbatur dari in his salibus, praesertim circa acidum. Hinc omnes has crystallos inter se mixtas aqua dissolvi, et hac solutione filtrata evaporationem institui: accepi sic partim *tartarum vitriolatum*, partim *salem marinum purum*, partim *salem marinum regeneratum*, vulgo *digestivum Sylvii*; quamquam vix, ac ne vix quidem ultima haec duo salia a se invicem satis distingui queant, tamen, ut spero §. XX. hoc B. L. clare apparebit.

§. XIX.

Interim recusabat et hoc lixivium amplius crystallos excutere, hinc evaporavi ad siccitatem, et miscui cum residuo sale exsiccatum §. XVI. ut examini subjicerem.

§. XX.

Ut autem et Lectori et mihi satisfacerem circa conjecturam in fine §. XVIII. adductam, salem acquisitum, bene exsiccatum, in retortam immisi eo scopo, ut ope acidi vitriolici, tanquam fortioris, excuterem acidum salis; quo facto debebat mihi duplex sal nasci, nempe *tartarus vitriolatus* et *sal mirabile Glauberi*, si scilicet conjectura mea vera esset. Apparatu bene disposito ad hanc operationem, et cautelis omnibus notis adhibitis, in recipiente mihi acidum salis collectum fuit, et in retorta remanserat massa albida, quae in pulverem tusa et aqua soluta mihi praebeuit verum

falem *tartarum vitriolatum* et falem *mirabilem Glauberi*. Unde veritas conjecturae apparet.

XXI.

Restabat nunc, explorare *residua* §. XVI. et XIX. Sapor illorum alcalinus erat: effervecebant cum acidis quibuscunque. Hinc determinabar hanc materiam residuam, prius aqua pura solutam ac filtratam, saturare solutione crystallorum tartari. Facta saturatione denuo filtravi hanc solutionem, et evaporatione sat magnam copiam tartari solubilis, parum salis Seignette et nonnullos salis communis cubulos accepi. Residuus a crystallisatione liquor recubabat excutere crystallos: hinc guttatim instillavi acidum vitriolicum, ut hoc abundaret, et obtinui minimam quantitatem, quasi *faeculam coeruleam*, similem illi, quam HENKEL in supplem. vel appendice *Florae Saturnizantis* refert se obtinuisse ex lixivio cinerum *Kali* vel *salicorniae* potius, quam collegerat ad fontem salinum *Teuditzensem*.

Non abs re fore credo, si aliqua hoc *coeruleum* spectantia Lectori Curioso hic offeram. Fere omnia sodae lixivia, dummodo non admodum curiose filtrata sint, *coeruleum Berolinense* exhibent, si acido minerali, praecipue vitriolico, supersaturentur. Hoc coeruleum copiosius obtinetur, si in idem hoc lixivium paucae guttae solutionis martis instillentur. Ultimum tamen sodae lixivium, sic et illud, ex quo sal mirabile Glauberi vel Seignette praeparatum est, si recusset amplius crystallisari, et tunc aqua calida diluatur, et instillatis prius aliquot guttulis *solutionis martialis*, affuso dein per intervalla *acido vitrioli*, supersaturetur, nascitur elegans coeruleum, quod aqua saepius ablutum et exsiccatum, colorem *ultramarini* aemulatur. Quamquam experimenta nondum instituerim, an hoc coeruleum oleis mixtum pictoribus inservire queat; hoc tamen certum, quod aqua gummosa si misceatur terendo, maxime elegantem ac durabilem colorem suppeditet; destruitur tamen, si alcali admiscetur, et protinus resurgit, si acidum superaddatur. Hinc patet necessitas supersaturationis. Sine dubio debetur ferro vegetabilibus immixto, quod cum phlogisto intimam subiit unionem, uti et videmus in coeruleo Berolinensi.

§. XXII.

Ex experimentis a §. hujus Cap. IX. ad XXI. constat, quot sales in soda obvii sint.

Primo, genii particularis sal, cujus naturam sequenti capite examinabo, et quod, si soda bonae notae sit, maxima quantitate inde extrahi potest.

Secundo, Sal marinus tum *verus*, tum *regeneratus*;

Tertio, Tartarus vitriolatus;

Quarto, Alkali fixum vegetabile.

Ex facto calculo apparet, ex *libris* xxvii salis ficci §. IX. me eduxisse *libras* xlvi, *uncias* ix salis crystallini; ponamus nunc, ut indubia experientia demonstrat, quod hae crystalli copiosissimam aquam imbibant, ut circiter dimidium illarum pondus aqua faciat; dimidiato pondere abstracto remanebunt *librae* xxiii, *unciae* iv β. salis ficci; quod pondus abstractum a *libris* xxvii, dabit superpondii *libras* iii, *uncias* xi β, quod pondus adimplebat materies tum *terrea*, tum *salina*, v. g. *tartarus vitriolatus*, *sal marinus*, *febrifugus Sylvii*, et *alkali vegetabile*; sic tamen, ut *salis marini maxima* semper *quantitas* daretur. Hanc salium proportionem non semper aequalem esse in diversis sodae speciebus, superius jam monui: forte plantarum maturitas, natale solum, anni tempestas, vel ipsa denique combustio ad hanc inconstantiam aliquid conferunt: sic mihi experimentis constitit, quod cineres, ex quibus Angli suum Kelp praeparant, quosque mecum ex Anglia apportaveram, ultra $\frac{3}{4}$ partes salis marini et pauculum salis Glauberi contineant: sic et Clar. GAUBIUS in cursu Chemico nobis ostendit salem ex falicornia Zeelandica obtinendum, merum esse cibarium. Num autem encheiresibus a Solertissimo Pharmacopola CADET in Act. Reg. scient. Paris. 1767. propositis haec falicornia, uti *Vareh* Normannorum, ita perfici queat, ut nostrates cineribus ejus ad sua opificia uti possint, tentandum foret ab incolis Zeelandiae.

§. XXIII.

Ad plenam sodae Hispanicae analysin superest, ut residuum, coctione repetita penitus emunctum, considerem. Hujus residui exsiccati color est ex griseo coerulescens; tactu subasperus est ille pulvis; sapor ejus quasi cre-

taceus; nihil plane salini habet; est enim clutissimus: pauciores particulas *ferreas* huic pulveri inesse, *magnes* detexit. Residuum hoc terreum adhuc in duas terrae species opitulante aqua dispelci potest; sc. in *teneriorem*, quae forte nil aliud est, quam terra vulgaris vegetabilium, et in *graviorem*, quae ex arena, luto pingui ad maris littora obvio commissa, forte exurgit. Sumsi hujus residui bene exsiccati uncias iv; in totidem partes divisi; unamquamque commisi vitro puro, ut explorarem, quid acida valerent in hoc residuum. Acida, quibus usus fui, erant concentrata, ut *vitriolicum*, *nitrosum*, *acidum salis marini*, *acetum frigore concentratum*. Affusis his acidis, statim major vel minor effervescencia, eaque nonnunquam impetuenta orta est: cum acido nitroso et salis marini ebullitio maxima facta est: acidum vitriolicum affusum excutiebat vaporem hepatis sulphuris aemulum, nec non parum hinc inde in spuma coerulei conspiciebatur; hujus mixturae color erat ex cinereo coerulescens, dum acidum nitrosum mixturae colorem nigrum conciliabat, et acidum salis colorem viridescentem monstrabat. Quibus etiam encheiresibus usus fuerim, nullam tamen crystallisationem obtinere potui: vidi quidem subsidentes paucos flocculos in vitro, quod habebat acidum vitriolicum; aemulabantur hi flocculi salis Ebshamenfis crystallos; tamen ob exiguam illorum copiam certi quid non licebat concludere. Acida vero cuncta aliquid terrae solutum continebant, quod affuso alcali puro per praecipitationem sese manifestabat.

§. XXIV.

Residuum hoc igni fusorio fortissimo in officina vitriaria expositum, elegans et satis pellucidum ex flavo viridescens vitrum exhibuit.

C A P U T T E R T I U M.

ALCALI FIXI MINERALIS EXAMEN CHEMICUM.

§. I.

Chemici omnes consentiunt in eo, quod sal crystallinum
§. IX. Cap. praeced. ex soda acquisitum sit naturae alcali-

nae: cumque sal hoc antiquioribus jam temporibus praecipue ex herba *Kali* educeretur, hinc Arabes huic sali nomen *Alkali* dedere, quod dein toti generi alcalinorum concessum est. Verum non nisi ab aliquot retro annis constitit, quod sal alcalinum minerale praeter generales alcalinorum proprietates sibi privas quasdam vindicet, easque constanter tueatur: unde factum est, ut ab aliis alcalinis fixis vegetabilibus fuerit distinctum, v. g. a cineribus *clavellatis*, *sale tartari* etc. Praeterea non sine ratione nomina ipsi fuere imposita, quae cum privis ejus dotibus apprime conveniunt: hinc sal alcali *fixum minerale*, *crystallinum*, *fossile*, *siccum* audit.

§. II.

Unicuique sat notum est, quod *salia alcalina fixa vegetabilium*, aqua soluta, si evaporationi committantur, ut inde crystalli acquirantur, has vix ac ne vix quidem excutiant, nisi horum salium lixivis certis encheiresibus tradantur: v. g. quas celebris Chemicus Monsp. MONTET in Act. scient. Paris. 1764 demonstravit; vel ut Cl. CARTHEUSER in Act. Acad. Elect. Mogunt. scient. util. T. I. cum publico communicavit; vel methodo Cl. HAHNII, Prof. Ultraj. Celeberrimi, quaeque ab Erud. M. D. LELYVELD in Dissert. Inaugur. de *salibus lixivis plantarum* proposita fuit. Verum enim vero *alkali fossile* aqua solutum, ad crystallisationis punctum evaporatum, constanter suas crystallos refrigeratione exhibet: hae crystalli si sunt solitariae, fere semper figuram rhomboidalem affectant, sed nonnunquam et constantius hae crystalli sibi invicem imbricatum accumulatur, apicem triangularem gerentes, simili fere forma, qua tegulae in aedium nostrarum tectis solent disponi; vel et nonnunquam oblongae et quasi glaciales sunt, et pulchre habitu exteriori conveniunt cum crystallis *salis mirabilis*.

§. III.

Alkali vegetabile sive exsiccatum in massam informem, sive crystallisatum fuerit, aeris *humiditatem* continuo attrahit, brevi in deliquium abit, nisi vitreis vasis vitreoque epistomio clausis probe asservetur: E contra *alkali fixum fossile*,

etiam humidiusculo aëri expositum, *siccum* manet et, si crystallisatum fuerit, tantum abest ut aëris humiditatem attrahat, ut potius propriam suam aquam, quae ad crystallos pellucidas veluti glaciales formandas in censum venire debet, et idcirco ab Illustr. STAHLIO *aqua crystallisationis* vocata est, amittendo in farinam sive pulverem albissimum fatiscat. Crystalli hae tantam aquae copiam sibi conjunctam habent, ut igni etiam lenissimo expositae illico fluant; si autem aëri per aliquod tempus exponantur (quod absque ullius salis alcalini proprietatis dispendio fieri potest) plus dimidio sui ponderis perdunt: etenim constanter inveni, quod, quando meas crystallos sic exposueram, ex *unciis xii uncias v β*, salis sicci obtinuerim.

§. IV.

Notabilis adhuc intercedit differentia inter *alcali minerale* nostrum et *alcali lixiviosum*, quod hoc ad sui solutionem minorem aquae quantitatem, quam illud, requirat. Sic Therm. Fahrenh. monstrante *gradum 50*. sumsi *salis tartari* purissimi *unciolam*, dissolvi in aqua pura destillata, eadem qua atmosphaera temperatura gaudente: ad ejus solutionem opus mihi erant *uncia i*, *drachmae ii*, *grana xlviij*; ad solutionem *unciolae salis alcalini fossilis, sicci* (iisdem adhibitis cautelis) *unciae iii*, *drachmae v*, *grana tria* requirebantur.

§. V.

Alcali fixi vegetabilis lixivio si per vices injiciantur *crystalli tartari* in pulverem comminutae, usque dum a novis crystallis alcali adjectis nulla ulterius excitetur effervescencia, et liquor saturatus filtretur, in moderato calore deponit crystallos lamellatas planas, apice terminatas: e contra, si lixivii *alcali fixi fossilis* cum tartari crystallis fiat saturatio, liquor filtratus, et ea, qua ad crystallisationem par est, ratione evaporatus, dat crystallos magnas, quae ad illas, in quas *saccharum candy* concrefcere solet, prope accedunt. Mira omnino alcali fossilis in producendis magnis crystallis potentia hic observanda occurrit. Uno verbo, alcali fixum vegetabile Tartarum Solubilem, alcali fixum fossile salem Polychrestum, Seignette dictum, constituit.

§. VI.

Alcali fixum vegetabile aceto destillato saturatum format *Terram Foliatam Tartari*, vel salem diureticum qui crystallisari nescit, et aëri expositus humescit. Eodem acido si saturetur *alcali nostrum fossile*, dat salem acus formam referentem, quique in ipso aëre siccitatem suam tuetur.

§. VII.

Non minus differunt *salia neutra*, quae ex combinatione binorum *alcalinorum* cum acidis mineralibus acquiruntur, si iis saturentur: nam ex combinatione alcali lixiviosi cum *acido vitriolico* exsurgit *Tartarus Vitriolatus*; cum idem *acidum* cum alcali fossili efformet salem *mirabilem Glauberi*. Duo haecce *salia neutra* non solum externis, sed et internis et sibi privis dotibus discrepant. *Acidum nitri* alcali vegetabili conjunctum *nitrum* facit, cujus crystalli sunt prismaticae: alcali fossile *acido nitroso* nuptum coalescit in *Nitrum Cubicum*, sal non solum conformatione, sed praecipue flamma sua in detonatione a priori diversum. Denique sal ortus ex connubio *acidi salis* communis cum alcali fixo vegetabili dat *salem communem regeneratum*, vel dictum *febrifugum Sylvii*; qui sal quamquam forma sua cubica, vel potius parallelogrammatica, multum accedat ad salem communem sive marinum, qui ex eodem acido et alcali fossili conflatur, et ideo difficulter distingui possit, tamen utriusque sapor, et binorum salium instituta per acidum vitriolicum vel nitrosum analysis diversitatem testantur.

§. VIII.

Nulla ergo fundamento inniti mihi videntur Auctores, Viri caeterum Egregii, qui *basin salis communis* non *salinam* dicunt, eam pro mera *terra alcalina* habentes: terra enim, quae ex sale communi affuso alcali vegetabili praecipitur, ideo secedit, quia ad experimentum sal marinum forte nondum penitus depuratum fuit adhibitum. Neque haec terra in veram salis marini constructionem recepta est, nec essentialiter ad illud pertinet, sed est *sal acido-terreum*, vel *Ebshamense*, et quod fere semper sal marinum nondum pu-

rificatum comitatur. Cum hanc praecipitationem obtinere nunquam mihi licuerit, dummodo sale marino optime depurato usus fuerim; neque si salem mirabilem Glauberi similiter depuratum experimento subjecerim; invitus dissentire cogor ab opinione Clar. W. G. KAHL in pereleganti sua Dissert. inaugurali. *De soda*, habita Francof. ad Viadr. in qua Clar. Auctor fortitudinem ac facultatem excutiendi alcali minerale alcali lixivioso adscribere videtur.

§. IX.

Sed redeamus porro ad nostrum *salem alcalinum mineralem*, qui exceptis differentiis allatis caeterum easdem vires exferit, ac *alcali vegetabile*, nisi quis saporem, qui in nostro alcali paulo mitior est, adducere vellet. Alcali fossile exsiccatum igni violentiori expositum in fusionem abit, magisque inde causticum evadit: hinc arenas et lapides, ab Historiae Naturalis Scriptoribus vitrificabiles dictos, aggreditur, hosque solvit et secum in vitrum pellucidum convertit. Cum calce viva tractatum nostrum alcali magis causticum redditur, tuncque facilius cum oleis expressis unionem init, et cum illis saponem constituit: De duabus autem hisce proprietatibus paulo fusius tractabimus in *ultimo capite*, ubi de usu salis nostri alcalini fossilis, quem in artibus mechanicis et oeconomicis habet, differere animus est. Denique alcali fossile cum sulphure per fusionem unitum, in perfectum hepar sulphuris colliquescit.

§. X.

Nondum, quod sciam, nostrum alcali nativum ad dephlegmandum spiritum vini, ut alcohol purissimum obtineatur, in usum vocatum est, nec ad decompositionem illorum concretorum, in quibus suspicio principii acidi est. In Dissertatione citata Clar. KAHL neoterice alcali fossile usurpatum video, quo fiat combinatio cum oleo aethereo terebinthinae. Forte haec intermissa sunt, quia hoc nostrum alcali difficiliore labore, quam quidem vegetabile, obtinetur, et hinc cariori pretio venire solet.

§. XI.

Neminem latet vis, qua pollet nostrum alcali in praecipitandis terris vel metallis acido solutis, quorum, si aci-

dis, quibus soluta tenebantur, liberata sunt, nonnullorum pro menstruo est: sed phaenomena harum *praecipitationum* ac *solutionum* nondum satis fuere observata, multo minus ipsa praecipitata de industria investigata sunt, an aliquid particulare sistant, unde dignosci queant ab illis, quae sale alcalino vegetabili praecipitata sunt.

§. XII.

Omnibus chemicis notum est, quod alcali fixum vegetabile ignis actione, quando calcinationi committitur, semper aliquid de suo principio salino amittat, adeoque *terrae* quaedam portio per solutionem in aqua secedat: si filtretur solutio, terra in filtro remanet; et hoc toties obtinet, quoties haec operatio repetitur, ut repetitis his calcinationibus et solutionibus tandem omne alcali in *terram* decomponi possit. Idem nunc accidit alcali nostro, quod, dum exsiccat, si non simus solliciti, praesertim circa finem, ne ollae ferreae accrescant crustulae: hae igne paululum fortiori comburuntur, et nigrescant, dumque aqua solvuntur, parum salis, sed copiosam *terram* relinquunt; sique hoc repetatur, in meram *terram* alcali fossile decompositum iri, quisque sibi persuasum habeat.

§. XIII.

Terrae hae ex salium alcalinorum tum vegetabilium, tum mineralium de compositione §. XII. residuae, quando ab omni adhaerente principio salino per aquam puram pluries affusam bene elutae sunt, naturam maxime diversam habere videntur. Terra ab alcali lixivioso relicta cum acidis effervesceat, et in speciem *gelatinae* haec miscela convertitur, amittit quidem terra haec, quando fortiori igne calcinatur, proprietatem cum acidis effervesceendi, sed non destruitur inde proprietas gelatinam faciendi. Vid. de hac re Clar. BRAND Tom. XVIII. Act. Upsal.

§. XIV.

Terra autem ab alcali minerali residua *gelatinam* ex se sola producit, sine interventu ullius *acidi*; dummodo adhuc humidula sit, cum aqua coalescit, et *gelatinam* facit simi-

lem gelatinae carniū pellucidissimae, §. X. et XI. cap. praeced.: sed si semel exsiccata fuerit haec terra, non amplius cum aqua unionem inire potest, et in hoc statu resistit *acidorum* vi: solummodo contigit observare, quod acidum nitri, quod super hanc terram ebullire feceram, parvam tantummodo ejus portionem solverit; quam conjectare licebat ex dilutione facta hujus acidi cum aqua destillata; affuso tunc guttatim alcali fixo purissimo, mixtura obnubilatur; quod factum non fuisset, nisi aliqua *terrae portio* per acidum nitri soluta fuisset.

§. XV.

Vir in chemicis peritissimus SWAB Act. Upsal. Tom. xx. dicit, se obtinuisse gelatinas similes dissolvendo in acidis speciem *Zeolithae*, quam vocabulo Suecico *Gaesten* designat; item ex vitris, quae additione calcis, cinerum betulae, et filicis parantur: obtinuit has gelatinas solvendo vitra in acidis mineralibus; si nunc alcali fixum adderet, similis nascebatur gelatina: addit praeterea, has gelatinas omnes exsiccatas, si aëri exponantur, humidum ejus attrahere (non addit tamen, num hae gelatinae prius edulcoratae fuerint, nec ne) rimas trahere, findi, tandemque in arenam tenuem dilabi: demum dicit, quando hae gelatinae aqua pluries affusa bene fuerint edulcoratae, tunc nec acida nec alcalia ipsis vim inferre valere. Tandem, si gelatinae illae bene exsiccatae igni violentiori, folle incitato, per mediam horam exponantur, sine perfecta illarum fusione tegitur superficies vernicis ad instar, molliores fiunt, et in fracturis sese farinaceas ostendunt.

§. XVI.

Terra ex alcali mineralis acquisitione residua format quoque *gelatinam*, quae insignem fovet cum gelatina Viri Praestant. SWAB analogiam, quae tamen cum illa nonnihil dilcrepat: *primo*, formatur sine interventu ullius acidi; *secundo*, quando semel edulcorata et demum exsiccata fuerit, ex aëre non attrahit humidum, sed fatiscit in pulverem; *tertio*, nec acidis nec alcalinis tunc afficitur; *quarto*, ante follem tractata per bihorium haec terra, verum vitrum, co-

lore nigerrimum, sine pelluciditate tamen, mihi dedit; quodque singularissimum in hac fusione deprehendi, erat, quod superficies aequabilissima *splendorem ex luteo metallicum* ostenderet.

§. XVII.

Inquirens in gravitatem specificam salis alcalini fossilis crystallifati purissimi, Thermometro Fahrenheitii denotante *gradum* LVI., invēni ejus gravitatem specificam respectu aquae pluvialis ut 1 ad $2\frac{236}{1000}$.

C A P U T Q U A R T U M.

DE ORIGINE ALCALI FIXI MINERALIS.

§. I.

Nostro adhuc aevo chemici salia alcalina ut ignis creaturas salutarunt: nec ipsis deērant argumenta, quibus opinionem suam fulcirent. Lubet praecipua huc adducere. Dum in originem alcali fixi (puta vegetabilis, nam alcali fixum minerale, qua tale, nondum erat cognitum) dum, inquam, in originem alcali fixi inquirebant chemici, vera haec erat eorum vulgo recepta opinio, quod sit ignis creatura, quod fiat ex materia salina, quae nil minus esset quam alcali fixum, ex qua nascitur novus ille sal, et praecipue ex triplici materia illum generari ajebant, nimirum ex sale acido, ex principio phlogistō et ex materia terrea, certa proportionē vi ignis inter se intime ita commixtis, ut novus ille sal nascatur. Si, quod verum est, fatear, eas plantas, quae plurimum acidi continent, copiosum in suis cineribus exhibere alcali vegetabile, certum est, et quo magis exhauseris plantas suo acido, eo minor alcali fixi quantitas inde acquiritur; nec tamen solum acidum, tametsi siccissimum sit, sufficit, nisi phlogiston accesserit; nam sicci acidi pauperiores plantae in cineres redactae vix, nisi perparum, alcali fixi exhibere solent, et si ipsas plantas principii inflammabilis maxima parte emungit, et in cinerem redigit chemicus, eo ipso id efficit, ut parum vel nihil alcali fixi vegetabilis producat. Nondum tamen acidum et phlogiston suffi-

ciunt, debet superaccedere terra: inde, si acidum habetur cum copiosissimo phlogisto conjunctum, ita tamen, ut terreum principium non accedat, non adeo alcali fixum producit: exempla omni exceptione majora sint nobis balsa-
ma, resinae, in quibus habetur acidum conjunctum cum copiosissimo principio inflammabili; si tamen haec corpora pingua concremantur, ex eo quod superest, et vulgo caput mortuum audit, parum cinerum, vix aliquid alcali fixi acquiritur: nempe terra fixa deest. Ex acido et phlogisto nascitur sub ipsa ignis actione sulphur, quod in altum abripitur et dissipatur: sed si tria haec conveniunt, credunt non sine ratione chemici, nasci alcali fixum, et inde deducunt varia alcalium phaenomena, quod nempe acida ament adeo alcalia, non quod contraria sint, ita ut non hic contraria contrariis pugnent, et acidum et alcali inter se conficiantur, sed, quod simile simile trahat; et quia alcali fixi praecipua pars est acidum, et acidum quidem siccissimum, ea de causa, quando acidum cum alcali in contactum mutuum venit, avidissime illud abripit, et in mutuos amplexus quasi bina haec ruent, ut mutuo attritu intime se conjungere possint. Exinde quoque deducunt, quare adeo facile deliquium patiatur alcali fixum vegetabile acri libero expositum: alcali enim hoc acidum habet maxime concentratum, nunc acidum concentratum est aquae amantissimum: inde deducunt demum, quam ob rationem alcali aqua frequenter solutum et exsiccatum semper aliquid terrae deponat; terreum principium nimirum maximam partem alcali constituere dicunt, et quousque hoc acido et phlogisto conjunctum intime est, aqua solubile redditur; et haec ipsa terra quasi basis est, in qua acidum illud defixum haeret; reiterata autem solutione aliquid de acido dissipatur; terra ergo acido suo liberata, jam porro renuit aqua solvi, sicque secedit. Speciosa sane argumenta pro stabilien-
da hac sua opinione! et fateor, primo intuitu illam omni exceptione carere, facile quemlibet sibi persuasum habere posse. Ast si cogitemus, sententiae hujus patronos ac naturae eximios scrutatores jam detexisse vegetabilia, ex quibus certis encheiresibus, sine concrematione vel violentiori igne, sed simplici pressione, decoctione et evaporatione

extrahebantur salia neutra, quorum basis vere erat alcalina: si et hoc addimus, quod, quando hoc alcali cum acido sale medium constituit, ejus natura nequaquam immutatur, illudque posse iterum iterumque recuperari, excusso acido, idemque adhuc vices vel centies repeti posse: haec si paulo attentius consideremus, merito dubitabimus de chemicorum opinione circa alcalia, quod sint merae ignis creaturae. Rem hanc in aprico posuit et indubiis experimentis ostendit Clar. Marggraffius, vir in chemicis peritissimus, cum tartarum sine igne, non tali quidem, qui vasis clausis agat, sed certe sine tali igne, cui possit vis adscribi acidum in alcali mutandi, quod etiam sine hoc adminiculo alcali fixum ex tartaro acquiri possit, ut dicas, existisse ante in tartaro.

§. II.

Experimenta Marggraffiana quidem non evincunt, utrum alcali hic nudum detur, an potius acido nuptum, et sic sale neutrum formans: etenim acida mineralia, quibus utitur, potentiam suam exserunt in expellendo acido vegetabili a sua basi alcalina et hanc sibi uniunt.

§. III.

Non diffiteor tamen, me saepius dubitasse, utrum nostrum alcali fossile magna ex parte nudum jam in herbis maritimis concremandis existeret, praecipue in illis, quae regionum calidiorum sunt incolae; an vero hoc alcali fossile, acido salis marini adhaerens, per ignis actionem violentiorem acido hoc expulso, tum demum sese nudum sistat: Ultimam si verum foret, nonne sequeretur exinde, quod ex fucis et algis, ex quibus Normanni suum Varch et Angli suum Kelp conficiunt, quod ex salicornia Zeelandica iisdem encheiresibus, quibus uti solent Hispani, Galli, caeteraeque gentes, soda, similis Hispanicae, praeparari posset? imo, ut superius jam dictum est, cum haec vegetabilia pro sale essentiali habeant sale communem cibarium, nonne, inquam, sequeretur, quod in omnibus terrae locis, si sal communis addito phlogisto, vel arena, vel lapidibus apyris in pulverem redactis, violentissimo igni exponeretur, alcali fossile obtineri posset? Ast, quantum scio, omnibus enchei-

resibus huc usque adhibitis nil nisi sal commune exinde educitur, recuperatur. Non ignoro quidem Clar. Lehmannum in sua praefatione ad opera chemica Clar. Marggraffii, lingua Germanica edita, scripsisse, peritissimum huncce virum secum methodum communicasse sibi cognitam, qua alcali fixum fossile maxima copia et vili pretio acquiri possit: an ex sale communi, an novum concretum faciendo, melatet, nec circa hanc rem diversa a me instituta experimenta quid detexerunt. Ut, quid de hac re et ego sentiam, candide fatear, sciat L. B. me in primam problematis nostri sententiam magis inclinare: interim antequam hac super re certiora experimenta instituere mihi liceat, non incongruum fore dubo, si illa huc adferam, quae me permoveant huic sententiae potius subscribere.

§. IV.

Anno praeterito in Anglia et Gallia degens, Viros ibidem Egregios, tum in chemia tum in medicina Peritissimos invisurus accessi, de his et aliis rebus ad has scientias spectantibus disseruimus: inter caeteros Vir Nobilis et Amicissimus, de quo jam verba feci Cap. I. §. VIII. experimentum sequens, omni, qua par erat, sedulitate et attentione a se institutum, lubenter mecum communicavit: scilicet retulit, se Mesembrianthemi, quod copiose invenerat in cineribus sodae Syriacae, sumsisse libras duas, hasque in aquae sufficienti quantitate ter coctioni subjecisse; haec decocta prius probe filtrata, mixta, evaporando ad consistentiam syrupi redegit; hujus si pauculum fumeret, affuso acido quocumque ingens effervescencia oboriebatur, unde concludebat, se veras alcali fossilis crystallos acquisiturum; spe tamen sua excidit, cum intra sex mensium spatium nec vel ullam crystallum obtinuerit; supernatante liquore defuso, qui semper facultatem cum acidis effervescendi conservaverat, vidit materiam faeculentam copiosam in fundo subsedisse; haec materia erat sapore alcalina, unde plurima affusa aqua hanc elixivavit; filtrato hoc lixivio, remanserat in colo maxima terrae quantitas; lixivium hoc evaporavit et ad crystallisationem deduxit, sicque intra nycthemeri spatium elegantes et veras alcali fossilis crystallos, omni dote

tales, accepit; liquore supernatante inspissato, aqua soluto, filtrato, evaporato, denuo crystallos similes obtinuit. Obiciebam Amico, quod forte fieri potuerit, miculas salinas in poris herbulae altius infixas fuisse, cum jam per longum tempus rami hi in cineribus sepulti quasi jacuissent, unde facile erat eas decoctione educere: sed respondebat, se idem experimentum bis repetiisse cum ipsa herba Kali, quam ex Hispania sibi adduci curaverat, et similis erat eventus. Cum hoc experimento apprime conspirat illud, quod a Peritissimo Chemico Monspeliensi Montet in Actis Parisinis 1762. institutum legitur: testatur Clar. ille Vir, ex salicornia, in Languedocia cultura proveniente, pressione se succum obtinuisse, quem dum filtraverat supra calcem, ut inde pinguedinem adhaerentem abstergeret; testatur, inquam, se hac operatione accepisse tum salem communem, perfecte talem, tum alcali fossilis haud parvam quantitatem.

§. V.

Menſe praeterito Januarii in Diario artis ſalutaris (Journal de Medecine) video obſervationem a Clar. et Peritiſſimo Chemico Pariſienſi Ruellio orbi litterato communicatam, qua cupit confirmare nudam alcali fossilis praesentiam in herbis Kali, dicitque, ſi rami hujus vegetabilis in aqua, acido quocunque minerali bene impraegnata, macerentur; ſi tunc lixivium filtratum evaporetur, obtineri inde ſalem neutrum, ſimilem illi, qui obtineretur, ſi acidum hoc nuptum fuiſſet alcali fixo minerali. Quamquam nullus dubitem de ſucceſſu hujus experimenti, tamen pace tanti Viri dixerim, hoc experimentum quidem probare, herbam Kali in ſuam conſtructionem admittere alcali foſſile, ſed nequaquam inde concludi poſſe, hoc alcali nudum hic dari: etenim ſi acido cuicumque nuptum ſit noſtrum alcali, et ſalem neutrum efformando ad compoſitionem herbae Kali concurret, per acida mineralia affuſa, ſi ſint fortiora, expulſo hoc acido, aliud ſe ſubſtituet; vel ſi acido ſalis marini, quod probabilius, jam nuptum ſit alcali foſſile, manebit talis, et ſalem communem praebebit lixivium. Longe certior foret conſuſio, ſi Clar. ille Vir acidum tartari vel aceti ſumiſſet.

§. VI.

Ex his experimentis apparet, alcali fossile inesse vegetabilibus, e quibus soda concremando acquiritur: sed, quod plus est, ostenditur §. iv. h. cap. etiam alcali fossile pro parte nudum in iis contineri: accedit, quod fere concipi nequeat, quomodo sal marinus etiam igne violentissimo possit decomponi, ut dissipato suo acido nudam sistat basin alcalinam.

§. VII.

Nec tamen hic gradum sistamus, sed ulterius inquiremus. Forte aliquis objiciet; supposito, salem alcalinum hic dari nudum, unde ergo ille advenit plantis? estne vegetationis opus? an hocce alcali ex regno minerali jam praeparatum cum succis in vegetabilia transit? Respondeo, abstrusa sane res est, et observationes deficiunt, quibus haec probari possunt. Hoc tamen verum est, nusquam laetius, nusquam abundantius, et quidem sponte, crescere vegetabilia, quae alcali fixum fossile largiuntur, quam circa maris littora, lacus, fontes salinos; unde merito mihi videtur concludi posse, quod, cum alcali nostrum ejusdem sit ac basis salis marini naturae, hinc forte una cum succo nutritio decompositum jam sal marinum in haec vegetabilia penetret. An vero in ipso terrae sinu haec decompositio fiat? suadere videtur veterum Natron, quod nil aliud est, quam basis salis marini; hinc et nudum nostrum alcali refert. Hujus generis sal a natura elaboratum pluribus in locis, praecipue in calidioribus, invenitur, diffitis quidem a mari, sed ubi credibile mare anterioribus saeculis exstitisse: sic v. g. in Aegypto, in Persia, de qua re legi merentur Prosper Alpinus, Schelhamerus et Modelius; in Coromandeliam circa urbem Tengenepatnam; sic nuperrime in Hungaria maxima copia hujus salis detecta est; sic quoque notum est, in fontibus foteriis plurimis, v. g. in Selteranis, Egranis, Schwalbacensibus etc. alcali nostrum reperiri.

§. VIII.

Ex allata hac opinione facilius forte explicari poterit maxima sodae inter diversas species discrepantia, et quare

optimam et copiosiore nobis suppeditant regiones calidiores, in quibus forte ob continuum solis colorem sal marinus decomponitur. Contrarium nobis testantur eadem vegetabilia in regionibus frigidioribus provenientia, v. g. in Normanniae, Angliae, Zeelandiae littoribus, ut et salicornia ad fontes salinos Teuditzenses crescens, quae vegetabilia, testantibus id Clar. GAUBIO, HENCKELIO aliisque Praestantissimis Viris, propriisque experimentis, nil nisi salem communem exhibent.

§. IX.

Nondum tamen hic dubitationis finis; nondum enim haec sufficiunt; sed ulterius probandum restat, in terris quibuscunque, in quibus Kali, Salicornia et Mesembrianthema, eorumque species sponte, vel cultura creiscunt, in his, inquam, terris dari quoque alcali fossile nudum, si haec vegetabilia illud largiantur: e contra quod in illis terris, quae hoc alcali non gaudent, ex Kali caeterisque speciebus, in illis provenientibus, extorqueri non possit hoc alcali; quod, quantum scio, nondum factum est: interim forte occasio mihi erit in hanc rem penitus inquirendi; ubi non deero hoc cum publico communicare. Videtur tamen Clar. DU HAMEL in hujus rei scopum collimasse, dum observationes Actis Reg. Paris. 1767. insertas instituit, quae videntur hanc quaestionem enodare: verum si attenta mente hasce observationes perlegerim, nescio, qui fiat, ut factis et allatis ibidem experimentis nondum subscribere possim, nec circa hanc rem maxime intricatam aliquid certi exinde hauriri posse, credo. Forte si experimenta majori cum cura instituta fuissent, ad progeniem alcali fixi fossilis aliquid determinari potuisset; et forte ipsa Clar. Viri DU HAMEL conclusio admittenda foret, dum dicit: ergo patet, quod solum, quod ipsa vegetabilia concurrant ad formationem salium, quae ex illorum cineribus obtinentur.

CAPUT QUINTUM ET ULTIMUM.

DE USU OECONOMICO SODAE HISPANICAE.

§. I.

Sal sui generis, quod maxima copia ex soda elicetur, cum juxta dicta §. I. Cap. praeced. alcalinae naturae sit, hinc

sequitur, quod ejus usus locum habere possit in illis opificiis, in quibus salia alcalina adhibentur: ob certas dotes tamen alcali fossile praefertur alcali vegetabili, sive ex cineribus clavellatis, sive ex ipso tartaro eliciatur, quoniam non adeo causticus est sal alcalinus fossilis, ac alcali vegetabile, facilius potest purificari, fusibilior quoque est, cumque non adeo corrodat partes, quibuscum miscetur, hinc ejus usus tutior, faciliorque evadit.

Tria mihi proposui opificia examinanda, quae pro magna parte huic nostro sali suam existentiam debent: sunt autem haec, *ars saponaria, telarum dealbatio, ars vitriaria.*

Non omnes encheireses, quibus utuntur hi opifices, describam, sed breviter tantum adducam praerogativas, quibus sal alcalinus fixus fossilis prae fixo vegetabili in his opificiis gaudet.

§. II.

Antequam tamen ad illa progrediar, levi verbo in transitu annotare ea animus est, quae lucretur docimasia in purificandis *luna cornua et regulo antimonii*: in reducenda enim luna cornua per ordinarias methodos multum argenti, metalli adeo pretiosi, deperditur; acidum enim salis, cui junctum est hoc metallum, cum sua natura maxime volatile sit, una cum eo, ignis actione accedente, abripitur argentum, et in auras dissipatur. Haec dissipatio quoque obtinet, quando sua natura volatilem antimonii regulum ab heterogeneis liberare volumus. Uni et alteri huic dissipationi resistit, si lunae cornuae reducendae, vel regulo antimonii purificando adjiciatur sal alcalinus, fossilis, ficcus. Debeamus has methodos, ut et diversas alias, Clar. et Indefesso Chemico MARGGRAFFIO, jam saepius citato.

Sed transeamus ad artes, quae quasi per praeferentiam nostro alcali utuntur.

§. III.

Sistunt se primo *saponarii*. Chemici sub saponis vocabulo comprehendunt concretum ex oleo et substantia salina, sive illa acida fuerit, sive alcalina; quae ultima facit, ut aquae oleum miscibile reddatur: sed in oeconomicis hoc nomen tantum conceditur concreto, quod ex oleo sive

vegetabili, five animali, et sale alcalino fixo formatur. In regionibus meridionalibus sapo conficitur ex alcali fixo fossili et oleo olivarum: in regione, quae Turcarum Imperatori subest, loco salis alcalini ex soda acquisiti substituitur *Natron*, quod in Aegypto maxima copia reperitur, et quod, ut jam superius innui, ejusdem cum sale alcalino fossili naturae est: in septentrionalibus regionibus cineres clavellati et animalium pinguedines, nonnunquam etiam olea piscium saponi conficiendo inserviunt.

§. IV.

Sapones in regionibus meridionalibus confecti consistentiae sunt durioris, sicciorisque, et praeferri septentrionalibus merentur: sic quoque pleraque opificia, quibus sapo pro adminiculo est, si pretium non obstat, saponem meridionalem praeferunt.

§. V.

Sufficiat hic vulgarem methodum conficiendi saponem communicare; eo magis, quoniam apud varias gentes vix differt. Sodae optimae Hispanicae grosso modo tusae sumitur certa quantitas, et tantundem calcis vivae; haec ultima in planitiem expansa aqua irroratur, non ut extinguatur, sed ut pasta exinde fingi possit; haec dein cum soda bene permiscetur, et dolio in fundo foramen gerente committuntur ambo; foramen epistomio clauditur, quod pro lubitu amoveri potest. Rebus ita dispositis, aqua superaffunditur; fit lixivium, quod amoto epistomio effluit ex foramine in vas suppositum. Tria sic fiunt lixivia, quorum primum fortissimum, secundum minus forte, tertium debilius est: primum lixivium cum plus sale impraegnatum sit, est caeteris specificè gravius, quod explorant opifices immisso ovo recenti, quod in superficie sustineri debet; in secundum lixivium plus demergitur ovum, in tertium adhuc profundius: hoc parum differt ab aqua simplici. Tria haec lixivia separatim conservantur.

§. VI.

Lixiviis praeparatis, sumitur olei triplum pondus ratione sodae; in ahenum immittitur oleum, in quod tamen

prius tres circiter fitulae lixivii tertii five debilioris immiffae erant; instruitur ignis, et materiae si fiat ebullitio, additur de tempore in tempus alia et alia pars lixivii tertii; si nunc oleum spiffiusculum redditur, sensim sensimque additur lixivium secundum; quod si bene mixtum fuerit, et olei consistentia spiffior facta, tunc simili modo cum lixivio primo proceditur, affundendo illud fitulatim; quando his vel ter affusum fuerit lixivium primum, ignis, qui huc usque satis violentus erat, plane supprimitur. Frigefactis materiebus, pasta saponacea supernatans eximitur, inque aliud ahenum deportatur: huic massae lixivii primi fortissimi duas vel tres fitulas superaffundit opifex saponarius, et ignis per gradus violentus instruitur, usque dum massa debitam consistentiam acquisiverit; tunc alius amanuensis instrumento ligneo quadrato hinc inde impresso foramina efformat, quae ab alio replentur lixivio secundo. Adhuc per duas horas ebullitio protrahitur, quibus elapsis ignis supprimitur et materies refrigerationi committitur per biduum circa, tuncque extrahitur sapo et eo replentur cistulae lignae, quarum fundus et parietes prius probe perfricti sunt calce extincta tenuissima. Fundus harum cistularum ita est inclinatus, ut aqua frigore ex sapone excussa facilius elabi possit.

§. VII.

Libra una saponis hac methodo confecti, juxta experimenta Clar. GEOFFROI Act. Reg. Par. 1739, inserta, continet *uncias x, drachmam I, grana LVI* olei; *uncias IV, drachmas III, grana XL* alcali fixi, et *unciam I, drachmas II, grana XLVIII* aquae.

Additur alcali fossili vel sodae calx viva, ut alcali exinde educendum causticum magis et activius evadit, et conubium facilius cum oleo ineat. Experientia demonstrat, hanc unionem eo fieri intimiorem, quo parcius qualibet vice additur alcali maxima aquae quantitate solutum; etenim si tria lixivia, superius descripta, simul et semel cum oleo miscerentur, alcali non nisi difficiliter cum oleo unionem iniret, eamque laxiorem.

§. VIII.

Hac combinatione oleum non modo redditur aquae miscibile, sed insuper ipsi nascitur proprietas, ut aliam sinceri olei et resinae quantitatem reddat huic menstruo, tantum non universali, miscibilem: et quamquam nec alcalia fixa, nec olea expressa, nec animalium pinguedines, quamdiu haec sincera sunt, solubilitatem in alcohole habeant, concretum tamen saponaceum nunc fit alcohole solubile. Hinc videmus, quomodo corpora alias et alias dotes et proprietates acquirant, prout ex aliis vel aliis admixtis concrecant.

§. IX.

Ut ut fortem et intimam olei et alcali in sapone concretionem sibi quis fingeret; sciat is, rem se ita non habere: nam acida quaecunque sive meraca, sive unita cum basi, quae minorem cum illis, quam alcali in sapone praesens, habet affinitatem, hanc unionem dissolvunt, tollunt. Hinc est, quod quotidie experimur, quando saponem dissolvimus illis aquis, quae copiam salis selenitici in sua mixtione gerunt, tunc acidum vitriolicum, quod cum terra calcaria unitum in selenite est, suam basin terream deferens se associat et jungit cum basi alcalina, quae in sapone est: oleum sui juris factum in superficie flocculorum alborum ad instar innatat. Haec res quondam non levis momenti et factu perdifficilis visa fuit, impedire scilicet has aquas, quae ab hoc phaenomeno *duriores* appellari solebant et adhucdum appellantur, impedire, inquam, illas aquas, ne saponis decompositionem moliantur; unde haec aquae ad varios usus oeconomicos minus aptae judicabantur. Sed si in hujus phaenomeni causam curiosius quis inquiret, videbit, nil facilius excogitari posse, nec aptius huic incommodo remedium dari, quam ipse sapo: nam cum selenites sit sal, quod ad sui solutionem maximam aquae copiam requirit, inde est, quod non adeo abundare possit in aquis, etiam pro durissimis habitis; hinc si hujus speciei aquae floccos faciant, signo saponis decompositi, si nova sensim portio addatur saponis, paulo post videbimus, oleum ab alcali suo liberatum, superficiei innatans, protinus resolvi eadem aqua, saturato nunc et suo ordine decomposito sale selenitico; omne, inquam, oleum

cum sapone ulterius admixto integerrime resolvitur, ac si aqua esset quam levissima et dulcissima.

§. X.

In decompositione saponis per acidum admixtum idem inde resurgit sal, qui fieret, si alcali purum cum determinato acido hunc constituisset. Hinc concludere licet, nostrum alcali et in hac operatione suam naturam tueri, nec immutari per hanc concretionem. Falleretur tamen is, qui similiter circa oleum ratiocinaretur: hoc quidem clarum, limpidum, caeterasque suas proprietates conservat, sed aliam praeterea nanciscitur, quam ante concretionem non habuerat: scilicet antea insolubile erat alcohole; nunc se hoc menstruo solvi patitur, ut caetera olea essentialia; quod forte evenit, quia alcali nostrum destruat materiam mucilaginosam, quae in omnibus oleis expressis et animalium quorumcunque pinguedine habetur: huic materiae mucilaginosae oleorum insolubilitas in alcohole tribuenda.

Haec circa alcali nostrum quoad saponarios sufficiant. Videamus, quemnam usum praestet alcali nostrum *lin-teo-rum lotoribus*.

§. XI.

Secundum opificium, quod pro Sparta sumseram, se sistit, *lin-teorum* vel *telarum dealbatio*. Bisariam commode dividi potest hocce opificium; primum pro objecto habet telas recenter ex manibus textorum traditas, ut illae dealbentur; secundum est illa lotio, quae lin-teamina portatilia, usu conspurcata in pristinam albedinem restituit. Scopus non est hic in minutias descendere; solummodo intendam, ut ea exponam, quae alcali nostro fossili competunt.

§. XII.

Telae vel lin-tea quando recenter a textoribus traduntur, fordescunt primo ex amylo, quo utitur opifex, ut fila, quibus catenam conficit, illiniat, ut eorum tensio aequalior sit: secundo, eadem haec fila colore quodam, quem ab ipso lino vel cannabi trahunt, tincta sunt; unde a duobus hisce vitiis debent liberari. In hunc finem telae primo in aqua tepida macerantur; sed haec sola non sufficit: debet

ergo menstruum efficacius in materiam colorantem agens adhiberi; hinc addunt alcalina vel et calcem vivam.

§. XIII.

Ufus horum alcalinorum maximam meretur circumspeditionem: primo, et hoc praecipuum est, debent eadem haec alcalina omni materia colorante orbata esse, nisi opifex abluendo unum colorem alteri velit substituere; secundo, debent haec alcalia tali modo esse comparata, ut non nisi tantam habeant activitatem, qua possit materies adscititia colorans tolli, nec tamen filo ipsi noceri. Ex neglecta hac attentione plurimum evenit, quod, si telae ab insolatione domum redeant, non modo in pondere multum amiserint, sed et in textura et cohaesione sua fragiliores redditae sint; unde levi negotio lacerantur, rumpuntur.

§. XIV.

Cineres clavellati, si bene calcinati sint, liberi sunt a quacumque materia colorante; verum alcali, quod continent, causticum magis est, quam alcali ex soda acquisitum: tamen soda vilioris notae hoc habet, ut colore inficiat telas, quamquam causticitate innocentior fila non laedat; sed soda optima, et praepriis ejus alcali purum, concentrat duas requisitas dotes; primo quod non inficiat telas materie colorante, nec fila in cohaesione laedat, dum interim telis niveum candorem conciliat. Calx viva, quae a nonnullis substituitur alcalicorum loco, conciliat quidem multo majorem albedinem, quam alcalia, sed nimis grassatur in ipsum linum. Alcalicorum cum calce viva combinatio melius dealbat linteamina, quam alcalia sola, nec etiam linum adeo corrumpitur, quam a sola calce viva fieret: hinc est, quod in plurimis hujus opificii officinis mos inoleverit hujus combinationis. In septentrione ad idem opus utuntur cineribus clavellatis, ob abundantiam viliori pretio venientibus: in regionibus australibus ob eandem rationem potius soda utuntur.

§. XV.

In borealibus regionibus utuntur cineribus clavellatis, qui prope Dantiscum et in Polonia conficiuntur: alii cineres

vel non bene dealbant, vel linum alterant, et nonnunquam illud maculant. Apud nos in more est, ut et cineres clavellati, et soda, et calx viva invicem jungantur. In australibus regionibus curant, ne cineres Syriacos ad hunc scopum assumant, utpote vegetabilium nondum combustorum reliquis scatentes, quibus lixivium et per consequens linum colore plus minus heterogeneo tingi posset. Nec Soda odore sulphureo, limoso vel lutofo imbuta, nec illa, quae odorem habet ovi incubati, indicio hepatis sulphuris praesentis, utuntur opifices: hae enim sodae non modo maculas indelebiles linteis imprimerent, sed quod plus est, lini cohaesionem certo destruerent. Hinc merito praeferuntur sodae Alicantenses, Mallagenles etc.

§. XVI.

Utuntur autem opifices nostri alcalinis, postquam adscititia a textoribus addita eluta sunt pro maxima parte lotionem et insolationem repetita; addunt nonnunquam et molendinarum continuas sese insequentes pressiones. Exsiccatae dein radiis solaribus telae doliis committuntur et detinentur per sex vel septem horas sub lixivio alcalino, calce viva fortius reddito; lixivium hoc depromunt, eique substituant aliud calidius; doliis exemptae telae insolantur, frigida irrorantur, ut auferatur lixivium; exsiccatae denuo eodem lixivio, sed fortiori, submittuntur: encheireses illae quinta vel sexta vice repetuntur cum hoc discrimine, quod lixivium semper fortius atque fortius admoveatur: similiter pergunt fumendo ad quintam et sextam vicem lixivium semper debilius: ultimo denique lacte ebutyrato macerantur, dum levis effervescencia conspicitur ex acido lactis evoluta et adhaerente telis alcali; denuo cum sapone abstergunt partes oleosas adhaerentes et facta per insolationem exsiccatione, complicantur lintea vel telae, machinis pressoriis comprimuntur, sicque divenduntur.

§. XVII.

Multo simplicior est encheiresis in purgandis linteaminibus, quae usui quotidiano inserviunt: etenim ut a pinguedine et sordibus expurgentur, simplex cinerum quorumcunque lixivium sufficit, quamquam perparum alcali habeat;

dein fapone et repetita faepius in aquam immerfione pri-
ftinae munditiei reftituuntur, ut ad ufus iterumque apta
reddantur linteamina.

§. XVIII.

Differtationi noftrae coronidis loco fit *Ars Vitriaria*,
cujus utilitates pene innumeras hic adducere fupervacuum
fore arbitror, nec hujus opufculi pagellae permittunt, cum
in volumen denfum potius excrefceret, fi recensendis iis in-
haerere vellem. Neminem praeterea latet, quid aedes no-
ftrae, quid ufus oeconomicus, quid Phyfica, quid Aftrono-
mia Foecundae huic Chemiae Filiae, arti vitriariae, de-
beant. Noftum erit examinare, quoufque alcalia, praeci-
pue alcali foffile, huc in cenfum veniant.

Innititur nimirum ars vitriaria falium alcalinorum pro-
prietati, qua, fi ficca fint, ad certum caloris gradum in fu-
fionem ruunt; et in hoc ftatu apta redduntur, ut poffint
certas terras (quae caeteroquin folae fortiffimo etiam igni
refifterent) fic difponere, ut una cum illis fluant, et mafam
homogeneam forment, quae fi frigefacta eft, denfa, fragilis,
et pellucida infar aquae eft, cui nomen *Vitrum* datum fuit.

§. XIX.

Alcalia fere omnia tum pura tum impura, ut vegeta-
bilibum cineres, elixati vel non; item falia neutra, quorum
bafis alcalica eft, quaeque ignis violentior decomponere
poteft, ut tartarus, nitrum, fimili admodum proprietate
gaudent: attamen vitra inde confecta inter fe difcrepant et
magis huic vel illi ufui apta redduntur: fic v. g. vitra vulga-
ria conficiuntur ex cineribus lignorum quorumcunque, ad-
jectis cineribus clavellatis vel foda, et arena lutea, fragmen-
tis vitreis; hae materiae ratione proportionis, qua mi-
fcantur, plus minus ignem violentiffimum requirunt ad fui
liquationem. Vitrum inde confectum folidum quidem eft,
fed fimul colore obfcuriori donatur, unde ejus pelluciditas
multum patitur, nifi in totum pereat.

§. XX.

Alcalia, quae admixtam habent majorem vel minorem
falis cujusdam neutri copiam, ut v. g. quae ex cineribus ple-
rorumque vegetabilium concrematione obtinentur, plus mi-
nus propria funt ufui vitrificationis, pro ratione naturae

salium horumce neutrorum, eorumque quantitate, qua insunt: sic v. g. si hi sales neutri sint naturae tartareae vel nitrosae, non alterant vel mutant materiam vitrificandam, cum ipsis proprium sit violentiori igne alcalisari: praeterea unicuique sat notum est, hos sales in ipsa incineratione jam decomponi, neque unquam in cineribus reperiuntur; cineres enim fere non alios sales neutros examinanti exhibent, quam salem *Febrifugum Sylvii*, *Salem Marinum*, *Mirabilem Glauberi*, et *Tartarum Vitriolatum*. Haec salia plus minus pro ratione suae naturae et quantitatis alcalicorum proprietati vitrificatoriae obstant, quoniam, ut haec ipsa salia fluant, requirant magnam alcali copiam: sic v. g. alcalica, quae plurimum tartari vitriolati admixtum habent, propria facultate vitrificante enervantur, quia tartarus vitriolatus, *difficilis* fusioni sal, ad sui fusionem requirit sat insignem alcali partem; secedit ergo haec pars, nec ad arenam, terram, lapidesque vitrificandos quid conferre valet: sal Glauberi *facilius* cum fluat, minus nocet vitrificationi, sed sal marinus vel febrifugus Sylvii, cum *facillime* fundantur, et in longum tempus protracta vitrificatione igne violentissimo *forte* pro parte alcalisantur, omnium minime obstant vitrificationi. Vitra ex materiebus, salibus hisce neutris plurimum scatentibus confecta, ut plurimum bullulis repleta sunt, exinde plus minus fiunt *fragilia*, quod chemici frequenter luunt: vitra, in quorum conflatione multum salis cibarii datur, habent et hoc praeterea, quod *lamellatim* secedat substantia vitrea.

§. XXI.

Cineres, qui alcalia plus minus pura recondunt, v. g. cineres filicum, Soda Hispanica optimae notae, vitra elegantissima, solida, pellucida producunt: illa tamen, quae ex soda vel alcali fossili fiunt, his proprietatibus majori gradu gaudent: accedit, quod massa mitiori igne fluat.

§. XXII.

Alcalia sive vegetabilia sive fossilia, dummodo purissima sint, optima ac elegantissima vitra constituunt; sed in illis tamen occurrunt diversitates similes ac §. praeced. de cineribus dictum fuit, qui haec alcalia continent: hinc merito soda et sal ejus alcali fossile praefertur in plurimis offi-

cinis vitrificatoriis. Sic Itali, sic Hispani, Angli, Galli in officinis vulgo *Ildephonse*, *Cherbourg*, *St. Gobin*, *Vauxhall* et *Newcastle* nonnisi soda, eaque optima, utuntur ad vitra sua conficienda. In aliquibus officinis soda talis, qualis est, operi admovetur; eam certae quantitati purissimae arenae commiscent: in aliis vero sale alcalico ex soda acquisito, eoque purissimo, utuntur; unde et vitra in ultimis his officinis confecta puriora, magis homogenea, pellucidiora esse solent, hinc praeferenda.

§. XXIII.

Quando §. praeced. dixi, vitra ex sale sodae confecta caetera sua puritate, pelluciditate antecellere, minusque colorata esse, quam illa, quae ex sale alcalico vegetabili ut ut puro conficiuntur, illa vitra, quae sola miscela salis et arenae fiunt, subintellecta volo: verum si his materiis minium vel alia calx plumbi adjicitur, vitra tunc ex hac miscela cum sale alcalino fossili praeparata, constantissime plus minus viridia sunt; dum e contra vitra cum alcali fixo vegetabili puro, arena et calce plumbi confecta sunt pellucidissima. Hoc phaenomenon ab opificibus mihi relatum fuit constanter observari: quatenus autem hujus phaenomeni sit causa, lubens et candide fateor difficulter enodandum mihi videri, eoque magis, quoniam similem inter fossile et vegetabile alcali discrepantiam in vitrificatione animadvertit Peritissimus MARGGRAFIUS *Tom. I. pag. 196.* ubi ait, Regulum antimonii cum alcali fixo fossili pro depuratione fusum exhibuisse scoriam vitream virescentem, cum alcali autem vegetabili excolorem, neque diversitatis istius rationem reddere audet.

Sunt haec, B. L. quae de Soda dicenda habebam; fateor, multa adhuc deficere; suppeditavit tamen haec materies in sua praeparatione varia phaenomena, a quibus prosequendis non sum alienus. Interim his esto contentus: digniora si licuerit assequi, ea communicare nullatenus deero.

IV.

WYERI GUILIELMI MUYS

MED. DR. ET HUIJ. ATQUE MATH. PROF. ORD. etc.

DISSERTATIO ET OBSERVATIONES

DE

SALIS AMMONIACI PRAECLARO
AD FEBRES INTERMITTEN-
TES USU:

UNA CUM

EPISTOLA PRAEFIXA AD REGIAM SOCIE-
TATEM LONDINENSEM.

F R A N E Q U E R A E,

1 7 1 6.



E P I S T O L A

AD

R E G I A M

S O C I E T A T E M L O N D I N E N S E M

D A T A.

WYERUS GUILIELMUS MUYS

R E G I A E

S O C I E T A T I L O N D I N E N S I S. D.

Quum ad latitantem quorundam Organorum Corpus Animale constituentium fabricam, et reconditam Laticum illa pervagantium indolem, observationibus et experimentis indagandam jam ab annis aliquot acrius incumberem, atque hujusce laboris majorem in dies singulos fructum voluptatemque caperem; ad hanc et alia accessit causa, quae me movit, ut non tantum de hoc instituto nihil plane remitterem, sed et in eo majore etiam, quam ante, studio peristerem; novi nimirum Muneris ratio, ad quod ea, qua quidem cuperem, dignitate tuendum ac sustinendum hoc studiorum genus maximopere pertinere sensi. Haec autem cum haecenus privato potissimum usui servirent, nisi quod paucula tantum Doctissimis quibusdam Viris impertiveram, quibuscum nempe mihi literarum commercium intercederet; ante biennium evenit, ut nonnulla a me observata circa abstrusam *Fibrarum muscularium* structuram, quae Discipulis tunc temporis demonstraveram, ab illis forte cum aliis communicata fuerint, atque ita tandem in manus inciderint illorum Hominum eruditorum, qui Gallico sermone elegans, illud, quod *Hagae Comitum* prodit, *Literatorum Diarium* conscribunt. Inde cum ab his in eo statim Opere vulgata essent, etiam Vobis, qui praeclaro et nunquam satis laudando consilio non ad Vestra solum, quantumvis egregia, sed et ad omnia totius Europae experimenta oculos eruditos

circumferre, atque ex iis utilia et novam Scientiis naturalibus lucem allatura feligere soletis, haec nostra alicujus momenti visa sunt, adeo quidem, ut ea splendidiore loco dignati hanc in *Acta Vestra* jam diu Orbis Terrae judicio ac testimonio quam maxime comprobata transtuleritis. Cum itaque haec tenuia laborum nostrorum specimina, quae jam quibusdam aliis Orbis eruditi Luminibus haud displicere noveram, pariter a tam angusto Philosophantium Coetu non improbari cernerem, a caeteris etiam observationibus cum Viris Doctis interdum communicandis minus alienus esse coepi; id praestantius fore ratus, quam si per plures et manus et linguas transeundo hic illic iis aliquid forte de nativa facie detereretur. Hac cum essem mente, in curulum accessit, quod ex iis, quibus *Illustrissimus et Excellentissimus Baro....* me honoravit, literis ad hoc propositum perficiendum Vestra me humanitate et benevola de nostris conatibus sententia allectum atque invitatum intellexerim. Inde ergo certior factus, Vobis, si quas transmitterem Observationes, gratas et acceptas fore, deesse nolui, quin hoc non solum studiosissime diligentissimeque curarem, sed et hac occasione summam meam observantiam et obsequium in splendidissimam vestram *Societatem* tot tantisque erga Rempublicam literariam meritis et per tantam annorum seriem continuatis illustrem testificarer. Quanto majore autem animi veneratione eximiam vestram eruditionem, sapientiam, atque excellentem in omni *experimentalis Philosophiae* parte peritiam prosequor, quam omnes omnium Gentium Doctissimi Viri suspicere et admirari non desinunt, tanto magis etiam mihi honori duco, a Vobis haud penitus indignum censei, qui et meam quamvis tenuem operam in hujus Scientiae, aut quae ejus partem constituit, *Artis Medicae* a tot praeclaris inter Vos Viris tantopere excultae incrementum conferam.

Cum ergo Observata Anatomica, quae Vobis jam ab initio dicaveram, re iterum perpensa, ante, quam ea perscriberem, novis experimentis aucta et instructa malletm, atque aspera tunc temporis hyems, ne hoc negotium exequi possem, impediret; hinc ad ea, quae in Praxi Medica ad majorem ejus perfectionem utilia atque accommodata nota-

veram, animum converti; et quidem eo magis, quia haec Scientia, quo majorem ac magis propinquum, quam caeterae, ad tuendam valetudinem, maximum Mortalium in hac vita bonum, habet usum, eo etiam praestantiora et diligentius exquirenda videntur illa, quae ad hanc amplificandam ac promovendam faciunt, experimenta.

Jam dudum autem praeclarae huic Scientiae nihil mihi aequae, ac haec duo, deesse visum; adcurata nimirum Medicaminum usitatorum et praesertim simplicium notitia, tam respectu virium, quibus pollent, quam dosis eorundem cum minimae, quae ad usum interdum sufficere, tum maximae, quae sine noxa, cum res postulat, adhiberi potest; et deinde ejusmodi Remediorum cognitio, quae Morbo alicui depellendo paria spem tam Medici, quam Aegroti, rarissime fallunt: quorum alterum ad Praxin Medicam nova accessione augendam et locupletandam, alterum ad eandem illis, quibus nunc habemus, limitibus circumscriptam multo magis perficiendam pertinet. Medicaminum enim tanta virium cum magnitudine tum constantia valentium quam mira sit paucitas, Vos equidem minime fugere existimo; horum ergo numerum uti minimum, ita defectum omnino maximum reputo. Caeterorum autem, quae jam sunt in communem atque vulgarem usum recepta, insignis quidem, si numerum spectes, copia comparet, aut si exploratas eorundem virtutes et certa aliqua ratione definitas secteris, maxima illorum inopia patet. Quae etenim, ut quidem ego sentio, de singulorum Medicaminum viribus scire cummaxime interest, ea profecto rarissime Medicorum voluminibus consignata repperi. Qualia praesertim haec esse arbitror, 1^{mo} In quam Morbi specie unumquodque Medicamen vel prodesse vel obesse compertum sit; sedulo cavendo, ne confundantur Morbi diversi ob unius aut complurium effectuum convenientiam vel pro uno eodemque vulgo habiti, vel saltem eodem communi nomine appellati. 2^{do} Qua saltem ejus dosi et quoties iterata opus sit, ut inde optatus aliquis prodeat in dato Morbo successus, et quousque haec innoxie augeri possit. 3^{tio} Quo morbi tempore, qua methodo et quibuscum de victus ratione praeceptis ejusmodi Medicamentum Aegrotanti dandum, et quibus in

casibus, si tales fuerint, illius usu abstinendum. 4^{to} Quantum et quale tunc inde observatum fuerit ejusmodi Morbo afferri decrementum; et quousque vel solus illius usus satis diu continuatus, vel aliis subsidiis necessariis adjutus, Morbo medendo sufficere visus. 5^{to} Utrum constans ut plurimum, an vero varius et incertus sit prosper ejusmodi Medicaminis eventus; et qualis fere inter eas, quibus successum habuerit, illoque caruerit, vices proportio obtinet. 6^{to} An haec omnia per observationes justo debitoque numero factas et fide relatas sint demonstrata, atque ita Lectori constet, quo dictis fundamento fides haberi possit. Taceo nunc, quam et his addi posse sentio, singularium illarum causarum notitiam, quibus efficitur, ut in eadem Morbi specie exploratae caeteroquin Medicaminis virtuti interdum neutiquam respondeat eventus, siue haec effectuum varietas a diversa aliqua Morbi aut Aegroti conditione, siue a differente victus ratione, aut anni tempestate, aeris temperie, siue ventorum constitutione, aut regionum discrimine, denique aliunde pendere comperiatur: etsi enim quodammodo perfectam hujusce negotii cognitionem in plurimis sane casibus ob summam rei difficultatem optandam magis quam sperandam putem, ad eam tamen, quoad fieri potest, adnitendum existimo, ut tanto certius in posterum Medicus futurum Medicaminis eventum praevidere possit. O quam praeclara, quam salutifera foret hac ratione concinnata Medicaminum historia! Quanta inde Medicantibus lux, Aegrotantibus salus, et omnium Artium praestantissimae dignitas accederet! Verum, prohi dolor, deprehendimus Nos ab hoc excelso hujus Scientiae fastigio tantopere abesse, ut de longe maxima Medicaminum etiam usitatorum parte ex Medicorum Scriptis vix quidpiam certi aut definiti ad quaestiones propositas quantumvis scitu necessarias responderi possit. Etenim hic voces ut plurimum obscurae, vagae, et plus nimio generales, quibus cum Morbos tum Medicaminum in illis effectus denotant: interdum etiam variae Pharmacorum operationes a sensuum observatione longe remotae, atque ex Authoris imaginatione et conjectura, non vero ab experientia depromptae: veri dosi limites saepe neglecti, aut ex arbitrio potius quam multiplici

experimento definiti: altum passim de illorum, quos Pharmacis adscribunt, effectuum inconstantia silentium: et denique experimenta ad comprobandas Medicaminum vires iterandi non solum, sed et ad ea provocandi desuetudo. Immo eorum plurimi, qui Remediorum vires enarrant, aliorum potius autoritate quam propria experientia nituntur; unde testimonia multiplicantur, certitudo vero nequaquam augetur: et qui experimentis etiam freti atque muniti videntur, unam saepe alteramve observationem, in qua voto respondit eventus, afferunt, caeteras autem, quae successu caruere, turpi silentio praetereunt. Hinc magnifica de Medicaminum virtute Medicorum elogia passim vana, fucosa atque fallacia. Hinc incredibilis in Arte confusio nata. Atque ita effectum est, ut Medica hac in parte Scientia, qua maxime quidem oportebat, minime omnium hactenus fuerit promota.

Quamobrem ab eo, quo ad Praxin Medicam accessi, tempore, cum memoratos in hac Arte defectus experirer, in id omni studio, cura et industria incumbere coepi, ut ex observationibus adcuratis, saepe repetitis, fide notatis, ac denique inter sese comparatis, certas ac definitas Medicaminum virtutes cognoscerem, atque ita mihi provecta magis aetate altiore Praxeos notitiam non infirmo sed stabili et certo fundamento subnixam compararem. Nunc autem ex hoc ipso apparatu Vobis offero huiusmodi Literis adjunctum Opusculum, quod, licet unius tantummodo simplicis Medicaminis, *Salis* scilicet *Ammoniaci*, vires ex observationibus deductas complectatur, Vobis tamen haud penitus ingratum fore spero, et, quia *Salis* huius effectus secundum methodi ante memoratae leges adcurate, quoad potui, determinatos, nec contemnendo Observationum numero demonstratos continet; et, quia praeclaram ac hactenus, quod scio, ignotam illius virtutem edocet, qua nempe non solum absque ullo alterius Pharmaci subsidio Morbis celeriter removendis sufficit, sed et singulari successuum constantia in tanta ejusmodi Medicaminum penuria sese maxime commendat. Observationes autem aliae prolixius, aliae brevius conscriptae, prout scilicet tunc temporis me de Morbi historia plus mi-

nusve certiores fieri contigerit: has tamen sic, ut ab initio notatae fuerant, retinere, quam ad compendii aequalitatem reducere malui, quo tanto melius inde patesceret, in quibus Morbi phaenomenis, et qualis, ac quanta ab ipsa *Salis* operatione mutatio succederet. Ut taceam, nunc varia hinc hauriri posse, quae etsi ad praesens institutum non pertineant, et forte nonnullis etiam leviora videri queant, ad accuratam tamen horum Morborum historiam a Medicis perperam neglectam contexendam faciunt, et tanquam *Data* ad illorum causas indagandas, easque non ex conjecturis, uti quidem haecenus, sed ex observationibus, quousque fieri potest, definiendas inservire possunt. Equidem dolendum existimo, quod Medici Morborum quotidie occurrentium casus conscribere adeo negligant, ut illorum etiam historiam, quae jam dudum omnibus numeris absoluta esse deberet, haecenus nobis non nisi admodum mancam et imperfectam reliquerint; cum eo ipso, quod Morbi sunt vulgatissimi, illorum observationes frequentissimum ac proinde maximum habeant usum. Quod tamen non ita velim accipi, ac si Casus quoscunque rariores flocci facerem: hi etenim Practicis etiam peritissimis magno interdum usui esse queunt, ut, si in similes quandoque Morbos inciderint, mox ab initio non tantum eorum progressus et exitus, sed et totam medicandi rationem melius perspicere et praevidere possint. Immo eam ipsam ob causam in has Observationes retuli singularem Tertianae duplicis historiam, caeteroquin extra illos temporis cancellos, quibus caeterae continentur omnes, constitutam, siquidem ejus phaenomena mihi visa fuerint adeo insolita atque admirabilia, ac ulla alia, quae ad nostram unquam notitiam pervenerunt.

Pluribus haecenus de instituti mei ratione ad Vos scripsi, ne simili postea occasione de ea amplius differere necessum foret; quapropter etiam, si haec forte epistola verbosior visa fuerit, Vos ejus mihi quidem veniam daturus confido. Si enim in eo genere studium meum non aspernabimini, praeter Observationes Anatomicas plura quoque alia hujusmodi ac in gravioribus etiam morbis Artis experi-

menta Vobiscum, Deo volente, et animo quidem libentissimo, communicare potero. Hoc agendo, si et Hominum commodis consulere, eorumque utilitati ac saluti servire, et mihi Vestram, quam sane maximi facio, gratiam ac benevolentiam comparare queam, uti hoc ipso nihil mihi magis aut jucundum aut honorificum accidere posse sentio, ita et in hoc negotio neminem aut studio majore ut magis alacri ad omne in Vos obsequium animo veriri posse intelligo. Valete.

nusve certiore fieri contigerit: has tamen sic, ut ab initio notatae fuerant, retinere, quam ad compendii aequalitatem reducere malui, quo tanto melius inde patefceret, in quibus Morbi phaenomenis, et qualis, ac quanta ab ipsa *Salis* operatione mutatio succederet. Ut taceam, nunc varia hinc hauriri posse, quae etsi ad praesens institutum non pertineant, et forte nonnullis etiam leviora videri queant, ad adcuratam tamen horum Morborum historiam a Medicis perperam neglectam contexendam faciunt, et tanquam *Data* ad illorum causas indagandas, easque non ex conjecturis, uti quidem haecenus, sed ex observationibus, quousque fieri potest, definiendas inservire possunt. Equidem dolendum existimo, quod Medici Morborum quotidie occurrentium casus conscribere adeo negligant, ut illorum etiam historiam, quae jam dudum omnibus numeris absoluta esse deberet, haecenus nobis non nisi admodum mancam et imperfectam reliquerint; cum eo ipso, quod Morbi sunt vulgatissimi, illorum observationes frequentissimum ac proinde maximum habeant usum. Quod tamen non ita velim accipi, ac si Casus quoscunque rariores flocci facerem: hi etenim Practicis etiam peritissimis magno interdum ufui esse queunt, ut, si in similes quandoque Morbos inciderint, mox ab initio non tantum eorum progressus et exitus, sed et totam medicandi rationem melius perspicere et praevidere possint. Immo eam ipsam ob causam in has Observationes retuli singularem Tertianae duplicis historiam, caeteroquin extra illos temporis cancellos, quibus caeterae continentur omnes, constitutam, siquidem ejus phaenomena mihi visa fuerint adeo insolita atque admirabilia, ac ulla alia, quae ad nostram unquam notitiam pervenerunt.

Pluribus haecenus de instituti mei ratione ad Vos scripsi, ne simili postea occasione de ea amplius disserere necessum foret; quapropter etiam, si haec forte epistola verbosior visa fuerit, Vos ejus mihi quidem veniam daturus confido. Si enim in eo genere studium meum non aspernabimini, praeter Observationes Anatomicas plura quoque alia hujusmodi ac in gravioribus etiam morbis Artis experi-

menta Vobiscum, Deo volente, et animo quidem libentissimo, communicare potero. Hoc agendo, si et Hominum commodis consulere, eorumque utilitati ac salutis servire, et mihi Vestram, quam sane maximi facio, gratiam ac benevolentiam comparare queam, uti hoc ipso nihil mihi magis aut jucundum aut honorificum accidere posse sentio, ita et in hoc negotio neminem aut studio majore aut magis alacri ad omne in Vos obsequium animo versari posse intelligo. Valete.

D I S S E R T A T I O
DE
S A L I S A M M O N I A C I
PRAECLARO AD
FEBRES TERTIANAS ET QUOTIDIANAS INTER-
MITTENTES USU.

I. Salis Ammoniaci egregia virtus febrifuga haëtenus latuit.

Sal Ammoniacum arte factum, quod hoc solum tempore in tabernis proflare atque in Medicina usurpari solet, Veteribus, quantum liquet, Medicis neutiquam innotuit. Primus, qui in nostras quidem manus incidit, *Andr. Caesalpinus* hujus Salis parandi modum, quo scilicet tunc temporis in Germania confici solebat, in Libro *de Metallicis* vergente jam seculo XVI. publicavit; solum autem chymicum illius in metallis usum tradidit, medicum vero ne quidem attigit. Neque etiam de ejus interno in Arte Medica, saltem in Febribus, usu ullum, quod scio, apud *Fernelium*, *Forestum*, *Joelium*, *Dodonaëum*, *F. Platerum*, *Schenckium* et plures alios celebriores istius seculi Medicos vestigium exstat, nisi, quod *Platerus* hunc Salem in Asthmatis curatione memorat. Nonnulli vero seculi sequentis atque novissimi Authores hujus quidem Salis in re Medica utilitatem, immo et vim aliquam ut ajunt, *febrifugam* agnovisse, ast verum illius in Tertianis et Quotidianis intermittentibus curandis usum et singularem illam virtutis excellentiam, quae ex paucis hisce pagellis patebit, nulla equidem ratione perspexisse videntur. Ita ea quidem aetate aliqui de iis, qui Medicaminum virtutes enarrare atque scripto comprehendere studuerunt, ut *Schroederus Pharm. Med. Chym.* *Et mulierus Schroder dilucid.* *König Regn. Miner.*, *Dale Pharmacol.*, *Marggraef in Collect. Chym. Leydens.*, *Lemery Cours de Chymie*, etc. *Sal ammoniacum* illiusve Crystallus vel Flores generatim in Febribus et prae-

fertim in Quartanis prodesse notarunt. Ita pariter nonnulli ex iis, qui toto istius seculi decursu florere et de Februm intermittentium curatione scripsere, Medici, uti multorum quidem Medicaminum, ita et Salis ammoniaci aliquam ibidem mentionem injecerunt. Sic equidem novi, *Willisium de Febris, Barbette Prax., Rolfincium Meth. Cur. Febr., Mynsichtum Armam., et Chr. Joh. Langium in Praxi Med.*, Sal Ammoniacum vel ejus Flores inter caetera qualiacunque *Febrifuga* in Intermittentibus usitata memorare; *F. De le bee Sylvium in Prax. Med.* illud, quoties Aegri constitutio biliosa fuerit, in hisce Febris una cum caeteris aliis, ut ait, *Solventibus* atque *Incidentibus acidis* praescribere; *Grulingium Med. Pract.* hoc Sal, si septies sublimatum sit, ad omnes Febres, praecipue vero ad Quartanam utile pronuntiare; *Sennertum et Primerosium, de Febris*, referre, illud in Quartana, postquam sublimatum fuerit, a quibusdam Chymicis usurpari solere; *Michaellem Oper. Med. Chir., Dekkers in Not. ad Barbette, Dolaeum Encycl. Med., et Walschmid in Prax. Med.* caeterisque *Operibus*, omnes in Quartana, *Dolaeum* etiam in Quotidiana, et *Dekkers* in Tertiana, ac *Walschmid* in utraque, hoc Sal illiusve Flores pluribus aliis *Febrifugis* in *Formulis* ibidem praescriptis adjicere. Interea tamen egregias hujus Salis vires cunctis his Authoribus neutiquam exploratas aut cognitatas fuisse, vel inde facillime liquet, quod, cum in quolibet Medicamine, de quo aliquam tantum opinionem animo conceperint, magnifice laudando atque efferendo caeteroquin nimiam Medicorum facilitatem, ne dicam temeritatem, summo quidem jure culpaveris, hic Ammoniacum Salem nullo prorsus encomio exornent, nullam ei prae caeteris, imò levissimis etiam Febrifugis praestantiam tribuant; atque solus, qui id *praemissis praemittendis* pro *singulari Febrifugo* venditat, *Etmullerus*, in iisdem morbis majore etiam laude *Spiritus* ex hoc Sale extracti vires, licet re ipsa multum inferiores et hic cum ipsius Salis virtute nequaquam comparandas extollat. Deinde id hinc quoque ulterius patere potest, quod memorati Authores, si unum quidem *Sylvium* exceperis, hujus Salis usum ad pauca tantum grana defini-verint, et qui hic, ut *Lemerius et Etmullerus*, caeteris etiam

effectus est, majoris securitatis ergo, Aegrotanti eundem hujus Medicaminis usum sub alterius paroxysmi adventum simili plane ratione repetendum existimo. His peractis, etiamsi, quod raro equidem evenire solet, hac altera accessione Morbi vires nondum fractae vel admodum debilitatae videantur, nihilominus absque ulteriore Medicaminis usu tertiam accessionem expectandam cenleo, utpote quam comperi passim vel nequiquam reverti, vel levissime tantum afficere, atque deinceps sponte sua Aegrotantem derelinquere. Quod si tamen inopinatus ejusmodi casus exstiterit, ut Febris pervicacior duplici Salis dosi non cesserit, sed tertia etiam accessione vegetum adhuc morbi vigorem ostenderit, quarto paroxysmo recurrente tertiam ejusdem Medicaminis dosin eadem plane ratione iterandam jubeo. His nostra *Tertianis simplicibus et Quotidianis* Sale Ammoniaco medendi methodus continetur. Hoc solum advertendum superest, quod infra ex *Observationibus* constare poterit, Tertianas quidem, ut curentur, rarius quam Quotidianas tertia Salis Ammoniaci dosi indigere. Quod autem ad *duplices Tertianas* attinet, etsi, ut in iis, quae sequuntur, *Observationibus Casus 23* edocet, unica interdum Salis dosis illis tollendis suffecerit, quia tamen id non semper accidere, vel ipse, qui sequitur, *Casus 24* documento esse potest, idcirco et ad certiores curationis successum et ad majorem ejusdem celeritatem si non necessarium saltem utile duco, ad singulas has, quae Morbum hunc componunt, Tertianas non tantum singulas Salis doses adhibere; sed et easdem proxima quaque accessione iterare.

IV. Viſtus ratio et in hujus Salis usu et in qualibet Intermittentium curatione observanda.

Cunctis his Febricitantibus eam interea viſtus rationem praecipio, quam nullo habito Medicaminum discrimine in omnium Intermittentium curatione observandam judico. Durante Febris accessione iis quocunque potu frigidiore interdico. Toto vero curationis tempore, imo et menstruo post hanc intervallo, *Cornem suillam* ac *Lardum*, et *Pisces marinos*, praesertim *Passerem* seu *Rhombum* (Bot), *Apuam cobitem* (Spierling), *Ajellum* minorem, majoremque

prohibeo; et ab Aquarum fluentium ac praecipue Fluminum transitu cavendum moneo. De potus frigidioris in ipsa Febre noxa et hic forte aliquod in *Casu* 34 specimen exstat. A Carne suilla, Piscibusque recensitis Febres intermittentes jam per aliquod temporis intervallum, immo per integri fere mensis spatium, curatas et prorsus extinctas resurgere, praeter *Casus* 33 et 16 infra memorandos tot mihi, quot ad rei demonstrationem abunde sufficiunt, exempla suppetunt. Fluminum transitum ad Febres recidivas generandas aptum Medicorum alii asserunt, alii negant; illi observationibus nixi ad experientiam provocant, hi ratione freti, dum nullum inter hanc causam et quem ei tribuunt, effectum mentis acumine nexum perspiciunt, rem hanc ut inanem atque anilem fabellam rejiciendam judicant. Verumenimvero, cum innumeri in rerum natura effectus sint obvii, quorum causae omnino certissimae, illorum autem cum huius concatenatio plane obscurissima, istiusmodi ratio ad fidem experientiae abrogandam neutiquam sufficit. Hunc unum ergo scrupulum tantummodo superesse reputo, an concessa observationum veritate utrumque, quorum alterum pro causa, alterum pro effectu habetur, non hic forte casu atque fortuna concurrerit; quod quomodo se habeat, ex ipsius rei frequentia aut raritate dijudicari posse intelligo. Si enim istiusmodi recidivae in ipso Fluminis transitu aut exiguo tantum temporis spatio interjecto multo frequentius contingant, quam, si hoc casu fieret, contingere deberent, id quod calculo haud difficulter aestimari potest; vel si illis, qui nuper febricitarunt, id haud frequenter impune tentare liceat; vel si plures, quos Febris nondum reliquit, hinc paulo post et insueto omnino tempore paroxysmo corripiantur; haec sane putarem certa de hujus rei veritate testimonia. Atqui praeter illud, quod *Casus* 35 exhibet, hujus rei exemplum, jam eum ejusmodi Observationum collegi numerum, qui si rem hac via non plane demonstrare, ei saltem fidem facere, atque hujus opinionis Authores a nimiae credulitatis nota vindicare possit. Has autem ut et paulo ante memoratas Observationes hic caeteris quidem adjicerem, nisi eas ad generalem Intermittentium curationem potius quam ad nostrum hic scopum

perrinere judicarem, ac proinde nimiam hujus Opusculi molem jam nunc praeter opinionem excrecentem veritus eas ad aliam occasionem reservare mallet.

V. Qua ratione Salis Ammoniaci virtus et per Observationes et per Tabulam effectuum inde concinnatam demonstrabitur.

Ut vero nunc Salis Ammoniaci praescripta ratione usurpati operatio et virtus certius et adcuratius patefcerent, non solum omnes Febrium intermittantium Casus, quibus intra biennii spatium (quod scilicet ab initio Mensis *Septembris Anni 1702* ad finem *Augusti Anni 1704* effluxit) hocce Medicamen adhibui, nullo quidem, ut adcurata successuum ratio iniri posset, omisso notare, atque ad hos unico tantum, qui extra hujus temporis limites contigit, cum ob singularia ac admiranda Febris illius phaenomena, tum ob hujus Salis operationem curiosius in ea observatam, adjecto, hic proponere et huic Dissertationi subjungere institui; sed et varios hujus Salis effectus, quos in Intermittentium inde curatarum paroxysmis mutandis, minuendis et tollendis prodidit, ex Observationibus memoratis, ubicunque nimirum de iis fatis constitit, excerptos et in compendium redactos, additis temporum notis, in unam *Tabulam* ad calcem hujus Opusculi affixam cogere, et sic simul uno ante oculos Schemate, quo celerrime a mente percurri et facillime inter se conferri possent, exponere atque repraesentare conatus sum: quod etsi fortasse in ejusmodi rebus inusitatum, tamen non inutile visum.

VI. Salis Ammoniaci in Tertianis et Quotidianis intermittentibus curandis effectus, eorumque constantia et celeritas.

Ex hac Observationum sylva de Salis Ammoniaci in Tertianis et Quotidianis curandis effectui, illiusque constantia et celeritate, sequentia patent.

Imo. Quod adeo constans sit hujus Salis effectus, ut in octo Casibus, quibus ad Tertianas et Quotidianas intermittentes sanandas ea, quam supra demonstravimus, ratione adhibetur, vix semel optato successu destituatur. Etenim ab hoc Sale sic usurpato in Observationibus memoratis Febres sequentes.

	fuere	curatae	non curatae
Tertianae simplices	22	3	
Tertianae dupl. et Quotidianae	6	I	
Ac proinde Tertianae	—	—	
et Quotidianae conjunctim	28	4	

Immo illos etiam Febrium casus, quibus curandis impar fuit Salis Ammoniaci virtus, multo quidem, quam ex hoc calculo apparet, rariores esse posse intelligo; siquidem in quatuor his Febribus, quas a Salis hujus usu nequicquam curatas docui, successus propterea fortasse defuerit, vel quod Aegri graves, quos quidem me celaverint, in victu errores commiserint, quales ut recidivae excitandae ita et curationi impediendae pares esse queunt; vel quod post binas, quae non suffecerant, Salis nostri doses tertia renuentibus Aegris, uti quidem factum oportuerat, non fuerit iterata. Quemadmodum enim in Corticis Peruviani usu experimur quotidie, eam, quae plerumque sufficit, illius quantitatem, nonnunquam tamen Febri ejusdem licet generis curandae non solum imparem, sed et prae morbi pertinacia prius, quam curatio consequatur, ferme duplicandam esse; ita pariter, etsi duplex Salis dosis ad tollendas passim Febres satis efficax deprehensa fuerit, ea tamen, ut hoc *Casu* 24 et 28. confirmari potest, ad Febres altioribus radicibus defixas evellendas ejusdem interdum Medicaminis iterandi subsidio indigere, atque hujus adjumento destituta viribus deficere poterit. Quem autem hic proposui egregium Salis ammoniaci usum, eum non tantum me haec, quam haec adjungam, Observationum collectio docuit, sed et frequens toto deinde Praxeos decursu experientia confirmavit; neque mea solum, sed et, quae huc accessit, Fratris observatio, qui, cum hujus Remedii vires in Tertianis et Quotidianis explorasset, quae ei unius anni circuitu incredibili quidem numero curandae obtigerant, illud, ut mihi retulit, spem suam rarissime fallere comperit, et ob hanc singularem hujus Medicaminis praestantiam toto deinde reliquo vitae tempore illud in his Febribus extirpandis Peruviano Cortici praefendum censuit.

II^{do}. Quod in his Intermittentibus Sale Ammoniacco curatis toties saltem una illius dosis suffecerit, quoties eam iterare

neceffum fuerit. Etenim ex 28 Febribus, quarum hoc Sale curatarum obfervationes retuli, 14 unica illius dofi fuere depulfae; et fuiffent fortaffe multo plures, fi id experiri licuiffet; in caeteris enim binae paffim Salis dofes binis continuis paroxysmis adhibitae fuerunt, atque ita effectum eft, ut, quid fola prioris dofis virtus praefliterit, difcerni non potuerit. Saltem tres illas Tertianas *Caf. 11, 14 et 15* memoratas, in quibus alter ab affumpta priore dofi paroxysmus non rediit, hujus omnino viribus fuiffe fugatas, mihi fane quammaxime probabile vifum eft. Fac ergo reliquas undecim Febres haud uni Salis dofi fuiffe celfuras, et his 4 illas *Obferv. Class. 2. Sect. 1. Art. 1.* propositas adjice, quibus etfi unica dofi curandis impar fuerit, duplicatam nihilominus fufficere potuiffe, probabile puto; manebit tamen, ex 32 Febribus, quibus Salis hujus virtus mederi potuit, 17 fuiffe, quibus depellendis equidem unica illius dofi fuffecerit.

III^{tio}. Quod in Tertianis et Quotidianis ea fuerit Salis Ammoniacy in Morbo levando ac tollendo celeritas, atque ea in operando constantia, ut

1. ex 5 Febribus paffim 2 fuerint, quibus accessio primam Salis dofin mox infecuta magnopere levata, ex 6 solummodo 1 circiter, in qua haec aggravata, ex 7 vero 3, quibus eadem neutiquam mutata exstiterit.

feu, quod eodem redit, ex 35 Febribus fuerint mox prima a Sale sumpto accessione 14 magnopere levatae, 15 non mutatae, et 6 tantummodo aggravatae.

2. ex 27 Febribus a Sale Ammoniaco curatis fuerint 15, quibus alter a Sale sumpto paroxysmus omnino non recurrerit, 7, quibus vel levissimus vel saltem magnopere levatus redierit, et 5 solum, quibus is eodem fere ut antea vigore reversus fuerit.

3. Ex iisdem 27 Febribus a Sale Ammoniaco curatis fuerint vix 9, quibus tertius a Sale sumpto paroxysmus redierit, immo, ut probabili quidem ratione colligi potest, 5 solum tales exstitiffent, si methodo Art. III. commendata Sal Ammoniacum adhibitum fuiffet.

Et ex his 9, quae fcilicet tertia a Sale sumpto accessione redierunt, fuerint

7, quibus ille paroxysmus vel levissimus vel saltem maxime levatus recurrerit;

et 4, quibus is paroxysmus exstiterit ultimus;

et 1, quae deinde semel tantum levissime recurrerit;

et 3, quae sua sponte vel ab eo tempore decreverint, vel paulo post cessaverint;

et 1, solummodo *Tertiana duplex*, quae tertia quoque *Salis* dosi indiguerit.

4. Immo, quod tertius a Sale sumpto paroxysmus recurrerit, id in *Tertianis simplicibus* sexies quidem rarius, quam in *Quotidianis* contigerit.

Quod enim ad primum attinet, si, uti par est, illas solum observationes spectemus, in quibus de hoc Salis effectu constitit, patebit, ex xxvii Febribus in *Tabula* memoratis duodecim, nempe *Casu* 3, 5, 6, 7, 9, 16, 20, 23, 24, 26, 27, et 28 notatas, et ex viii Febribus in *Class.* 2 et *Append.* relatis duas, *Casu* 35 et 39 propositas, exstitisse, in quibus paroxysmus mox a prima Salis dosi secutus magnopere fuit imminutus; ac proinde has conjunctim sumendo ex xxxv Febribus xiv fuisse, in quibus haec tam subita Salis operatio fuit deprehensa: ex iisdem vero xxxv casibus vi tantum Febribus, *Casu* nimirum 12, 13, 14, 15, 21, et 30 commemoratis, primum a Sale sumpto paroxysmum aggravescere visum; in caeteris vero xiv nullam, quam quidem intellexi, hujus paroxysmi mutationem fuisse observatam.

Quod vero ad alterum spectat, *Tabulam* adjunctam percurrendo liquet, ex xxvii Febribus a Sale nostro curatis xiiii *Tertianas* et *Quotidianas* exstitisse, in quibus altera a Sale sumpto paroxysmus prorsus fugatus fuit, et ii *Tertianas duplices*, in quibus itidem altera illius *Tertianae*, sub cujus scilicet adventum Sal usurpatum fuerat, accessio non rediit, etsi in horum casuum altero is, qui jam defierat, paroxysmus postmodum resuscitatus fuerit. Atque haec quidem ita se habent, ut ex xv hisce Casibus duo tantum exstiterint, quibus alterius paroxysmi tempore aliquis solummodo capitis dolor, duo, quibus tunc temporis levis quaedam alteratio, et unus solum, in quo tum aliquod caloris augmentum sese prodiderit; caeteris vero cunctis ne mini-

num quidem hoc ipso tempore observatum fuerit valetudinis indicium. Eadem porro *Tabula* docet, ex reliquis *xix* casibus, quibus alter a Salis usu paroxysmus non plane depulsus fuit, *vii* tamen fuisse, quibus is vel levissimus vel saltem maxime levatus recurrerit, et *v* solummodo, in quibus is eodem, ut ante, tenore persisterit.

Tertium pariter sola *Tabulae* inspectio haud difficulter edocet, si tantum animum adverteris, inter has *ix* Febres, quibus tertius a Salis usu paroxysmus rediit, tres adfuisse ab unica solummodo hujusce Remedii dosi tantopere levatas, ut tertia a Sale sumpto accessione non nisi levissime tantum Aegrotantem affecerint; indicio equidem haud obscuro, si altera ejusdem Medicaminis dosis iterata fuisset, eas ne tertio quidem paroxysmo fuisse reversuras. Quod de illarum postrema, *duplici* nimirum *Tertiana*, *Cas. 23* memorata, tanto etiam liquidius constat, quia unica Salis dosis illam mox Tertianam, sub cujus adventum sumpta fuerat, sustulit, et alteram ita fregit, ut tribus inde paroxysmis prorsus decreverit; unde si idem Medicamen sub alterius Tertianae accessionem iteratum fuisset, ambigi non potest, quin, quod in Febre viribus integra potuit, id tanto magis in fracta praestitisset, ac hanc proinde nullo quidem negotio confestim depulisset. Immo praeter has tres Febres, his etiam alia *Tertiana* nempe *duplex Casu 24* notata interfuit, ex cujus Tertianis altera duabus a Sale sumpto accessionibus ita decrevit, ut deinceps fere penitus fugata decesserit, et aliquam solummodo alterationem solitis paroxysmi temporibus reliquerit; altera vero mox a Salis usu ita quidem fracta fuit, ut illico duarum insequentium accessionum tempore aegrum affligere intermiserit, deinde vero, cum nondum radicitus evulsa fuisset, viribus quodammodo relictis resuscitata fuerit; insigni equidem documento, si in harum utraque mox ejusdem Medicaminis usus, ut quidem oportuerat, iteratus fuisset, illius equidem virtute haud difficulter exiguas, quae tunc tantum supererant, Morbi reliquias ante tertii paroxysmi reditum, penitus potuisse depelli.

Ultimum denique, quod hic notandum censui, facili quidem ratione constat: etsi enim *xx Tertianis simplicibus* hic commemoratis *iv* interfuerint, quibus tertius a Sale

sumpto paroxysmus rediit, illis tamen, uti jam supra observatum est, II tantum ejusmodi Febres affuissent, si Salis usus debita methodo iteratus esset; cum e contra ex v *Quotidianis* III exstiterint, quibus tertia a Salis usu accessione reverti contigerit: unde liquet eas, quibus id in Tertianis acciderit, vices, in ea quidem ad illarum numerum ratione fuisse.

ut I ad 10, seu ut 3 ad 30,
in Quotidianis vero

ut 3 ad 5, seu ut 18 ad 30,
ac proinde hoc sexies frequentius in Quotidianis quam quidem in Tertianis simplicibus evenisse.

VII. A Salis Ammoniaci usu Febres recidivae omnino rarissimae accidunt.

Ex his itidem Observationibus manifestum est, *Febres recidivas* quae a *Chinae Chinae* usu frequentissimae eveniunt, a nostro quidem *Sale* omnino rarissimas accidere, nisi quis eas ciborum, aut rerum officientium usu, ac sua proinde culpa sibi arcessiverit. Etenim ex XXVIII Febribus a Sale Ammoniaco curatis vix *duae* tantum postea reversae fuere, quarum altera Tertiana, *Casu* 19 memorata, quae Puellulam afflixerat, interjectis undecim a curatione diebus, forte ab aliquo, ut suspicor, victus errore recurrit; altera vero Quotidiana *Cas.* 28 notata, quae Virginem 18 annos natam et fluxum menstruum nondum expertam affecerat, et a *Salis* dosi vix sufficiente paulatim decreverat, post duarum vel trium septimanarum circuitum rediit. Haec sola in omnibus hisce *recidivae* exempla. Etsi enim in illa Tertiana duplici, cujus paulo ante memini, altera Febris, quae Morbo nondum penitus depulso per unam alteramve accessionem ferme delituerat, Medicaminis defectu, quod ad eam radicatus extirpandam iterandum fuerat, rursus in scenam prodierit, hanc tamen, quia nondum penitus curata exstiterat, haud inter Febres recidivas numerandam existimo.

VIII. Salis Ammoniaci usus Sanitati neutiquam nocivus, neque ullus inde mali futuri metus.

Quae etiam de Corticis Peruviani usu multi perhibent, quasi hic sanitati nocivus varia immo et graviora in Corpore

mala progigneret, haec sive vera sive falsa de nostro saltem Sale nequitiam metuenda comperi. Ab hujus enim usu Febricitantibus tantum quod inde curatis passim absque ullo alterius Medicaminis subsidio Stomacho appetitum excitandi et cibos digerendi facultatem, Faciei colorem et Corpori vires restitui deprehendi, nullum autem unquam incommodum inde ortum vidi; ita quidem, ut excepta Puerpera *Casu* 26 et Vetula *Casu* 8 memorata, quarum altera cacochymica, altera praeter Quotidianam Diarrhoea afflicta, hanc, illa curata, gravi in victu errore incitaverat, caeteri omnes, quorum *Casus* hic notati, postquam a Febre liberati fuerant, brevi equidem pristinum vigorem atque sanitatem recuperaverint. Immo ex xxxviii Aegrotis, qui, ut infra patebit, annis 1702, 1703 et 1704 Sale Ammoniaco usi fuerunt, etiam nunc hoc anno 1716, quo haec scribo, xxx, ni fallor, supersunt et valetudine prospera utuntur; saltem de xviii id mihi certo constat et de reliquorum morbo vel morte nihil mihi haecenus compertum est. Ex viii autem caeteris jam fato functis, una Puerpera modo memorata ex victus errore et morbo inde aggravato decessit; tres admodum senes aliquot post annis ad mortalitatis demum finem accessere; Frater charissimus, ut ex *Casu* 23 liquet, elapso triennio atque insuper semestri spatio acutissima Febre, quam ex contagione contraxerat, extinctus est; reliqui tres quadriennio post, aut longiore etiam intervallo, quo passim sani vegetique fuerant, in morbum impliciti suprenum obiere diem. Ex his itaque satis superque manifestum est, in Salem Ammoniacum ne minimam quidem noxae neque mox neque diu post inde oriturae suspicionem posse cadere; ac proinde *Fr. Joëlem* in summo hic errore versari, dum *Oper. Med. Tom. 5. lib. 2.*, quo de Venenis disierit, *Sect. 3. pag. m. 124.* hunc quoque Salem in eorundem numerum adscripserit, et hoc quidem falsum de eo testimonium reddiderit. *Symptomata*, inquit, *si intra corpus ingeratur, excitat Sal Ammoniacum similia Mercurio sublimato aut Arsenico; ventriculum enim et intestina exurit, linguam arefacit et fauces exulcerat.* Haec enim non tantum falsitatis arguit ingens eorum, quos supra demonstravi, Medicorum cohors, qui de interno ejus usu ne

minimam quidem suspensionem alere visi, sed et clarissime convincit cum ea, ad quam jam provocavi, Observationum sylva, tum frequentissima, quae et mihi et Fratri toto deinde Praxeos decursu de hujus Salis usu non solum in adultis aut natu majoribus, sed et in tenerrimis etiam infantibus contigit, experientia. Luculentum profecto eorum, quae ante notavi, specimen, quam nimirum lubrica sit parumque tuta interdum Medicorum fides, in iis etiam, quod sane deplorandum est, de quibus non dubitanter, sed audacter et quasi re penitus explorata differere videntur.

IX. Salis Ammoniaci intus in Corpore operandi ratio.

Quod denique ad Salis Ammoniaci operandi modum attinet, ad hunc illustrandum non nisi perpauca et ea quidem satis exigui momenti huc afferre potero; utpote, qui ab initio jam apud animum proposui, nulla hic luxuriantis imaginationis commenta, sola vero observatione comperta aut justis et legitimis inde consecrariis deducta tradere. Primum ergo, quod hic observo, hoc est, quod, ut primum *Sal Ammoniacum in ventriculum delapsum fuerit, mox aliqua ejus portio inde celerrime in Corpus diffundatur et Sanguini Humoribusque permisceatur.* Etenim in *Casu 23 Aeger sumptum Salem mox in ventriculo operari, et quadrantis horae spatio sese in totum abdomen diffundere, ibique adhuc per dimidiam circiter horam leniter admodum et absque ullo incommodo agere sensit*: alii vero, ut in *Casu 31, 11 et 2*, a Sale paroxysmo inchoante confestim sumpto mox vel calorem in ventriculo productum et inde prognatas frigoris ac horroris inducias, vel statim inde frigus quammaxime imminutum, vel id ipsum multo quam ante brevius experti fuere. Jam autem Salem Ammoniacum ex ventriculo sub forma liquoris per consuetam chyli faecumque viam progrediendo adeo minutulo temporis spatio non hos solum effectus edere, sed et in totum abdomen diffundi posse, mihi sane neutiquam probabile apparet; et quidem eo minus, quia hunc Salem sub ea, quam memoravi, forma per primas haud celeriter vias propelli, aut in ventriculo sat longas necesse moras comperi, dum ille, de quo *Casu 15*, ventriculum inde aliquandiu oneratum senserit, et hic ipse atque alii pariter,

ut *Casus* 13, 31, 15 et 10 edocere queunt, non semihorae tantum, sed et unius ac dimidia, immo bihorii intervallo a Salis usu elapso etiam tunc ejus in Aqua soluti partem vel solam sive puram vel cum potu aut bile permixtam vomitu rejecerint. Cum itaque exilissima tunicarum Ventriculi et intestinorum, nec non Vasorum sanguiferorum illas perreptantium spiracula non solum liquorum volatilium sed et simplicis aquae in Ventriculum aut Intestina delapsae particulis ita pateant, ut ea permeare, atque inde mox vel in Vasorum sanguiferorum vel in Abdominis cavitatem evadere possint, uti praeter alias Observationes, Celéberrimorum Anatomicorum experimenta, nimirum *D. Mery* apud *Hamelium Hist. Acad. Reg. Scient. Lib. 3. Sect. 6. Cap. 2. §. 6.* et *Lib. 6. Sect. 1. Cap. 5. §. 3.* et *Vieussenii Nov. System. Vasor. p. 30 — 34.* clare demonstrant; et propterea hi ipsi meatus eidem Liquori Sale foeto multo magis patere debeant, dum Aquam, si Salibus muriaticis imbuta, quam si pura fuerit, penetrantiorē esse, vel ipsa ex Sale communi confecta Muria vasis ligneis multo quidem difficilius quam aqua pura coercenda edocet: idcirco mihi quammaxime probabile videtur, quam primum Salis Ammoniaci Liquor in Ventriculum aut Intestina descenderit, permultas ejus particulas ibidem partim in ipsa sanguifera vasa per eorum poros penetrare, partim transversos membranarum has cavitates circumvestientium meatus pervadere, atque hac via halitus hosce Salinos in totum abdomen diffundi, et insensilia ubique viscerum vasorumque spiracula permeare, atque ita sanguini et humoribus confestim permisceri: quae omnia tanto quidem celerius accidere debere videntur, si cogitemus multas Salis Ammoniaci particulas utpote volatiles mox ventriculi calore in vapores elevari, qui ipsis liquoribus et mobiliiores et penetrantiores esse solent, et propterea non solum citius per intestina dissipari, sed et facilius quoslibet meatus caecos subire posse. Immo in his ipsis particulis, quae ex Sale Ammoniacico in ventriculum delapso confestim exhalant, et inchoante Febris accessione per memoratas viarum angustias celerrime in Viscera et Humores evadunt, hic quidem potissimam illius virtutem esse sitam, nonnullam nobis suspicionem injicit haec observatio, quod

etsi jam ante dicto post Salem sumptum intervallo illius pars vomitu rejecta fuerit, ejus tamen operatio in *Casu* 10, 13 et 15 propterea nequaquam debilitari visa sit, uti nec in *Casu* 19, ubi Sal ammoniacum in cupreo vase tritum paulo post, quam sumptum erat, vomitum excitaverat, atque ita ex parte saltem exturbatum fuerat.

Qua autem ratione Sal Ammoniacum Sanguini et Humoribus permixtum in ipsam Febris causam agat, illamve deleat, hic quidem accuratius exquirere aut definire neutiquam aggrediar; ad hanc enim hujus Salis operationem rite explicandam ipsa Morbi causa primo indaganda et demonstranda foret, quod a nostro hic scopo non solum alienum sed et haud levi opera expediendum puto: uti enim de hac multa dicere et conjectari facillimum, ita pauca in medium proferre, quae hoc seculo adeo illuminato perspicacioribus, quibus aures jam dudum ad lepidas et commentitias Medicorum fabellas obsurduerunt, placere, illisque certitudinis evidentiâ satisfacere possint, omnino difficillimum esse intelligo. Alterum ergo, quod in hac rerum caligine aliquantulum elucere ac proinde hic animadverti posse video, hoc est, *Salem Ammoniacum nec vomitum ciendo, neque ventrem movendo, neque sudores excitando operari; illudque videri in his Febris curandis potius earundem causam immutando et corrigendo, quam hanc e corpore eliminando agere.* Etsi enim paucis in casibus paulo ante memoratis Salis Ammoniaci usum vomitus fuerit infecutus, illud tamen, cum in ventriculum pervenerit, neque nauseam neque vomitum excitare solere, uti ex cunctis reliquis observationibus abunde patet, ita et ex his ipsis facile liquet: in nonnullis quippe nausea et vomitus jam ante et ab alia quidem causa aegrotantes infestabant; uti in *Casu* 13 a Phlegmatum in fauces incidentium molestia; et in *Casu* 10 a Bile in primas effusa vias, ibique copia vel acredine turbascente, utpote qua Salis Ammoniaci fortasse operatione soluta atque rejecta, omne nauseae et vomitus incommodum antea aegrotanti maxime molestum evanuit: in caeteris vero, uti in *Casu* 15 et 31, vomitum durante frigore et horrore febrili aut paulo post abortum ipsi Morbo adscribendum existimo, dum is hoc tempore, nullo etiam Medicamine, sed potu solum,

qualecunque fuerit, sumpto, frequenter contingere soleat, et ita pariter in horum *Casuum* posteriore, sequente paroxysmo, quo Sal ammoniacum non fuerat usurpatum, contigerit. Uti vero hoc Medicamen memorata ratione sumptum nullum omnino vomitum movere, ita nec per alvum purgare, neque sudores elicere comperi, neque pariter, an per diaphoresin seu perspirationem insensilem aut per urinas evacuet, ullis hactenus indiciis animadverti. Quod autem Humores corrigendo agat, id illud equidem phaenomenon haud obscure indicare videtur, quod *Casu* 23 a Fratre febricitante in se ipso observatum referam, nimirum *sumpto Sale Ammoniaco intra unius horae spatium putidum illum atque nauseosum Salivae saporem, quem sibi toto morbi decursu molestum senserat, maximam quidem partem correctum atque emendatum fuisse*: tantam enim, quanta huic effectui suffecerit, materiae morbidae copiam hic a Sale Ammoniaco e Corpore fuisse expulsam, etsi nullis uspiam indiciis apparuerit, et his quidem temporis angustiis, quibus hoc tunc Medicamen Humoribus tantummodo permixtum fuerat, nemo, ut opinor, sibi facile persualerit. Praeterea hoc ipsum egregie confirmat altera, quam supra *Art.* VI notavimus, observatio, qua nempe constat, *eum ipsum paroxysmum, quo adventante Sal Ammoniacum usurpari coeptum, inde frequenter admodum magnopere fuisse levatum atque imminutum*: is etenim effectus tam subitus, quo hoc Morbi allevamentum non in fine solum, sed toto passim paroxysmi decursu, et propterea brevissimo post Sale sumptum intervallo, productum fuit, alicui materiae morbidae eiectioni adscribi non posse videtur, quippe quae ante paroxysmi declinationem, seu prius, quam sudor erumpat, sensibus saltem non deprehenditur, et quam tantillo tempore tantam, ut morbum maxime levare potuerit, et tamen insensilem fuisse, probabile non est.

X. Salis Ammoniaci in Quartanis intermittentibus curandis
exigua virtus.

Hactenus de Salis Ammoniaci in Tertianis et Quotidianis intermittentibus curandis usu sat copiose dictum. De hujus autem Medicaminis in Quartana virtute a Fratre, qui

me in hoc experimento praevenerat, et hic hujus quidem Remedii plus semel periculum fecerat, accepi, se ejus vires pertinaciori huic Morbo eradicando neutiquam pares observasse, et propterea ab ulteriore illius in hac Febre usu prorsus desistere. Quare quum mihi in ejusmodi observationibus summa ejus prudentia et circumspectio notissima esset, pariter jam omni successus spe abjecta, quod primo intenderam, hujusce Medicamenti hic amplius experiundi consilium repudiavi.

XI. Salis Ammoniaci usus in Tertianis et Quotidianis curandis Cortici Peruviano si non praeferri, jure saltem meritoque aequiparari potest.

Misso vero *Salis Ammoniaci* ad Quartanas usu, in Tertianis tamen et Quotidianis curandis, ex iis, quae supra demonstravimus, tanta, ut opinor, illius virtus elucet, ut in his quidem Morbis cum *Peruviano Cortice*, omnium excellentissimo, quae haecenus innotuere, Febrifugo, de praestantia contendere posse, caetera vero longe superare videatur. Si enim utriusque commoda cum incommodis contulerimus, Salem Ammoniacum aliis quidem dotibus Cortice inferiorem, aliis vero superiorem comperiemus, et haec equidem ea, ni fallor, ratione comparata observabimus, ut quis omnibus utrinque rite pensitatis nec Sali favere, nec quidquam Cortici derogare videri possit, si neutrum alteri praeferendum, utrumque vero in usu retinendum et alterutrum pro re nata usurpandum censuerit. *Peruviani* quippe *Corticis* virtus in hisce major est.

I. Quod, etsi successuum constantia in Medica haecenus Arte paucissima tantum Pharmaca *Sali Ammoniaco* aequiparari possint, constat tamen, *Corticem*, ut experiundo didici, illi eo quidem nomine antecellere; imo tanta operandi certitudine eminere, ut nostram equidem expectationem centesimo vix casu fefellerit. Tametsi hujus constantia, quantacunque etiam fuerit, idcirco perpetua habenda non sit, uti vel solus *Mortonus* Medicus experientissimus et maximus *Corticis* Patronus docere poterit, qui se ter illius virtutem Intermittentibus depellendis imparem observasse, candide et ingenue fatetur.

2. Quod nonnunquam Tertianae simplices Cortice Peruviano citius curari queant; quando nimirum vel in ipso paroxysmo vel paulo post ad Aegrum Medicus accesserit; tunc enim hujus Medicaminis usu confestim inchoato vel nulla amplius vel unica tantum Febris accessio recurret; cum in ejusmodi casu a Sale Ammoniaco, quippe quod haud ante proximi paroxysmi initium adhiberi potest, unica passim et interdum binæ etiam accessiones perferendae restent.

E contra vero *Salem Ammoniacum* in his rursus *Cortici* praestare comperi.

1. Quod ab illius usu recidivæ omnino rarissimæ, a China China vero frequentissimæ fiant, uti in innumeris quidem Aegrotantibus expertus sum; nisi forte quis Cortice jam curatus per plures tamen hebdomadas ingentem pulverum ejus numerum, aut longe etiam majorem ejusdem Medicaminis sub alia forma parati molem devoraverit; quod equidem paucissimos præ maximo nauseosi Remedii toties repetiti fastidio et averfatione præstare aut posse aut velle quotidiana quemlibet experientia docere poterit. Quod hercle gravissimum hujusce Medicaminis incommodum, et tanto quidem gravius censendum, quod ab ejusmodi recidiva ejusdem Pharmaci ope curati nihilo majorem quam ante valetudinis securitatem adipiscantur; plures etenim hac ratione ter quaterve relapsos, neque tum etiam recidiva ulteriore immunes observavi, ita ut nonnulli valetudinis adeo incertae et morbi toties recurrentis pertaesi, repudiato Cortice, certius salutis praesidium in alio tandem Medicamine quaesiverint.

2. Quod illae quidem Tertianae duplices et Quotidianae, quarum accessiones diu durantes se invicem celeriter insequuntur, exiguo tantum relicto intervallo, quo Aegri ad quietem et corporis a Febre quassati refectioem indigent, passim multo citius et commodius Ammoniaco Sale, quam China China curari possint. Cum enim Cortex non nisi in ipsa Februm intermissione adhiberi debeat, illiusque usus et certis adstrictus intervallis et saepe repetendus sit, pro hoc equidem hic illud, quod paroxysmos separat, tempus, neque sat longum, neque satis commodum relinquitur;

quare plures paroxysmos Aegrum perpeti necessum est, ante quam tantam istius Medicaminis copiam consumpserit, quanta quidem Febri omnino suppressendae suffecerit.

3. Quod Tertianae et Quotidianae interdum una et passim binis Salis dosibus curari soleant; cum istiusmodi Aegri sex septemve et nonnunquam multo pluribus Chinae Chinae pulveribus ad eandem curationem egeant, atque ita eam, quam ex Medicamentis sumendis capiunt, molestiam tanto saepius subire, ac taedium inde ortum vincere necessum habeant.

4. Quod si non cunctis saltem quamplurimis multo sit facilius paucillulum Liquoris gulam celerrime transeuntis, in quo Sal Ammoniacum penitus solutum atque liquatum offertur, sorbere, quam Pulverem ex ore difficulter amolendum, et tantae quidem molis, quanta illi, qui ex Cortice parantur, devorare. Utriusque enim Medicaminis sapor, cum in altero amarissimus, in altero vero falsissimus sit, aequali ferme incommodo molestus vix ullum in delectu discrimen affert.

5. Quod etsi me nullam hactenus noxam, nullumve morbum ex recto atque legitimo Chinae Chinae usu prognatam vidisse confitear, licet illud jam per 15, et quod excurrit, annorum spatium saepissime adhibuerim, multae tamen, quae hunc Corticem suspectum reddant, historiae ubique fere circumferantur; unde in his saltem Regionibus enatum est tantum in ejus usum praejudicium, ut eum multi etiamnum vehementer ac pertinaciter respuant, nec a sua se opinione dimoveri patiantur, atque ita Medicis vel invitis alio omnino Medicamento utendi necessitatem imponant. Cum e contra hisce temporibus de Sale Ammoniaco nihil tale, nullumve cuiquam praejudicium haereat, nec ullus sit inde mali futuri metus.

Quae cuncta, nisi me vehementer fallat animus, ejusmodi sunt, ut illis rite ponderatis, *Sal Ammoniacum* in Tertianis et Quotidianis curandis posset ab aequo rerum Arbitro *Cortici Peruviano* si non anteferri, summo saltem jure atque merito aequiparari.

OBSERVATIONES
DE
VIRIBUS ET USU
SALIS AMMONIACI
AD
FEBRES TERTIANAS ET QUOTIDIANAS INTER-
MITTENTES
CURANDAS.

CLASSIS I.
QUA CONTINENTUR
OBSERVATIONES XXVIII

DE
TERTIANIS ET QUOTIDIANIS INTERMITTENTIBUS
SALE AMMONIACO
FELICITER CURATIS.

SECTIO I.

Quae de *Tertianis Simplicibus* Sale Ammoniaco curatis
Observationes XXII continet.

Art. I. *In quo Observationes VIII de Tertianis Simplicibus in
Adultis una tantummodo Salis Ammoniaci dosi curata.*

OBSERVATIO I. (Casus I. Ao. 1702.)

Virgo ad triginta circiter annos nata VII Octobr. ad ve-
esperam in Tertianam incidit; cujus deinde accessiones haud
eodem stato diei tempore recurrunt, ast tanto brevioribus
intervallis ut XVII^{mo} ejusdem Mensis die jam tum hora

octava matutina aegrotantem corripere. Tunc, cum nostram imploraret opem, ei *Salem Ammoniacum* ad ℥iv sub proximi paroxysmi initium aut paulo ante sumendum praescripsi; cujus tanta quidem vis fuit, ut ea, qua tunc temporis afflictabatur, accessione finita nullam postea Febrem experta fuerit, at mox absque ullo alio Medicaminum usu perfecte convaluerit.

OBSERVATIO II. (*Casus 2. Ao. 1703.*)

Mulier sexto et trigésimo aetatis anno Tertianam nata et quatuor illius paroxysmos perpeffa, qui non bidui spatio, sed circumactis tantummodo tribus et quadraginta horis revertebantur, xi *Martii*, quamprimum Febrem redeuntem animadvertit, mox nostrum secuta consilium *Salem Ammoniacum* ad ℥iβ in liquore dilutum hausit; unde quidem frigoris duratio fuit multo quam ante brevior, subsequens autem aestus et sitis gravior. Nihilominus xiii ejusdem Mensis nulla, quam metuebat, Febre, at aliquo tantum caloris incremento tentata pristinam sibi valetudinem ab eo tempore redditam ac restitutam sensit.

OBSERVATIO III. (*Casus 3. Ao. 1703.*)

Agricola annum agens secundum et trigésimum Febre afficitur, cujus itidem accessiones, cum diebus alternis redeunt, pristinum invadendi momentum per aliquot horas antevertunt. Is autem, cum xxiv *Martii* quintum paroxysmum jam ingruentem praesentiret, ex praecepto nostro confestim *Sale Ammoniacum* ad ℥iβ in Aqua dissoluto usus, tam admirabilem ejus effectum expertus est, ut paulo post adventans Febris vix semihora elapsa a Medicamine victa decesserit, nec unquam postea reversa fuerit.

OBSERVATIO IV. (*Casus 4. Ao. 1703.*)

Mercatori, qui ix *Maji* et anno vitae tertio ac quadragésimo prima Tertianae accessione correptus fuerat, *Salem Ammoniacum* ad ℥iβ sumendum praecepi, cumprimum scilicet alterius paroxysmi adventantis indicia persentisceret. Quo facto is hujus consilii eventus fuit, ut postridie ejus diei saporem quidem oris amarum, deinceps vero nullam omnino Febrim fuerit expertus.

OBSERVATIO V. (*Casus 5. Ao. 1703.*)

Uxori cujusdam Mercatoris annos circiter quadraginta natae, quae in Tertianam implicita jam tres quatuorve illius accessiones sustinuerat, xxvi *Maji* iv *Ammoniacy Salis scrupulos* praebui, simulatque recurrente Febre tentari inciperet, et eo quidem successu, ut mox in hoc ipso paroxysmo debilitata Morbi vis multo mitius quam ante aegrotantem affligerit, immo exinde usque adeo fracta fuerit, ut ab eo statim tempore Febris eam penitus dereliquerit.

OBSERVATIO VI. (*Casus 6. Ao. 1703.*)

Consul Urbis Stenovici in Transsylvania annum aetatis agens tertium et trigesimum, xv *Junii* hora octava matutina Tertiana laborare coepit; cujus paroxysmus horarum 43 et $\frac{1}{2}$ circuitu recurrens xvii^{mo} ejusdem mensis die et horae quartae nocturnae medio accessit, levi tantum frigore, ast gravioribus carniū dorsum et artus circumvestientium motiunculis stipatus, subsequente deinde calore et capitis dolore, sed neutiquam gravi, caeterisque consuetis hujusce Febris effectis; quibus cum aegrotum exercuisset, hora duodecim meridiana decessit. Postridie vero ope nostra usus, potiunculam ex *Sale Ammoniac* ad 3iβ in aqua liquefacto, noctu febre incipiente sumendam, paravit. Quod quidem ei remedium tantopere profuit, ut non solum ea, quae mox ejus usum insequeretur, accessio multum fuerit levata, sed et illico pluribus exinde pustulis circa labia erumpentibus tota vis morbi radicitus extirpata.

OBSERVATIO VII. (*Casus 7. Ao. 1703.*)

Pistor annum circiter aetatis sextum atque trigesimum gerens, xvii *Augusti* mox a meridie Febre coepit affici, a qua ei artus inferiores praesertim circa genua ita ab initio diriguere, ut eos sine difficultate movere non posset: hoc symptoma frigus insecutum, deinde calor cum cephalalgia conjunctus, denique sudor, lumborumque dolor, quibuscum haec morbi scena fuit terminata. xix *Aug.* mane circa mediam decimam altera rediit accessio priore gravior, ast in principio non ut ante artuum rigore, sed capitis dolore molesta; mox deinde frigus subsecutum horae circiter spatio

durans: hoc calor exceperit, atque vehemens capitis dolor: elapsis duabus post meridiem horis sudor erupit, atque una cum lumborum dolore ad quintam usque perstitit: quo scilicet tempore Aeger se Febre jam immunem reputans electo quidem surrexit, attamen Capitis dolore in fronte quammaxime circa supercilia haerente et ex Corporis motu, praesertim ab incessu, ingravescente per totam etiam vesperam afflictus fuit. Vomitus in hoc morbo nullus, nisi quod Aeger in hocce paroxysmo sumptum aquae haustum post horae quadrantem denuo rejecerit. Ciborum appetitus in ipsa Febris intermissione mediocris, in accessione nullus. Cum autem *xxi Aug.* circa mediam decimam matutinam tertius hujusce Febris paroxysmus recurrere, et primo artus inferiores, ita ut in ipso morbi initio, sed levius afficere, et mox deinde caput illis derelictis petere inciperet, confestim jussu nostro *Salem Ammoniacum* ad $\mathfrak{z}\text{ss}$ in potione dilutum et colliquefactum ebibit, tantumque in eo expertus fuit opis, ut haec ipsa accessio prioribus non solum mitior et cum minore capitis dolore conjuncta fuerit, atque pustulae (quae saepe solent esse Febris discessum parantis indicia) circa nasum in exteriori cute erumpere, illiusque interior membrana tumescere coeperint, sed et deinde nullam amplius Febrim expertus, ast *xxiii Aug.* levi solummodo capitis dolore tentatus, quem ex eo, quo tunc se exercuerat, labore prognatum existimabat, ita quidem expectatione sua multo celerius pristinam omnino sanitatem recuperaverit.

OBSERVATIO VIII. (Casus 8. Ao. 1703.)

Uxor cujusdam Verbi Divini Ministri jam grandis natu, mense *Septembri* in Tertianam implicita, cum duos ejus paroxysmos per 5 vel 6 horas durantes experta fuisset, nostro consilio, tertia accessione adventante, mox *Salem Ammoniacum* ad $\mathfrak{z}\text{ss}$ in Aqua dissolutum hausit; a cujus usu, ut postea intellexi, illa quidem phlegmata ingrati saporis in os sibi saepius adscendere conquesta, ast Tertianâ omnino liberata fuit. Interea tamen, cum praeter Febrim Corpore vitiatis humoribus infirmo laboraret, et ulteriorem sui curationem negligeret, non tantum depulsa jam Tertianâ vale-

tudine minus commoda usa est, sed et proximo mense in Febrem continuam incidit, ut nostram rursus opem implorare coacta fuerit. Sed hujus morbi curationem, a scopo quippe nostro alienam, hic subjungere necessum non est.

Art. II. *In quo Observationes VIII. de Tertiana Simplici in Adultis duplici Salis Ammoniaci dosi curata.*

OBSERVATIO I. (Casus 9. Ao. 1703.)

Juveni, cum xix circiter annos haberet, per trimestre quidem spatium Tertiana laboranti, ix Junii Salem Ammoniacum ad $\mathfrak{z}\beta$ in aqua dilutum mox accedente paroxysmo, cujus reditum tunc temporis opperiebatur, sumendum praescripsi; cujus efficacitate haec ipsa accessio multum levata Aegrum longe minus quam ante afflixit. Cum vero xi Junii nova accessione redeunte eadem ejusdem Salis dosi simili ratione iterata fuisset, Febris hujus viribus resistendo impar penitus discessit, atque ita Aeger protinus convaleuit.

OBSERVATIO II. (Casus 10. Ao. 1703.)

Nobilissima Matrona annos magis quadraginta nata xxvi Julii minus recte valere, et tota porro nocte ex gravi capitis dolore, nausea continua, atque irritis ad vomendum conatibus aegrotare coepit. Postridie vero morbi rursus expers visa: ast xxviii Julii hora nona matutina altera accessio reversa, manifesta prae se ferens Febris indicia; primo enim frigore et nausea, deinde siti, et leviori quam ante cephalalgia, ast gravi dorsii crurumque dolore afflixit; et copiosis tandem sudoribus elapso 12 horarum circuitu decessit. Varia tunc a Medico praescripta Medicamina, ut Pulveres praesertim ex *Bezoart. min.*, ac *Salibus Absinth.* et *Card. bened.* compositi, et Potio ad vi circiter uncias ex iisdem una cum *Sale Prunell.*, *Croco.*, *Ol. Nuc. Mojsch. expr.*, *Sale volat.*, *Conf. Alcherm.* et *Aquis destillatis*, confecta; sed vix, ut patebit, usurpata. Cum enim xxx Julii mane hora media sexta Febris sat vehemens, ast cum levi frigore celeriterque recedente recurreret, in ipso accessionis initio ex dictis quidem Pulveribus unum adhibuit, sed mox rursus evomuit: porro gravis successit aestus: et, cum hora primum octava, atque iterum decima, de memorata Potione

cochlear unum alterumve sumpsisset, multus ei sudor erupit ad sextam usque vespertinam persistens, et una cum Febre tum demum desinens: totum vero paroxysmum continuo fere stomachi dolore et anxietate subinde ingravescente et remittente afflictata transegit, pulsumque pariter nunc magis nunc minus acceleratum habuit. I *Augusti* accessio rediit crebro ad finem usque vomitu molesta, quo et Aegra Pulverem in principio sumptum impetu vehementi celeriter rejecit, et pariter, quidquid deinceps de Potione medicata hauserat, evomuit. Immo finita etiam Febre nausea non desit. III *Augusti* eam jam tum noctu paroxysmus ast levior corripuit; hoc tamen hora sexta matutina jam finito in animi deliquium incidit. *Postridie ejus diei* sub vesperam accessio superiori similis recurrit, atque una cum sudore in ejus declinatione erumpente vix ultra 5 horas persistit. In utroque hoc paroxysmo frigus breve fuit, sitis autem et aestus graves, nausea etsi remissior quam ante, continua tamen, nec in ipsa Febris intermissione desinens. Atque hac fere ratione continuata Febris; donec x *Augusti*, appropinquante paroxysmo, primo Medicamine ex *Laud. Opiat. gr. i.*, *Sal. Absynth. ʒi, et Ol. Nuc. Mosch. expr. gr. xvi*, ab eodem, de quo ante, Medico ad vomitum cohibendum praescripto usa, de nostro porro consilio *Salem Ammoniacum* ad ʒiv in aqua liquefactum sumpserit, atque illud, cum per bihorium retinisset, tum demum, vel ex parte saltem, una cum vi fere bilis *unciis* vomitu rejecerit; quo facto, molestissimo hoc nausae et vomitus symptomate prorsus liberata paroxysmum itidem levem, etsi fere pari ac ante spatio terminatum habuit. xii *Augusti* eandem *Salis Ammoniaci* dosin ingruente Febris accessione repetiit, eamque multo quam ante leviolem experta fuit. *Postridie* Vinum quidem Medicatum ex *Herbis Stomachicis et Febrifugis* praescriptum, sed jam ante ejus usum Febris Aegrotantem reliquit, atque ejus valetudinem infestare desit.

OBSERVATIO III. (*Casus II. Ao. 1703.*)

Virgo quadragesimo circiter aetatis anno in Tertianam incidit, et quinque vel sex illius accessiones sustinuit, quae gravi capitis dolore infestae et elapso 12 horarum spatio

decedentes, non bidui sed brevior circuitu revertabantur. Febre vero intermittente recte valuit. Tum autem hujusce morbi pertaesa iv *Septembris* me accessit, ut praesens ad hoc malum remedium quaereret, et ex nostro praescripto *Salem Ammoniacum* ad ʒiβ proxima nocte sumpsit, cum nempe paroxysmum jam ingruentem animadverteret; quo facto vix ullum eam frigus affecit, ast calor una cum capitis dolore toto die perstitit. Quamobrem, cum me postridie consuleret, ejusdem Medicaminis usum iterandum censeui: quod et proxima nocte fecit, cum nempe levem Corporis alterationem sentiens novam accessionem adventare putaret; ast *Sale* sumpto mox somnus ei obrepit, et mane expergefacta bene sese habuit, neque ulla amplius Febre vexata convaluit.

OBSERVATIO IV. (*Casus* 12. Ao. 1703.)

Consul Urbis Stenovici, Vir sexagenarius et Podagra bis terve in anno graviter affectus, postquam xvii *Septembris* tempestate aliquanto frigidior in cubiculo foco destituto cum aliis sermonem per aliquot horas produxerat, octava vespertina domum reversus et algens aegrotare coepit, et quae ventriculo continuerat, vomitu rejecit: postridie vero recte rursus valuit. Ast xix *ejusdem mensis* hora media sexta Febris recurrit, et primo horrore atque rigore, deinde calore, capitis lumborumque dolore, aliisque manifestis se prodidit indiciis. xxi *Sept.*, hora circiter 12^{ma}, tertia Febris accessio reversa, non solum horrore atque rigore, sed frigore acerrimo, ac si totum ubique Corpus aqua gelida subito perfusum fuisset, aegrotantem concutere exorsa. Quare xxiii *Sept.* tempore matutino nostro consilio usus confestim *Salem Ammoniacum* ad ʒiβ aqua dissolvere jussit; ast, cum mox, hora nempe nona, paroxysmus eum subito atque inopinato invaderet, *Salem* hunc in aqua nondum liquescentem protinus hausit, et gravi rursus frigore riguit. xxv *ejusdem mensis* eandem *Salis Ammoniaci* sed prius in aqua liquefacti dosin mox adventante Febre repetiit; attamen hac accessione licet ultima sat gravem illius vim sustinuit: exinde enim nullum amplius Febris aut valetudinis

indiciū fuit expertus, atque ita in antiquum sanitatis statum omnino restitutus.

OBSERVATIO V. (*Casus 13. Ao. 1763.*)

Vir circiter quintum et quinquagesimum agens annum, qui antea Bataviae in India Orientali Centurionis munere functus erat, cum per tres fere septimanas appetitum prostratum senserat, v *Octobr.* jam vespere Febre coepit affici, quae, cum in multam noctem persisterat, decessit. vii *Octobr.* Febris rediit, et primo horrore atque tremore, at levi tantum frigore et per 7 vel 8 minuta tantummodo durante, deinde vero cephalalgia atque gravi lumborum dolore, usque dum abierit, aegrotantem exercuit. ix *Octobr.*, cum suomet ipse consilio *Extracti Absynth.* ʒβ sumpsisset, Febris tamen hora decima matutina priori plane similis reversa. Appetitus, uti jam antea maxime languit, ita et toto morbi decursu propemodum abolitus persistit. xi *Oct.* quum noctu a phlegmate e naribus in fauces delapso vomitu satis vehementer correptus materiam quandam nigram sapore dulcem et in aqua liquecentem rejecisset, mane hora media nona Febrem iterum ingruentem sensit, et ex nostro tum praecepto *Salem Ammoniacum* ad ʒiβ cerevisia dissolutum confestim hausit; at semihora ferme elapsa illud, illiusve partem, ita uti sumpserat, absque ulla alia materia admista vomitu reddidit. Paroxysmus tunc quidem brevis, at prioribus multo vehementior et cum delirio conjunctus, in copiosissimum sudorem exiit, atque una cum eo hora secunda postmeridiana desiit. xiii *Octobr.* mane hora septima redeunte Febre, eandem *Salis Ammoniaci* dosin repetiit, sed rursus, ut ante, post semihoram oborto vomitu, caeteroquin tunc temporis neutiquam molesto, illius in ventriculo residuam partem ore rejecit. Accessio etsi, ut ante, cum delirio conjuncta, praecedente tamen multo mitior breviorque, jam ante meridiem media undecima fuit terminata. xv *Octobr.* haud alio incommodo nisi levi tantum horrore tempore matutino per quadrantem horae affectus, nulla praeterea Febris indicia sensit, atque ita ab hoc morbo relictus, penitusque curatus permansit.

OBSERVATIO VI. (*Casus 14. Ao. 1704.*)

Mulier trigesimo circiter vitae anno Febris Tertianae paroxysmo bis afflictata, xxiv *Februarii* mane paulo ante tertiam Febris accessionem de nostra sententia *Salis Ammoniaci* ad ζss in aqua diluto usa, horrore tamen atque tremore vehementi, et gravi admodum Febre correpta fuit. Nilominus nostro nixa consilio, xxvi *ejusdem mensis*, paulo ante illud temporis momentum, quo quarti paroxysmi recursum metuit, eandem *Salis Ammoniaci* dosin iteravit: nec ejus spem fefellit eventus, dum post hujus usum nulla omnino Febre, ast eo ipso tempore aliquo tantum capitis dolore tentata fuerit, atque ita ab hoc morbo cito penitusque curata convaluerit.

OBSERVATIO VII. (*Casus 15. Ao. 1704.*)

Vir annos ferme triginta natus, cum duos Tertianae paroxysmos neutiquam graves expertus fuisset, xviii *Martii*, tertia accessione bihorio ante illud diei tempus, quo prior accesserat, recurrente, praescriptum a nobis ad \mathfrak{v} et in aqua liquatum *Ammoniacum Salem* protinus hausit; at duabus post horis hujusce Medicaminis partem vomitu rejecit. Gravis interim poroxysmus vehementer admodum aegrotantem afflixit. Attamen xx *Martii* egregius *Salis* effectus clarissime patuit; cum enim hora octava matutina, qua circiter Febrem redituram existimabat, eandem *Salis Ammoniaci* dosin iterasset, haud aliud incommodum praeter ventriculum a Medicamine perquam oneratum expertus, sese jam a Febre liberatum advertit, neque ulla deinde valetudinis vestigia relicta sensit.

OBSERVATIO VIII. (*Casus 16. Ao. 1704.*)

Juvenis annum gerens aetatis sextum et vigesimum, cum per aliquot dies rusticatus intemperanter vixisset, atque se cibis, vino, illiusque spiritu et cerevisia pinguiore frequenter et avide ingurtitasset, xx *Augusti* nausea et vomitu correptus, porro in Febriculam vigiliis, aestu et aliis incommodis noctu praesertim infestam incidit; in quem etiam morbum alter ejus socius ex eodem vitae genere paucis ante diebus implicitus fuerat. Quamobrem hisce

molestiis nequaquam remittentibus, post octiduum sese ad medicaminum usum convertit, et *Nitri fixi* \mathfrak{z} j bidui spatio consumpsit; inde febricula liberatus sese quidem melius habuit, corpore tamen et animo magnopere languens vi vel vii *Septembris* ex Febre intermittente laborare coepit: praescripto vero *Peruviani Corticis* usu, cum eo, quo Febris intermittebat, tempore vi ejus *drachmas* usurpasset, morbo depulso rectius se habuit, et, ut recidivam praecaveret, octiduo post dimidiatam ejusdem medicaminis dosin repetiit, et pristinum interea corporis habitum atque vigorem recuperavit. Verumenimvero, cum iv *Octobr.* se ab *Asellis minoribus* etsi a me serio prohibitis non continuisset, immo his quidem ventriculum onerasset, postridie, uti et sequente, quo diu in pluviis incesserat, die febricula correptus est; et porro vii et ix *Octobr.* in paroxysmum sat gravem, medio vero inter utrumque die in accessionem valde levem, atque ita in Tertianam duplicem incidit; quae tamen x *Octobr.* iterato *Corticis* usu et vi ejus *drachmis* adhibitis celeriter fugata discessit. Hic tamen nondum hujusce morbi finis. Etenim xxviii *Octobris* rursus, valetudine tentari, et postridie circa meridiem paroxysmo febrili perquam gravi, et simul crebro vomitu bilioso, alvi profluvio, atque sudoribus mox in ipso accessionis initio erumpentibus affligi coepit. xxx *Octobr.* levissima tantum Febris accessio: postero vero die paroxysmus vomitu iterum et alvi fluxione, sudoribusque penultimo similis, et eadem quoque hora exorsus, aegrotantem exercuit. i *Novembr.* Febris expers recte valuit; ast postridie ejus diei paroxysmus priori similis, eademque iterum hora recurrit. Capto ergo nobiscum consilio, iv *Novembr.* dimidia ante Febris adventum hora *Salem Ammoniacum* ad \mathfrak{z} v in aqua liquefactum adhibuit, atque mox ejus virtute poroxysmum tunc temporis levatum adversit; quare vi *Novbr.* eadem hora eandem istius *Salis* dosin repetiit, tuncque paroxysmum multo magis diminutum et vix tribus elapsis horis decedentem habuit. viii *Novembr.* Febris accessio sed levissima rediit, et, uti jam ei auguratus fueram, vix unam et dimidiam horam perstitit. x *Novembr.* nulla eum Febris, ast aliquis tantum capitis affecit dolor. Atque ita tandem hic morbus penitus extirpatus

aegrotantem dereliquit, neque ullam postea recidivam genuit.

Art. III. *In quo Observationes IV. de Tertianâ Simplici in Impuberibus et Infantibus, vel una, vel duabus Salis Ammoniaci dosibus curata.*

OBSERVATIO I. (Casus 17. Ao. 1703.)

Jurisconsulti cujusdam in Drenthia Filiolae, quum exacto octavo aetatis anno per aliquod tempus Tertianâ laborasset, cujus accessiones breviores quam bidui circuitu revertebantur, xxiv Aprilis, rogatu Parentis, *Salem Ammoniacum* ad \mathfrak{z} i in aqua dissolutum paulo ante proximi paroxysmi adventum hauriendum praecepi; nec diu post tantum hujusce Medicaminis successum intellexi, ut Febris illius opere depulsa, et prospera Puellae valetudo restituta fuerit.

OBSERVATIO II. (Casus 18. Ao. 1702.)

Puellula ad tres circiter annos nata, crasso atque obeso corporis habitu, quum 14 fere dies ex Tertianâ aegrotasset, atque me Parentes xxii Octobr. de celeri faciliq; ad hoc malum remedio consuluisent, proxima nocte, cum primum Febrem recurrentem cernerent, *Ammoniacum* ei *Salem* ad \mathfrak{z} ij in liquore dilutum praebuerunt; cujus virtute morbi impetus ita retusus, ut alter a Sale sumpto paroxysmus mitius quam ante, atque aestu minore Puellulam affligeret. Porro xxvi Octobr. eo quidem tempore, quo Febris reditum opperiebantur, idem *Salis* usus ad \mathfrak{z} ij β fuit iteratus; eo quidem Medicaminis successu, ut vix tunc Febris vel saltem non nisi levissime recurrere, atque deinceps penitus Filiolam relinquere visa fuerit.

OBSERVATIO III. (Casus 19. Ao. 1702.)

Eadem Puella a Febre liberata, atque undecim dierum spatio recte valere visa, vi Novbr. in paroxysmum febrilem recidit; et propterea viii ejusdem mensis die, cum accessionem iterum ingruentem sentiret, \mathfrak{z} ij β *Salis Ammoniaci* in aqua liquefacti celeriter hausit; ast, cum hoc Sal per errorem in aereo mortario contritum quasdam fortasse metalli particulas solvisset, accidit, ut paulo post in vomitum inci-

derit, atque ita nonnullam hujus Medicaminis partem procul omni dubio rejecerit. Id tamen haud frustra sumptum docuit eventus; siquidem Febris x *Novembr.* multo quidem levior, et xii, nec non xiv *ejusdem mensis* levissima tantum redierit, et ab eo tempore Puellulam penitus curatam reliquerit.

OBSERVATIO IV. (*Casus 20. Ao. 1704.*)

Filiolus Mercatoris, 14 aut 15 mensium infans, quem molestiae ex dentium eruptione natae per dies aliquot affecerant, cujusque scroto natibusque inde major, ut solet, orta faecum et urinae acrimonia jam a triduo cuticulam erosierat, xxxi *Januarii* insolito torpore atque somnolentia languere, postridie vero se melius habere visus est. ii *Februarii* altera morbi accessio faciei pallore atque artuum tremore exorsa, illum deinde consuetis Febris molestiis afflixit: postero vero die, ita, uti antea, recte valuit, et tum *Epicarpium* ex *Terebinthina* et *Caphura* confectum et carpo utriusque sub vespere applicatum habuit. iv *Febr.* ferme sine tremore Febris, caetera tamen priori similis accessit, et porro alternis diebus constanter recurrere perstitit, nisi quod xvi *Febr.* duobus continuis diebus, etsi deinde rursum alternis, redierit. Atque ita se res habuit, donec Parentibus huic morbo remedium postulantibus, xv *Febr.* *Salis Ammoniaci* ℞. paulo ante Febris adventum Parvulo in pulve offerendum curaverim; quo facto paroxysmus quidem brevius, quam ante afflixit, attamen postridie nec opinato rediit; atque ita tunc temporis Medicaminis nondum parati usus iterari non potuit. xvii *Febr.* nulla quidem Febris, postero vero die praegressis haud dissimilis reversa; tum autem Puerulo mox in ipso accessionis initio *Sal Ammoniacum* ad gr. xiv simili ac ante ratione datum. xxix *Febr.* nulla rursum Febris; et triduo exinde secuto illius quidem aliqua indies accessio rediit, sed hoc tempore circumacto penitus discessit; atque ita hoc malo liberatus Infans protinus convaluit.

Art. IV. *In quo Observationes II de Tertiana Simplici in Adultis, una vel altera Salis Ammoniaci dosi, adjuncto Vini Medicati usu, curata.*

OBSERVATIO I. (Casus 21. Ao. 1703.)

Vir quidam honoratus, corpore obesus, et ab aliquot retro annis nimia interdum Spiritus Vini copia usus, cujus aetas jamdum decies septenos Solis anfractus reditusque convertit at, xxiv Maji hora decima matutina frigore, horrore atque tremore correptus in Febrim intermittentem incidit; cujus accessio interjecto biduo ad septimam vespertinam rediit, et nullo quidem tremore, ac levi solum frigore, mox vero non tantum calore, siti, capitis dolore, caeterisque consuetis Febris indicibus, sed et urinae incontinentia Aegrotantem afflixit. Quamobrem xxviii Maji nostro consilio et adjumento usus, quum proxima nocte hora media tertia Febrem rursus adventantem animadverteret, mox *Salem Ammoniacum* ad ℥iβ in aqua dissolutum adhibuit; hujus autem accessionis initio frigus solummodo pedes adstrinxit, inde vero gradatim se sursum atque ita in totum omnino corpus diffudit; deinde non solum aestus, sitis, urinae incontinentia, caeteraque, ut ante, symptomata secuta, sed et gravis insuper praecordiorum anxietas: decima vero matutina, decresciente Febre, somnus obrepfit, eumque Aeger ad vesperam extraxit. xxx Maji, quum corpore senili pridiana febre quassato maxime langueret, et propterea ejusmodi pharmacum vehementer expeteret, quod ipsi posset torporem excutere, corpus roborare, et feбри simul resistere, idcirco hoc quidem ei Vinum Medicatum praescribere visum est.

Rx Rad. Helenii, Gentianae,

Lign. Colubrini an. ℥iβ.

Herb. Menthae, Cardui benedicti an. Mβ.

Summ. Absinthii, Centaurii minoris,

Flor. Chamomillae an. P. i.

Hisce concisis et contusis quum ante meridiem Vinum Gallicum ad ℥ij aut paulo majore copia fuisset affusum, ab Aegro hora quarta pomeridiana tres illius unctiae usurpari coeptae. Nocte proxima, fractis jam morbi viribus, nec

frigore laborans, neque aliis consuetis Febris incommodis, solam sitim atque anxietatem sat gravem expertus est, atque inde sibi ex febricula laborasse visus. Biduo sequente, nimirum *ultimo Maji* et *1^{mo} Junii* ter quotidie *tres* Vini Medicati *unciae* ab Aegrotante sumptae. Nocte proxima, hora secunda ultima Febris accessio et quidem cum frigore rediit, at leviter solum, neque ullo horrore aut rigore, neque tanta, ac antea, anxietate aegrotum afflixit. Exinde vero nulla amplius Febre tentatus, tota solummodo nocte, quae *v^{tum} hujusce mensis diem* praecessit, usque ad horam decimam matutinam interno frigore, quum externe caleret, subinde ingravescente atque remittente, nullis autem aliis molestiis affectus est. *vii Junii* pedum ei tumor oedematofus obortus, qui vesperi aggravescens, triduo tamen elapso disparuit; et deinde quidem *xix Junii* rediit, at levi solummodo purgatione paucisque remediis quotidie decrescens sensim evanuit. Atque ita omni depulsa morbi molestia Aegrotanti pristina reddita salus.

OBSERVATIO II. (*Casus 22. Ao. 1702.*)

Mulier plurimum liberorum mater, annum agens quintum et vigesimum, ab ultimo puerperio per integrum anni spatium, incertis quidem intervallis, pungentibus ab epigastrio ad umbilicum doloribus, subsequente faucium constrictione atque anxietate, afflictata, interea temporis in Febrim etiam tertianam incidit; atque ea tandem liberata, una cum appetitu prostrato memoratos dolores magis ingravescentes experta fuit; donec *xxii Septembr.* potione seu *mixtura*, ut ajunt, *antihysterica* et *sudorifera*, quam ei praescripseram, usurpata, mox inde hoc malum usque adeo levatum adverterit, ut se jam plane curatam neque ulteriore Medicaminum ope egentem existimaret. Nihilominus hoc morbo nondum radicitus evulso memorati dolores una cum faucium anxietate postea reversi fuere, ad quos iterum, ut ante, circa *Octobris* initium tertiana Febris sub vesperam recurrens accessit, oris interim anhelitu foetidum et simul subacidum odorem spirante, urina crassa atque pituitae referta. Huic ergo, cum nostram rursus opem implorasset, *ix Octobr.* hunc quidem horum Medicaminum usum praescripsi.

℞ *Laud. opiat. gr. iij*

Croci, Castorei an. ℥i

Affae foetidae, Gumm. Ammoniacy an. ℥β

Cum q. f. *Elix. Propr. M. F. Pilulae* N^o xv, de quibus quotidie mane, cum Febris cessaverit, *tres* capiat Aeger.

℞ *Rad. Gentianae, Helenii, Dictamni Cretici an. ℥ij*

Lign. Colubrini ℥β

Herb. Cardui benedicti, Menthae, Pulegii an. M. j.

Summ. Absinthii, Centaurii minoris an. P. i.

Sem. Sileris montani ℥ij.

Quibus concisis et contusis ac deinde vasi vitreo inditis affundantur Vini Gallici ℥ iii, atque per unum alterumve diem in loco calido detineantur: tum vero extra paroxysmum de hoc Vino *tres unciae* Aegrotanti quotidie ter exhibendae, ac tempore matutino illius usus mox, sumptis Pilulis, erit inchoandus. Consumptis autem hisce Medicamentis, dimidia ante Tertianae adventum, hora *Salem Ammoniacum* ad ℥ij in aqua liquefactum hauriat, idemque Medicamen proxima accessione repetat. Quae cuncta quum ex nostro praecepto rite essent perpetrata, Mulier et Tertiana et reliquo Morbo, uti postmodum intellexi, liberata feliciter convaleuit.

S E C T I O II.

Quae de *Tertianis duplicibus* Sale Ammoniaco curatis Observationes II. continet.

OBSERVATIO I. (Casus 23. Ao. 1707.)

Charissimus piae memoriae Frater, ingenio, doctrina et experientia egregius profecto Medicus, et Urbis Vollenhovae Consul, quum jam annos quadraginta compleisset, ibidem circa medium Mensis *Octobris* Tertiana duplici corripitur, cujus phaenomena adeo singularia et insolita fuere, ut mihi quidem operae pretium visum fuerit, illius Morbi historiam ex ejus literis tunc temporis ad me datis excerpere, eamque hic in ordinem redactam proponere.

Prima Tertianae accessio vespere ad horam circiter quintam invasit, in principio haud alio quidem incommodo, quam aliqua Corporis perturbatione, seu interna atque in-

solita commotione (quam vulgo *alterationem* dicunt) sese manifestans donec tribus post horis secuto paroxysmi vigore gravis in fronte et utroque occipitis latere (non autem in medio) dolor Aegrotantem corripere. Postridie hora nona matutina successit altera accessio, primus scilicet alterius seu posterioris Tertianae paroxysmus, nullo omnino Capitis dolore molestus. Atque sic ambo utriusque Tertiariae paroxysmi ea quidem ratione bis terve reversi, ut Aegrotanti nequitiam graves nullo quoque cum frigore, horrore, vel rigore affligerint, neque diu persisterint; quum prior scilicet vespere ad horam circiter octavam inciperet, et posterior ad sequentis diei meridiem desineret. Aeger itidem, quum Febres decesserant, recte valere visus, immo sani ad instar comedere, atque cuncta ex ordine quotidiano peragere. Tum verò uterque paroxysmus subito atque vehementer aggravescere coepit. Prior etenim accessio gravi cum aestu, ab octava vespertina ad primam nocturnam usque, aegrotum misere jactans tunc in sudorem copiosissimum exiit, qui una cum vehementissima siti per octo quidem horas persistit, donec scilicet superveniens altera Febris illi finem imponeret; quae equidem ab hora nona matutina ad mediam primam pomeridianam nulla quidem siti, nullis etiam doloribus, quales in Tertiana sentiri solent, et levi tantum ac sicco calore, aut terribili Corporis perturbatione atque interna commotione adeo vehementer Aegrotantem afflxit, ut etsi per 14 annos graves saepe Febres expertus sit, nunquam tamen ullam cum hac quidem comparandam fuerit perpessus. Primo quoque hujus paroxysmi trihorio phaenomenon admodum singulare et prorsus insolitum adfuit, quum nimirum quaelibet tam inspiratio quam expiratio ad $1\frac{1}{2}$ minuti tempus aut ad majus etiam spatium persisteret, et sub inspirationis cujuslibet finem Diaphragma tam alte descenderet, ut eum inde sensum atque imaginationem nancisceretur, ac si inspiratio seu potius inspiratione haustus aer sese deorsum infra umbilicum extenderet, et rursus sub cujuslibet expirationis finem expirandi principium seu aeris expirati origo tandem ad guttur usque adscendere videretur. Nullus ei interim alicujus in respirando difficultatis sensus, immo respiratio immano quantum liberior quam quidem in

fanitate visa. Pulsus Cordis hoc tempore tardus, aſt perquam validus, ita ut ſinguli ejus motus tam ſyſtoles quam diaſtoles maxima vi atque robore peragerentur: in Corde tum etiam acres punctiones et viviſſimi dolores ſentiebantur, a ſiniſtra papilla ſe oblique ſuſum et antrorſum ad ſternum uſque exporrigentes. Porro ſemihora a meridie gravi cum ſiti ſudor ſecutus, et quantitate et diuturnitate omnino prodigioſus: tanta enim perpetuo copia erupit, ut continuis ſemper rivulis a fronte naribusque deſluxerit, atque per lectum caeteroquin ſat craſſum plumisque anſerinis abunde reſertum in ſubjectum uſque ſtramen penetraverit, et iſta quidem vehementia ultra 24 horas perſiſtenterit. Immo in harum acceſſionum utraque id quoque prorſus inſolens atque maxime rarum, immo ſtupendum exitit, quod etſi ſemper in hoc morbo Saliva et Phlegmata prorſus omni ſaſto ſapore carerent, hic tamen ſudor tanta atque tam mirabili Salis copia fuerit reſertus, ut non ſolum, quoties in os influeret, tam acri et infeſta ſaſtione, quam quidem vehementiſſima Salis Ammoniaci in pauciſſima aqua liquefacti muria, guſtum afficeret, atque vel minima illius guttula, ſi forte in oculum incideret, eum ubique ignea quaſi vehementia roderet ureretque, ſed et praeterea, quum verſus paroxyſmi finem ſudor decreſcere atque minui inciperet, mox in cryſtallos concreſceret tantae fere molis, quanta vel Salis communis ſubtilioris, quale in noſtris quidem menſis apponi ſolet, granula, vel quae ex majoribus et integris iſtius Salis cryſtallis cochleari leviter fractis exſurgunt, paſſim deprehendimus; et ea quidem multitudine, ut ubique in barba non ſolum haerent, ſed et contigua ſibi invicem granula totam fere faciem contegerent, imo ad naſi latera aliis alia denſe ſuperſtrata incumbere; et quoties faciem ab illis purgari penitusque detergi curaſſet, toties intra 7 vel 8 minuta novis ruriſum Salis cryſtallis obduceretur. Erantque haec granula ita quidem comparata, ut digitorum contactu inſtar communis leviterque contriti Salis ſubrotunda, aſpera, atque acuminata ſentirentur. Cum tandem hic tam diutinus tamque vehemens ſudor deſuiſſet, veſperi ruriſum prioris Tertianae paroxyſmus Aegrum ſimili ac ante ratione affecit; nec non poſterioris acceſſio poſtridie hora

consueta, nona nempe matutina rediit, et inde quidem ad meridiem usque nec calore, nec frigore, nec tremore, sed vehementissimis et ferme incredibilibus horroribus Aegrotantem afflixit. Inspiratio et exspiratio tunc temporis, etsi duplo quidem quam in praegresso hujus Tertianae paroxysmo breviores, etiamquam tamen pergrandes atque admodum diuturnae fuere: Qualibet autem Cordis Systole dolor ejus multo quam ante major; et Corporis interna commotio atque perturbatio, etiamsi in praecedente ejusdem Febris accessione, ut supra memoravimus, gravissima fuerit, nunc tamen duplo quidem infestior extitit, adeo ut Aeger isto trihorio tantum se inde perpassum existimaverit, quantum quidem aliquis absque funesto eventu sustinere posset. Ipso vero meridie sudor erupit, qui tam in hac, quam in ea, quae hac nocte affuerat, prioris Tertianae accessione, sive illius copiam, sive falsedinem, seu denique Salis granula, eorumque multitudinem spectaveris, prorsus ut ante sese habuit; in eo solum discrepans, quod in utroque hoc paroxysmo, uti et in sequentibus diutius etiam, quam in praecedentibus persistit; siquidem in utraque accessione sudoris tempora conjunctim computata 40 horarum spatium excesserint. Phlegmata interea uti antea, ita et in hisce, atque in sequentibus paroxysmis omni Sale, quantum quidem gustu dijudicari poterat, orbata. Imo haecenus in hoc morbo Saliva non tantum non salsa fuit, ut supra notavimus, sed et dulci ac simul nauseoso atque putido ejusmodi sapore praedita, qualis praesertim in corrupto piscium marinorum jecinore deprehendi solet; unde quum continuo in os deflueret, continuam etiam aegrotanti molestiam peperit. Adhuc nulla quidem Medicamina adhibita, si pauca Alcalina, ut *Oculos Cancris*, *Testas Ostreorum* siccitas et *Nitri fixi* duas tresve *drachmas* exceperis, quae scilicet ab eo, quo morbus aggravescere coepit, tempore, absque ullo tamen effectu, usurpata fuere. Porro finitis paroxysmi postremo memorati sudoribus paulo post, consueta ad vesperam hora, tertia ab ingravescente morbo prioris Tertianae accessio recurrit, nec minus, quam secunda, sudorum abundantia, falsedine, atque diuturnitate memorabilis extitit. Postridie vero mane, et horae circiter spatio ante, quam hanc qui-

dem Febrem posterioris Tertianae paroxysmus exciperet, sumpsit Aeger Salem *Ammoniacum* ad ʒi in aqua liquefactum; cujus scilicet usum hucusque distulerat, et quia de ipso morbi genere incertus, utrum haec Febris ad continuarum remittentium, an vero ad intermittentium classem pertineret, haecenus ambegerat; et quia hic morbus adeo singularis de hujus Medicaminis effectu ei dubitationem et scrupulum iniecerat; id quidem veritus, ne isti forte Sali, cujus tam prodigiosam in Corpore copiam sudores demonstraverant, tanta cum *Sale Ammoniaco* intercederet affinitas, quae hujus vim eludere, atque ita effectum frustrari posset, Interea, ut solent esse vanae atque fallaces de Medicaminum effectis opiniones, quotiescunque experientiae non fuerint innixae, tantum hic *Sal Ammoniacum* habuit successum, ut inde confestim admirabilis in morbo mutatio nata, atque illius impetus non tantum retusus, sed et fractus fuerit, ita quidem ut Aeger haud alio ad eum penitus depellendum remedio indiguerit. Utrumque scilicet *Sal Ammoniacum* ab Aegrotante sumptum fuerat, mox illud in ventriculo operari, et quadrantis horae spatio sese in totum abdomen diffundere, ibique adhuc per dimidiam circiter horam leniter admodum et absque ullo incommodo agere sensit: quo facta, etsi mox alter ille paroxysmus accesserit, confestim nec opinato putidum istum atque nauseosum Salivae saporem majore ex parte correctum atque sublatum animadvertit; et praeterea non sine admiratione tam celerem hujus Medicaminis successum deprehendit, ut haec ipsa accessio mox inde levata eum primo illo trihorio, quo ante summa violentia saevierat, nunc quidem duplo saltem minus afflicta verit; etiamsi sudores hoc tempore secuti nec copia, nec falsedine quam ante minore profluxerint, neque citius desinentes, in posterum omnino diem et quidem in pomeridianum tempus persistierint; et denique non sine stupore tam admirabilem ejusdem Medicaminis virtutem expertus est, ut hujus posterioris Tertianae Morbus (cujus ea, quam modo memoravimus, accessio fuerat) etsi gravissimus plane, atque modo in summo vigore tantum non Aegrotanti exitium afferre visus, mox tamen ab hoc ipso tempore protinus extinctus et funditus extirpatus fuerit; atque

ita tantae ac tam prodigiosae Salium morbidorum atque minacium copiae affinis tamen et cognati *Ammoniaci* Salis exiguo solum pulvere tam celeriter everfae atque fugatae extiterint. O profunda, ô admirabilia rerum naturalium mysteria, ô coecas hominum mentes, qui in hiſce quanto minus ingenio pollent, tanto plus ei tribuunt, atque abditas rerum naturalium cauſas et arcanos illarum nexus ſibi ubicunque pateſcere putant, et hinc faſtu turgidi atque elati experimenta deſpiciunt, et levibus potius atque jejunis ratiunculis in tanta rerum caligine morborum curationes ſuperſtruunt! ſed e diverticulo in viam. Nec ſolum Salis Ammoniaci efficaciaſ ad poſteriorem, ad quam depellendam ſumptum fuerat ſed et ad priorem Tertianam abigendam contulit. Hujus enim acceſſio ad veſperam, quum paulo ante ultimus alterius Tertianae paroxyſmus deſierat, reverſa, minus quam antea vehemens extitit; quamvis ſudores ſimili ſeſe ratione habuerint, nec multo minore copia profluxerint: exinde porro fractis jam ejus viribus bis tantum rediit, et ita quidem, ut ſingulis vicibus, ipſis etiam ſudoribus maxime imminutis, vehementer decreverit, atque tum aegrotantem prorſus dereliquerit. Illo autem octiduo, quo Aeger Febres haſce graviffimas expertus eſt, corpus maxime extenuatum, et plus quam 25 librarum pondere imminutum habuit; viribus adeo conſumptis, ut niſi ab alio ſuſtentatus ne pauciſſimis quidem paſſibus progredi valeret. Eodemque temporis circuitu copioſiſſimis illis, quibus tunc diſſuxerat, ſudoribus plures *Salis* iſtius ſupra memorati *libras* à ſe per cutim fuiſſe excretas ſibi, perito admodum Geometrae, certo certius conſtare retulit. Maximo-pere vero doluit, quum ob ſudoris vehementiam in gravioribus illis paroxyſmis ne corpus quidem commovere fuiſſet auſus, ſibi non licuiſſe aliquam illius Salis copiam colligere, ut poſtmodum, qualis ei indoles eſſet, et quaenam inter illud et cognitas aliorum Salium ſpecies vel convenientia et affinitas, vel differentia intercederet, chymicis experimentis, inquirere et explorare poſſet; neque ſe magis cryſtallorum ex hoc Sale concretarum figuras in promptu intueri potuiſſe, quum prae ſumma morbi violentia tunc temporis neque candelae neque diei lucem oculis ulla ratione per-

ferre valuisset. Morbo nunc curatus sese ita quidem viribus exhaustum repperit, ut etiamsi cibos satis appeteret atque rite concoqueret, tamen non nisi lente admodum refici potuerit; quippe qui 14 dierum spatio prae imbecillitate nondum e cubiculo egredi sustinuerit, nec ante principium *Decembris* maiorem ponderis amissi partem recuperaverit; tunc temporis adhuc pallidâ atque fuscâ remanente facie. Itidem depulsa Febre in lumbis, artubusque superioribus, a praesertim inferioribus, mordaci adeo atque molesto cutis pruritu affectus est, ut illum saepe ferre non posset, quin quidem ad sanguinis profluvium usque cutim in cruribus scalpendo laceraret, etsi caeteroquin recte valeret; quod tamen symptoma circa *Decembris* initium valde minui coepit, atque deinceps penitus evanuit. Cum autem hic *Fratri* charissimi morbus insolitis adeo phaenomenis stipatus extiterit, rem forte curiosis non ingratam praestitero, si hic paucis tantum ea adjecero, quae in ejus constitutione et victu singularia fuerint, praesertim, quum horum nonnulla ad hunc fortasse morbum generandum concurrerint. Is itaque, cum juvenis Lugduni Batavorum studiis operam daret, atque illuc ex *Transsalsania* per *Sinum Maris australem* contenderet, ut nauseae atque aegritudinis ex motu navis ortae molestiam minueret, tota quidem nocte in aëre aperto, etsi coelo maxime nebuloso, commoratus, inde Asthma contraxit, cujus accessiones duarum triumve et quandoque sex septemve hebdomadarum spatio, atque ita incertis passim intervallis, recurrentes biduo vel triduo aegrotantem affligere solebant; ita quidem, ut sedens spiritum tardum, et gravem, ac cum ingenti saepe stertore conjunctum difficulter, admodum duceret, et nonnunquam phlegmata, declinante vero morbo crebriora, excerneret; in intermissionibus autem nulla omnino respirandi difficultate laboraret. Et gravis hic Morbus eum ultra viginti annos, immo ad mortem usque, comitatus est. Victus vero tum quidem ejusmodi fuit. Vix unquam Sale et paucis quoque Salsamentis, rarius Acidis utebatur. Vinum ne quidem gustabat; quippe quo exigua licet quantitate sumpto se aegrotare, et interdum Asthmatis accessione corripitur expertus fuerat; nullus etiam vel spirituum ardentium vel

cerevisiae usus. Solus ipsi potus infusio *Theae* vel *Coffe*, illa quidem rarius, haec vero quotidie, et tanta equidem copia, ut Pulveris Fabarum *Coffe* unciam ter singulis diebus, mane scilicet, post meridiem, et vesperti una vel altera post coenam hora, consumeret. Hac ipsa hujus anni aestate, uti sibi compertum retulit, *transpiratio* ipsi multo quam superioribus annis parcius extiterat, et phlegmata, quae in ipso postea morbo Sale destituta, tunc temporis solito saliosa fuerant. Hic autem morbus nullam omnino Asthmatis jam inveterato mutationem attulit, ast malum hoc deinceps illum quidem, ut ante, infestare perstitit. Biennio vero atque semestri spatio exinde elapso, quum *Vollenhove* tempore verno Febres ardentes ac contagiosae et quidem acutissimae vehementer grassarentur, atque ipse quamplurimos istiusmodi Febre correptos frequenter visitasset, in eundem morbum incidit, atque inde paucissimorum dierum spatio decessit.

OBSERVATIO II. (*Casus 24. Ao. 1702.*)

Filiolus Consulis Stenovicensis duodecimo circiter aetatis anno, quum tempore aestivo se cujuscunque generis pomis, ut *cerasis*, *prunis*, *malis*, *pyris* etc. avidius ingurgitasset, xi *Septembris* Tertiana correptus est; ast quatrinduo post rursum inde curatus, sumpto tantum unico *Pulvere Febrifugo* nobis usitato, atque ex aromatibus calidis parato. Tum vero, ut pueri solent, ad pristinum victum rediit, atque inde brevi in similem ast graviolem morbum recidit. Cum enim xxix *Septembr.* per aliquot horas in aëre ventoso incessisset, post meridiem domum reversus est, atque leviter aegrotare visus. Postridie vero ad meridiem in Febrim solitis intermittentis indiciis stipatam, et septima fere vespertina decedentem incidit. i *Octobr.* nova post meridiem accessio rediit, et posteriore quidem multo mitior, ita ut, etsi non decumberet, eam tamen haud difficulter toleraret. Postero vero die jam ante decimam matutinam languere, brachia extendere, oscitare, ac de nonnullo capitis dolore conqueri coepit; quamobrem, quum forte praesens haec praenuncia Febris jam imminentis indicia cernerem, Tertianam duplicem, et nunc graviolem illius accessionem veritus, con-

festim memorati *Pulveris febrifugi* dosin ei praebui; et paulo post rigor et frigus, etiamsi membris externe calentibus, cum pulsu contracto et accelerato succedere, atque ille accedente lumborum dolore adeo quidem aegrotare coepit, ut mox decumbere atque lectum petere coactus fuerit. **III Octobr.** circa decimam matutinam redeunte Febre itidem istius *Pulveris* aliquantulum datum: haec autem prioris Tertianae accessio, uti quidem haecenus, ita nunc quoque levis admodum extitit, et tribus tantum horis elapsis decessit. Postridie ejus diei gravior Tertianae posterioris accessio eadem hora recurrit, aſt non ante quartam pomeridianam deſiit. **v Octobr.**, quum ex hoc *Pulvere febrifugo* nullum haecenus fructum tulisset, atque ulteriorem illius usum aspernaretur, circa decimam matutinam *Salem Ammoniacum* ad ʒi in vino dissolutum hausit; et prioris Tertianae paroxysmus tunc temporis non rediit. Postero vero die, cum ad eandem horam Tertianae posterioris accessio reverteretur, confestim eandem *Salis Ammoniaci* dosin repetiit, et tunc hanc Febrim multo quam ante leviolem, ac hora tertia pomeridiana decedentem, expertus est. **vii Octobr.** nulla Febris, aſt aliqua tantum interna Corporis commotio adfuit, et postridie ejus diei posterioris Tertianae paroxysmus consueto quidem tempore recurrit, aſt novissima quoque Febre multo mitior tribus tantummodo horis perſiſtit. Quare, quum jam alterius Tertianae paroxysmi ceſſarent, alterius vero maximopere decreſcerent, fractae à Sale Ammoniaco viſae morbi vires, atque inde ſanitatís celerimè recuperandae ſpes aſfulſit. Aſt ſpem feſellit eventus. **ix** etenim **Octobr.**, quo die prior et mitior Tertiana, ſi perſiſtiſſet, ex priſtino ordine reverſa fuiſſet, aegrotantem inopinato gravior paroxysmus afflixiſt, ſive id ex victus errore, ſin vero aliunde acciderit; poſtero vero die nulla Febris rediit: aſt aliqua tantum Corporis interna perturbatio adfuit. **xi Octobr.** ita, ut ante biduum, gravior accessio recurrit, atque media ſecunda poſtmeridiana exorſa, ad mediam circiter octavam deſiit. Poſtridie vero ruſſum, ut ante, nullus quidem paroxysmus, aſt eadem interna Corporis commotio reverſa. Quamobrem, quum **xiii Octobr.** ipſo meridie graviorem acceſſionem ruſſus adventantem ad-

verteret, potionem ex *Sale Ammoniac* ad Div in aqua liquefacto confestim ebibit, tanta tamen cum aversatione, ut illius deinde partem rursus evomuerit. Paroxysmus interim, ut ante, 6 horas persistit. Postero iterum die ad quartam postmeridianam levis tantum, ut supra, Corporis commotio extitit. xv *Octobr.*, quum Febris pertinacioris taedio dati medicaminis effectum non opperirer, atque hora prima imminentis paroxysmi indicia cernerem, rursus *Pulveris febrifugi* supra memorati dosin aegrotanti praebui; ast superatâ jamdum a Sale Ammoniac morbi efficaciam non solum levior tunc Febris accessio reversa, tribus tantum horis affecit; sed et exinde Paer nullâ amplius Febre tentatus, omni tandem morbo penitus depulso, convaluit.

S E C T I O III.

Quae de *Quotidianis Sale Ammoniac curatis Observationes* IV. continet.

Art. I. *In quo Observationes II. de Quotidiana unâ tantummodo Salis Ammoniac dosi curata.*

OBSERVATIO I. (Casus 25. Ao. 1702.)

Puella, quae, cum xvi circiter annos haberet, fluxum menstruum nondum experta fuerat (etsi Soror ejus gemella corporis mole et forma simillima illud naturae tributum jam tum aliquoties solverat) atque pomorum avidissima huic appetitui hac ipsa aestate liberrime indulserat, v *Decembr.* in Febrem incidit, cujus paroxysmi cum frigore accedentes quotidie recurrunt; appetitu interea non tantum integro, sed et solito magis adaucto. xiii *Decembr.*, et porro deinceps paroxysmi quotidie non semel, ut ante, aegrotantem afficere, ast multiplicati bis terve et inordinate reverti coeperunt, attamen cum frigore semper adventare et cum sudore decedere. Ita nempe xix *Decembr.*, quo me tempore consuluit, noctu Febris cum frigore accesserat, et secuto deinde calore ac tandem erumpente sudore desierat; porro ante meridiem alter, et post meridiem tertius paroxysmus, uterque priori plane similis, recurrerat. Aegra vero de ejusmodi lumborum dolore, ac si corpus eo loci cingulo

quodam vehementer constrictum gereret, invadentibus paroxysmis, conqueritur; deinde vero illis progressis, capitis dolore praesertim affligitur. Appetitum, quem antea validiorem habuit; nunc solito remissiorem experitur; suo tamen alvus officio fungitur. Proxima nocte, redeunte paroxysmo, ex nostro praescripto *Salem Ammoniacum* ad \mathfrak{z} i in cerevisia dilutum hausit, atque inde citissime convaluit. Tam admirabilis enim ejus operatio extitit, ut vis integra morbi mox prorsus oppressa penitusque deleta fuerit, atque ita post hanc accessionem nulla omnino Febris deinde reverterit.

OBSERVATIO II. (Casus 26. Ao. 1702.)

Puerpera xi fere dierum, xii *Decembris* circa meridiem, Febre intermittente coepit affici, cujus paroxysmi cum frigore, tremore, maxillae inferioris concussione etc. accedentes indies statim 28 horarum circuitu recurrunt. Huic malo alterum, alvi nempe profluvium, accessit. Cum vero xv *Decembr.* quartus Febris paroxysmus hora 12^{ma} nocturna rediret, vicina quaedam mulier Pulverem ei febrifugum ex *Salis Ammoniaci* \mathfrak{z} i confectum, atque ante a me acceptum praebuit; cujus tantus quidem successus extitit, ut haec ipsa accessio multum levata, neque altera postea reversa fuerit. Exinde itidem altero atque tertio labente die, *Lacte* cum *Cinamomo* cocto, in quo candens omnino *Chalybs* extinctus erat, saepe sumpto Diarrhoeam compescuit: unde nunc laetam sanitatis propinquae spes magna tenuit. Verum, ut fluxa mortalium fortuna, deinde cuncta subito conversa. Cum etenim ei deinceps cerevisiam recentem et potum quendam ex melle paratum darent, in diarrhoeam subito recidit, atque graviter aegrotare coepit. Quare, quum appetitu prorsus abolito morbus indies ingrueretur, xxi *Decembr.* ad vesperam tandem, rebus jam desperatis, accersitus, repperi aegrotantem pulsu vehementer accelerato, et perquam debili, continua febre laborantem, et viribus exhaustam, ac de doloribus in toto quidem abdomine, quod et tumefactum retulit, praesertim vero in latere dextro, conquerentem: alvi excrementa, quae hodie diminuto jam profluvio semel tantum dejecerat, gravissime foetentia: urina rubescentis et flammei coloris: oculi (et jam a biduo, ut

ajebant) collapsi. Quibus rite perpenſis Aegram in extremo vitae discrimine verſari dixi, attamen, ut illi ſatisfacere, aliquod pro re nata remedium praefcripſi. Interea vero, cum hoc pararetur, cuncta continuo ac celeriter in pejus vergere, atque circa decimam veſpertina aegra deficere viſa; et quamvis paullo poſt rediret animus, pulſus tamen continuo decreſcens, lingua et faucēs aridae, vox jam dificiens, oculi rigentes, haud dubia dedere mortis hora prima nocturna ſubſequentis praefagia.

Art. II. *In quo Observationes II de Quotidiana duabus Salis Ammoniaci doſibus curata; quarum poſterior Febrim, quae prius unica fere doſi depulſa, ac deinde reverſa fuerat, exhibet.*

OBSERVATIO I. (Caſus 27. Ao. 1702.)

Adoleſcens annos duodeviginti natus et ſartoris opificium exercens, **II Octobris** hora octava matutina Febre corripitur, cujus adventus moleſto in genubus ſenſu, quibus communi ſartorum more quotidie inflexis ſedere ſolet, primo ſeſe prodidit; deinde frigore integram ferme horam infeſto, tum aeſtu, cephalalgia, et caeteris conſuetis hujus morbi malis, nullo tamen dorſi lumborumque dolore, ad veſperam uſque aegrotantem exercuit. **IV Octobr. 22** horarum circuitu, atque ita hora ſexta matutina, altera acceſſio priori plane ſimilis reverſa. **V Octobr.** pari quoque temporis intervallo, hora nempe quarta matutina, ſimilis omnino Febris tertio recurrit, at ad quintam pomeridianam iterum deceſſit. Alvus interea naturalis; appetitus vero uſque adeo abolitus, ut toto hoc triduo vix quidpiam comederit. **VI Octobr.**, quum ad horam quartam nocturnam anxietatem aliquam cum tremore conjunctam adverteret, Febrē adventantem ratus, de noſtro conſilio *Salis Ammoniaci* **3i** in cereviſia tepida diſſolutam hauſit; aſt paroxyſmus, perinde ac ſi hoc Medicamine repulſus atque dimotus foret, opperientem fruſtratus, haud ante octavam matutinam prodiit; et jamtum a celerrima Salis operatione retuſus non tantum levius aſſixit, ſed et plus quam duplo minore temporis ſpatio perſiſtit, atque jam ad primam pomeridia-

nam decessit. vii *Octobr.*, quum Febris aliquot rursus horis citius recurreret, eandem *Salis Ammoniaci* dosin repetiit, atque in levem et priori similem paroxysmum incidit. Ast viii *Octobr.* accessio multo quoque, quam ante, levior reversa; et postridie nulla quidem Febris, at quaedam tantum interna Corporis commotio accessit; atque ab eo tempore, Febre penitus depulsa, convaluit.

OBSERVATIO II. (*Casus 28. Ao. 1702.*)

Puella octavo et decimo vitae anno fluxum menstruum nondum experta, in Febrem intermittentem incidit. cujus accessiones indies hora duodecima recurrunt; nec ullo quidem symptomate infestius, quam lumborum crurumque dolore, aegrotantem affligunt. Hoc morbo per duas ferme septimanas implicata ii *Novembris* nostrâ sibi ope medicinam adhibendam petiit, atque semihora ante duodecimam praescriptum *Salem Ammoniacum* ad ℥iv in aqua dilutum sumere tentavit, ast prae medicaminum aversatione id non nisi difficulter admodum, et, ut postea mihi retulit, ex parte tantum haurire potuit: interea tamen paroxysmus mox inde, ut videbatur, dimotus non nisi media secunda Puellam corripuit. *Postridie* sub novae accessionis adventum eandem *Salis Ammoniaci* dosin repetiit, at simili, ut ante, fastidio illius rursus partem vomitu rejecit. Adeo, ut Aegra, etsi quidem haecenus bis *Salem* sumpserit, vix tamen dosis unius quantitatem rite retinuerit. Nihilominus morbus inde per aliquod tempus valde levare, imo fere cessare visus est. iv *Novembr.* etenim hora tertia pomeridiana Febris cum minore tremore ac multo levior rediit; et quamvis postridie quidem gravior reversa fuerit, deinceps tamen indies valde levata recurrit; donec xiii *ejusdem mensis*, quum alvi fluxus una cum ventris torminibus conjunctus accesserat, Febris vehementer decreverit, atque ita tandem penitus desierit. Quum vero tam exigua *Salis Ammoniaci* dosis huic morbo quidem opprimendo, non verum penitus eradicando suffecisset, is per aliquod tempus delituisse visus resurgere, atque cum gravi lumborum dolore indies recurrere coepit. Hinc xv *Decembr.* nostro consilio *Salis Ammoniaci* ℥iiss, Febre adveniente, sumpsit, eodem-

que tempore eandem *postridie* dosim repetiit. xvii *Decembr.* paroxysmus, ast multo, quam ante, levior rediit; et *postero die*, simili recurrente Febre *Salis Ammoniaci* rursus usum et quidem ad ℥iv iteravit: attamen xix *Decembr.*, etsi nulla accessio cum frigore, horrore, vel tremore redierit, se tamen fatis aegrotasse conquesta fuit. Quamobrem tardata fluxus menstrui eruptione febrim foveri ratus, ad illam promovendam, et hujus simul fomitem extirpandum postero die sequens Medicamen parari jussi.

℞ *Rad. Gentianae, Zedoariae, Distamni Cretici an. ℥iii.*
Lign. Colubrini ℥β.
Herb. Menthae, Artemisiae, Sabinae,
• Cardui benedicti an. Miβ.
Summ. Absinthii, Centaurii minoris an. P. ij.
Bacc. Juniperi ℥i. Cubebarum ℥ii.

Haec concisa et contusa, ut sumptibus parceretur, non in vino infusa, sed in cerevisia tenuiore decocta fuere, residuis iv *Colaturas libris*, de qua mane et vesperti ℥iii Aegrotanti offerendae. Verum jam tum a *Sale Ammoniac* adeo fractae fuere morbi vires, ut ab hoc ipso die Febris admodum indies decrescere coeperit, et xxviii *ejusdem mensis* Aegrotantem penitus dereliquerit.

C L A S S I S II.

QUA CONTINENTUR

OBSERVATIONES NONNULLAE

DE

TERTIANIS ET QUOTIDIANIS INTERMITTENTIBUS
SALE AMMONIACO,

*partim manifesto dosi et methodi defectu, vel victus errore,
partim fortasse, vel quod mediocri dosi non suffecerit, vel
quod virtute impar fuerit, neutiquam
curatis.*

S E C T I O I.

Quae de *Tertianis Simplicibus* et *Quotidianis Sale Ammoniaco*,
vel dosi vel methodi defectu, vel victus errore, nequa-
quam curatis, Observationes VI. continet.

Art. I. *In quo Observationes IV. de Tertianis Simplicibus
una Salis Ammoniaci dosi neutiquam depulsa.*

OBSERVATIO I. (Casus 29. Ao. 1703.)

Agricolae cujusdam Uxor ab aliquo tempore Tertiana laborans, iv Aprilis Salis Ammoniaci a nobis praescripti ʒiʒ adventante paroxysmo sumpsit, ast illius usum, ut quidem oportuerat, neutiquam repetiit. Interim Febris, ut postmodum intellexi, huic uni Salis dosi cedere renuit, sed spre- tis ejus viribus, adhuc prius, quam discesserit, menstruo cir- citer spatio perstitit.

OBSERVATIO II. (Casus 30. Ao. 1703.)

Mercator pene sexagenarius et in Tertianam implici- tus, a nobis consilium atque huic malo remedium petiit. Is tres jam Febris accessiones sustinuerat, quae primo eum fri- gore, deinde calore, et capitis lumborumque dolore, cae-

terisque consuetis huic morbo molestiis infestaverant, quarumque novissima *x1 Septembr.* post meridiem recurrens per 6 circiter horas aegrotantem afflixerat. Ex nostro igitur praecepto *xiii Sept.*, quamprimum paroxysmum imminentem advertit, *Salem Ammoniacum* ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{ss}$ in aqua dissolutum sumpsit; at nequaquam eo die diminuta, sed aggravata visa Febris. Quamobrem homo harum rerum rudis et ignarus protinus omnem successus spem abiecit, et proinde proxima accessione medicaminis usum neutiquam repetiit. Atque ita Febris, ut ante perseveravit, donec *xix Sept. Vini absinthitis* $\mathfrak{H}\mathfrak{ss}$, *Oleo Olivarum* ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ affuso, paulo ante Febris adventum hauserit, atque hujus Medicinæ ope ab hoc morbo liberatus extiterit.

Hoc tamen vulgi remedium tanti non est, ut cuiquam ejus usum commendandum putem. Adeo enim nauseosum est, ut ei fumendo et retinendo pauci pares reperiantur: et deinde in eo, qui ejus usum insequitur, paroxysmo gravissima passim aegritudo febricitantem afficit: et denique incertus admodum ejus eventus, quum id, etsi interdum Febrem abigat, saepe tamen, uti quidem comperi, successu careat.

OBSERVATIO III. (Casus 31. Ao. 1703.)

Opulenti cujusdam Mercatoris Uxor, annum aetatis agens quartum et trigésimum, *xiv Septembr.* ab urbe profecta, quum Filiolam, quam secum duxerat, vermibus laborantem repente motibus epilepticis afflictatam vidisset, inde vehementer exterrita atque percussa mox exigua navicula trium quatuorve horarum itinere, in aere aperto et tunc quidem frigidior domum contendit, atque ab eo tempore appetitum abolitum primum valetudinis labantis indicium animadvertit. *xix Septembr.* post meridiem interna atque horrida commotione per membra vagante corripitur, quae una cum horrore et frigore subinde conjuncta non in noctem solummodo, sed et in posterum omnino diem perstitit; ita tamen, ut quoties igni assideret, mox incalcesceret, pariterque sudore maderet; donec tunc temporis post meridiem tantum non egressa in aerem apertum, mox vehementi horrore atque tremore concuteretur: quamob-

rem celeriter ad focum reversa, ibidem intus frigans, extus calens, porro lumborum, omniumque fere membrorum, et paulo post capitis etiam dolore coepit affici, parumper interim accelerato pulsu, atque ita ex Febricula laborare, quae post horam unam alteramve in sudorem desit, atque una cum eo decessit. xxii. Sept. prope meridiem iterum interna atque horrida commotione corpus simili ratione pervagante, et cum frigore vehementi in lumborum regione coniuncta affligitur, eoque ipso tempore, quod animadversione dignissimum iudico, saporem usque adeo mutatum habuit, ut pruna dulcia, quae ei ante semihoram gustu pergrata apparuerant, nunc ferme insipida, immo et ingrata viderentur. Quum vero haec Febris invadentis indicia sentiret, confestim id, quod ei praescripseram, *Sal Ammoniacum* ad ℥iv haussit, et mox deinde aestu, lumborum dolore, caeterisque Febris incommodis laborare coepit: paroxysmus tamen neutiquam gravis extitit. xxiv. Sept. media decima matutina, dira atque terribili facie Febris cum acri frigore, horrore, tremore, dentium crepitu, oris et corporis totius concussione, nec faciei tantum, sed et labiorum tetro pallore, pulsu interim accelerato, at valde contracto et quasi sepulto, repente adeo nec opinato invasit, ut Aegra *Sal Ammoniacum*, tunc prius in tepida liquandum, haud tempestive sumere potuerit: quo tamen, ut potuit, hausto, mox inde calorem in ventriculo productum, et hinc prognatas frigoris et horroris inducias sensit: etsi haec symptomata deinde maiore cum vehementia reversa ad mediam usque duodecimam persistierint; cum interea semihora ante, quam frigus desineret, Aegra gravi anxietate et nausea oborta, rursus *Sal Ammoniacum*, et Potum *Coffe* una cum eo suptum vomitu reddiderit: porro aestu caeterisque malis Febris afflixit, et ad octavam vespertinam desit. xxvi. Sept., quum totam noctem capitis et lumborum dolore vexata fuisset, mane hora media octava longe quidem gravissima febris aegrotantem corripuit; nam membris externe quoque frigentibus algor, horror, dentium crepitus, oris et corporis tremor ac concussio illam multo etiam, quam ante, vehementius affligerunt: itidem in ipso frigoris initio capitis lumborumque dolor admodum

exacerbatus extitit, qui antea non nisi cum aestu accedere consueverat. Post semihoram, etsi de frigore conqueri persisteret, cutis externe calefcere coepit; et Potum *Coffe* eo tempore haustum paulo post iterum vomitu rejecit: tum vero sensim superiores corporis partes, deinde inferiores, et ultimo pedes, hora circiter ab initio paroxysmi elapsa, incallescere sensit; et pulsus continuo magis magisque accelerari atque sese expandere orsus; inde brevi tam acer evasit aestus, ut vix quispiam manus contactum sine molestia tolerare posset: gravissimus interea capitis lumborumque dolor, et continuum ferme delirium: hora vero decima magis quiescere atque aestus mitescere coepit: paulo post meridiem sudor erupit, ac denique ad septimam vespertinam una cum Febre desit. Tum quidem et Febris violentia territus, ac propterea nihil ultra differendum ratus, et ne *Sal Ammoniacum* vomitu iterum exturbaretur, veritus, mox ei *Corticis Peruviani* \mathfrak{z} i in 8 *Pulveres* divisam per intervalla praebere jussi; a cujus usu in diarrhoeam incidit, et 6 Pulveribus consumptis, xxviii *Septembr.* (quum nocte praegressa fluxus ei menstruus erupisset) nullam quidem Febrim recurrentem advertit, ast caput toto solummodo die gravatum habuit; et porro feliciter praescripti medicaminis reliquiis usa convaluit.

OBSERVATIO IV. (*Casus 32. Ao. 1702.*)

Mulier ad triginta circiter annos nata, cui ante aliquot menses foetum enixae tunc temporis lochiorum et postea mensium fluxus exigua admodum copia prodierat, ex Tertianae laborare coepit; cujus quatuor accessiones perpessa me consuluit, at inde xiiii *Februarii*, cum quintum paroxysmum recurrentem adverteret, *Salem Ammoniacum* ad \mathfrak{z} iß in aqua liquefactum hausit. Nihilominus xv *Febr.* ejusdem Medicaminis iterandi oblita in paroxysmum vehementem incidit, atque inde nostri *Salis* viribus diffusa mox aliud a me remedium petiit. Tum vero praescriptis vi *Chinae Chinae drachmis* mox hinc prostrata penitusque depulsa Febris discessit.

Art. II. *In quo unica Observatio de Tertiana Simplici, a Sale Ammoniaco, methodi defectu, nonnisi post adjunctum Vini Medicati usum depulsa.*

OBSERVATIO I. (Casus 33. Ao. 1703.)

Filius Mercatoris xxiv *Aprilis*, quum octo circiter annos complevisset, male se habere coepit, ita quidem, ut prae aegritudine decumbere cogeretur. Postridie vero recte rursus valuit. xxvi *Aprilis* ad meridiem recurrens aegritudo sese manifestam Tertianae sobolem prodidit, quippe quae cum frigore et rigore invaserit, et deinde aestu caeterisque molestiis hunc morbum comitari solitis aegrotantem affligerit. xxviii *Aprilis*, Aeger paulo ante Febris accessum *Sal Ammoniacum* ad ℥i in aqua liquefactum et sibi oblatum ex parte sumpsit, reliquum respuit; atque tum Febrim sat gravem sustinuit. Sed xxx *Aprilis* statim paroxysmi tempore nullam quidem Febrim, aut aliquem solummodo torporem ac somnolentiam sensit. Verumenimvero ab hujus medicaminis dosi tam imperfecta, nec, ut oportuerat, iterata, dimota solum, non vero depulsa visa Febris; siquidem postridie, i nempe *Maji*, turbato jam recurrendi ordine, consueta tamen hora, duodecima scilicet, pergravis redierit, atque reditus sui tarditatem majore rursus violentia compensaverit, ita quidem, ut Aeger jam incipiente frigore delirare coeperit: mature tamen, vespere scilicet ingratus hic et perodiosus decessit hospes. iiii *Maji* quum pristina paroxysmus hora reverteret, sine mora *Sal Ammoniacum* ad ℥iiβ ab Aegrotante rite fuit sumptum: inde elapso horae quadrante horrores et tremores desierunt, et mitis porro Febris extitit. v vero *Maji*, denuo neglecto *Salis* usu, vehemens iterum accessio recurrit. vii *Maji* paulo ante meridiem oblatam rursus eandem *Salis Ammoniaci* dosin in potione dissolutam averfatus aeger illius tantum pauxillum hausit: attamen vix ulla vel saltem non nisi levissima Febris secuta, ac Puer eo tempore non aegrotare sed tantum somnolentia affici visus. ix *Maji*, etsi priore paulo gravior, levis tamen paroxysmus accessit. Neque mirum profecto, quod haecenus Febris *Salis Ammoniaci* virtute non fuerit depulsa: primae etenim et vix dimidia dosis effectus fuit

jam ante penitus extinctus, quam quidem ei altera successe-
rit; nec huic aliquod in tantula et prorsus contemnenda
Salis quantitate non nisi quatrduo post usurpata subsidium
esse potuit; adeo ut unica illa dosis suam in morbo tantope-
re levando virtutem satis equidem prodiderit, etsi illi peni-
tus extirpando neutiquam suffecerit. Octiduo ergo ab il-
lius usu elapso, xi nempe *Maji*, Febris relictis non tantum
viribus sed et adauctis atrox rursus et vehemens in scenam
rediit, immo et exinde duplicata quotidie recurrit: aegro-
tanti quoque appetitum sustulit, eumque nonnunquam nau-
seae et vomitus molestiis afflixit. Quare tandem xiii *Maji*
de ejusmodi Vini Medicato, ac in *Casu* 21 praescriptum
fuerat, post meridiem horae circiter spatio ante Febris ac-
cessum ℥iij usurpare coepit, quod tamen post semihoram
ex parte rursus vomitu rejecit: nulla interim Febris, at
sola eo tempore somnolentia secuta. Vespere ergo rursus
 $\text{℥j}\beta$, et postridie mane ℥iij Vini Medicati sumpsit, atque
inde multo quam pridie vegetior extitit. Porro et hoc ipso
die et biduo inde secuto pari Vini copia iisdem rursus Her-
bis affusa per intervalla et quidem ter quaterve de die fuit
usus, Febre interim immunis, ac jam sanitatem recuperasse
visus; in qua et probabiliter perseverasset, nisi victus errore
recentem nec satis confirmatam valetudinem turbasset.
Cum enim xxvi *Maji* de capite *Porcino* comedisset, vespere
vehemens rursus paroxysmus recurrit; pariterque xxviii
Maji rediit, tum vero discessit, ac deinceps Pueri valetudi-
nem infestare desiit.

Art. III. *In quo unica Observatio de Quotidiana ex Tertiana
prognata, a Sale Ammoniaco ob graves, ut videtur, in
victu errores nequaquam curata.*

OBSERVATIO I. (*Casus* 34. Ao. 1703.)

Famulus Affinis mei, Bataviae ex Parentibus Indis ge-
nitus, et viginti ferme annos natus, xviii *Maji* in Febrim
intermittentem incidit, quae porro ix, nec non xxii *ejus-*
dem mensis die, atque ita bidui circuitu rediit, tum vero tri-
dui interposita mora non nisi xxv *Maji* revertit. In hujus
autem accessionis initio *Salem Ammoniacum* ad ℥iv gr. v hau-

fit, ac postridie recurrente paroxysmo ejusdem *Salis* usum et quidem ʒij pondere repetiit. Nihilominus Febris inde non depulsa indies aegrum accedere perstitit. Ergo ei *Salis Ammoniaci* ad $\text{ʒi}\beta$ praescripti usum iterandum injunxi: illudque Aeger xxxi *Maji*, quum noctu paroxysmus invaderet, a se quidem praestitum, deinde tamen se adhuc per aliquod temporis spatium Febre vexatum retulit. Ast ejus Dominus, cui fraudulentum et vaferimum ignavi juvenis ingenium perspectum, vehementer dubitavit, et an quidem, ut prae se fert, ultimam Medicaminis dosin sumpserit, et an jam a morbo relictus se non diutius febricitare simulaverit, ut sic vitam magis desidem atque otiosam agere liceret; id saltem sibi compertum memoravit, Aegrum ab eo quidem tempore, quo Sale Ammoniaco uti coepit, maxime inordinatam victus rationem habuisse, eumque singulis paroxysmis se ingenti frigidae et cerevisiae copia ingurgitare consuevisse. Non itaque mirum, si tantis in victu erroribus *Salis Ammoniaci* successus extiterit irritus.

S E C T I O II.

Quae de *Tertianis* tam *Simplicibus*, quam *Multiplicibus* et *Inordinatis*, Sale Ammoniaco, sive quod mediocri dosi non suffecerit, sive quod virtute impar extiterit, neutiquam curatis, Observationes IV continet.

Art. I. In quo Observationes III. de *Tertiana Simplici* duabus *Salis Ammoniaci* dosibus neutiquam depulsa.

OBSERVATIO I. (Casus 35. Ao. 1703.)

Centurio annum agens septimum atque trigesium, xvi *Febr.* in Holsatia Febre ardente corripitur; ex qua fractis omnino viribus, non nisi cum summo vitae periculo evasit. Hinc quum vix in publicum prodiret, in *Tertianam* incidit; a qua curatus navi in Hollandiam tendit, atque in itinere, vegeto magis appetitu, cibis durioribus avidius usus, quum alii haberi non poterant, in *Tertianam* recidit. Ab hac ope *Corticis Peruviani* a Medico in Transilvania praescripti iterum curatur, etsi depulsa Febre haud quidem perfecte convalescit, sed artuum dolores cum infestare persti-

terint. Donec x vel xii dierum intervallo idem morbus tertio recurreret, et quidem adeo vehemens, ut ejus paroxysmi non nisi 17 horarum circuitu finirentur. xxx *Maji*, quum tertia accessione laboraret, valetudinis suae curam nostro consilio commisit. Simile ergo *Vinum Medicatum*, ac in *Casu* 21, at majore copia praescriptum, de quo extra paroxysmum ℥ij ter quotidie ab Aegrotante bibendae. Et porro 1 *Junii*, quum stata hora, quarta nempe matutina, Febris recurreret, semihora ante ejus adventum potio ex *Sale Ammoniac*o ad ℥i℥ in aqua liquefacto ab Aegro sumpta; nec successu carere visa, siquidem hic paroxysmus multo, quam ante, mitior extiterit. 111 *Junii*, quum Aegrotantis absentia Salis usus iterari non posset, hora consueta Febris revertit priore gravior, et cum infesto capitis, lumborum, scapularum, omniumque artuum dolore ad nonam usque matutinam affligens. iv *Junii* paroxysmus multo brevior, quam antea, intervallo, ad mediam nonam vespertinam inopinato recurrit; unde *Hausus* ex *Salis Ammoniaci* ℥i , aliisque Salibus Febrifugis, et Medicamentis Sudoriferis compositus, quem horae spatium ante Febris reditum Aegro offerendum praeceperam, non nisi in ipso accessio- nis initio sumi potuit. Haec autem Febris primo unguum livore, atque notabili in digitorum extremitatibus stupore, tum gravi horrore ac tremore, nec non acri frigore aegrotantem concussit; qui stragulis copiosissimis tectus, cum frigus et caetera mala modo memorata desinerent, copiose atque diu sudavit; at paroxysmum nihilominus sat gravem sustinuit. vi *Junii* ad meridiem pergravis accessio rediit; in cujus equidem initio tam vehemens tremor extitit, ut prae validiore maxillae inferioris concussione dentes ex mutuae collisionis impetu dolerent. viii *Junii* ad meridiem paroxysmus, ante cujus adventum jam *Corticis Chinae Chinae* ℥℥ sumpserat, pergravis, ut ante, reversus: quo finito dimidia ejusdem *Corticis uncia* per intervalla data. x *Junii* Aeger primo ante meridiem lumborum omniumque artuum dolore afflictus est, tum vero tempore consueto ipsa Febre, at multo nunc levior, correptus. Deinde, cum haec decesserat, tres rursus *Corticis drachmae* ab aegrotante sumptae: nihilominus xii *Junii* paroxysmus, etsi levissi-

mus, rediit. Inde adhuc *duae* ejusdem Medicaminis *drachmae* usurpatae, et tum demum pertinax haec Febris Aegrotantem reliquit. Haud itaque mirum est, hanc, ut caeterae quidem Tertianae solent, duabus Salis Ammoniaci dosibus non fuisse depulsam, quum fere duplo majore Corticis dosi, quam quae aliis abigendis sufficit, eguerit; ut taceam Salis Ammoniaci doses hic non continuis, ut quidem oportuerat, paroxysmis, sed quatruiduo demum interjecto, adhibitas fuisse. Porro ad recidivam praecavendam Aegro nunc curato praecepi, ut octiduo elapso *Corticis Peruviani* $\text{℥}\beta$ quadripartita unius alteriusve diei spatio utatur, atque ejusdem medicaminis usum pari intervallo ter quaterve repetat. Verumenimvero, ut postea intellexi, quum, nondum inchoato hoc *Corticis* usu, *xix Junii* ex Transsalaria in Flandriam contendens, et ob militis cujusdam fugam ira percitus, cum navicula latum propter Genemudam fluvium trajiceret, mox rursus in febrilem paroxysmum recidit, nondum valetudinis mire vacillantis finem assecutus.

OBSERVATIO II. (*Casus* 36. Ao. 1703.)

Nobilissimus quidam Adolefcens, staturae admodum procerae, sexto et decimo aetatis anno et *Augusti* *xiv* me de valetudine sua consulit, se jam a 14 diebus in Tertianam implicitum referens, cujus paroxysmi, nullo quidem capitis lumborumque dolore molesti, cum frigore ad semihoram fere persistente, subinde citius subinde tardius recurrunt, et cum sudore desinunt: nunc vero Tertianam vel duplicatam vel in Quotidianam conversam videri: Febrem etenim, cum ante biduum ad sextam vespertinam accessisset, heri vespere ad undecimam rediisse: praeterea, absente perinde ac praesente Febre, sese vertigine affici, et tum maxime, cum decumbens consurgere conatur: appetitu vero se hactenus vigere. Huic itaque *Salem Ammoniacum* ad $\text{℥iv}\beta$ in aqua liquefactum sub ipsum paroxysmi initium sumendum, atque idem medicamen proxima accessione recurrente iterandum praecepi, et praeterea ejusmodi *Vinum Medicatum*, ac in *Casu* praecedente, atque simili ratione usurpandum praescripsi. *xxi Augusti* Aegroti Nobiliss. Mater me per literas certiore fecit, sumpto ratione memorata, *Ammo-*

niaco Sale, Febrim tamen neutiquam fuisse depulsam, ast duos deinde paroxysmos et quidem tribus quatuorve horis citius, quam antea, accedentes haecenus recurrisse, atque in horum posteriore Aegrotantem frigore finito in vomitum et quidem iteratum incidisse. Quamobrem ei *Corticis Peruviani* \mathfrak{z} i. in octo pulveres divisam misi; quibus consumptis Febris discessit, sed, quamvis appetitus plus solito vigeret, corporis tamen imbecillitas remansit. Hinc Aeger post octiduum eandem *Corticis* dosin repetiit, atque ita penitus convaluit.

OBSERVATIO III. (*Casus 37. Ao. 1703.*)

I *Octobris* Tribunus militum mecum cognitione conjunctus petiit, ut ipsius Famulo ex Tertiana laboranti succurrerem. Is jam aetate provectior ante 5 septimanas hunc morbum in castris contraxerat, cujus paroxysmi cum frigore diuturno per unam alteramve horam persistente recurrunt. Ei ergo Salem Ammoniacum ad $\mathfrak{z}\beta$ in aqua dilutum revertente Febre sumendum, atque idem Medicamen altera deinde accessione redeunte iterandum praecepi. Is autem, sive quod in victu erraverit, ut rudes istiusmodi homines facili solent, sive quod mediocris haec dosis non suffecerit, me saltem octiduo elapso certiore fecit, se, etsi Medicamine praescripto rite fuerit usus, Febre tamen haecenus, ut ante, recurrenre teneri. Tum vero praescripto *Peruviani Corticis* usu morbus aegrotantem reliquit; et cum octiduo elapso revertisset, eodem iterum Medicamine, una cum Herbarum Febrifugarum Decocto in cerevisia facto, Febris prostrata, penitusque depulsa discessit.

Art. II. *In quo unica Observatio de Tertiana in multiplicem et inordinatam conversa duabus Salis Ammoniaci dosibus neutiquam depulsa.*

OBSERVATIO I. (*Casus 38. Ao. 1703.*)

Puellae octavum circiter aetatis annum gerenti, et jam a 14 diebus Febri intermittente correptae, quae primo alternis, deinde vero singulis diebus et quidem ter quaterve inordinate revertit, VII *Martii* Salem Ammoniacum ad \mathfrak{z} i

in aqua liquatum adventante Febre sumendum, atque eandem illius dosin postridie redeunte paroxysmo repetendam praescripsi. Verum enim vero successu caruit, atque opinionem fefellit Medicaminis eventus. Febris enim, ut Mater mihi retulit, sumpto Sali nequaquam cessit, nec indies exinde, etsi cum minore, quam antea, siti, recurrere desit.

A P P E N D I X

qua continetur

Unica de Tertianâ Observatio, in qua dubius aliquantulum extitit Salis Ammoniaci effectus.

OBSERVATIO (Casus 39. Ao. 1703.)

Mercator macilentus jam fere quinquagenarius in Tertianam incidit, ac hujus septima accessione xvi *Julii* redeunte *Salem Ammoniacum* ad $\mathfrak{z}\beta$ in aqua liquefactum confestim hausit. Nec remedium effectui carere visum, siquidem ejus usum levior quam antea febris subsecuta fuerit. xviii *Julii* eandem *Salis Ammoniaci* dosin iteravit, at sequentem rursum paroxysmum pergravem habuit. xx *Julii* omnibus praegressis gravior accessio revertit. Deinde vero quaque vice Febris, horis aliquot tardius recurrere, atque ita gradatim decrescere ac mitescere coepit, ut brevi non tantum Aeger, etsi non decumberet, eam facile sustineret, sed et ipse morbus haud diu post extinctus penitus desierit.

Tabula exhibens effectus Salis Ammoniaci, seu mutationes illius usum in Febris Inter-
mittentibus inde curatis subsecutas.

De hujus vero Tabulae usu monendum, primo, quod * Salis Ammoniaci dosin ab Aegrotante
sumptam designat, et deinde, quod o absentiam paroxysmi denotat.

IN TERTIANIS SIMPLICIBUS

Paroxysmi post primam Salis Ammoniaci dosin ab Aegrotante sumptam secuti se, ut hic refertur, habuere.

Paroxysmi	Primus.	Dies in- termedius.	Secundus.	Dies in- termedius.	Tertius.	Dies in- termedius.	Quartus.	Dies in- termedius.	Quintus.
in Casu 3	* levissimus et tan- tum ½ horae.		o		o		o		o
5	* multo levior.		o		o		o		o
6	* multo levior.		o		o		o		o
7	* levior et cum mi- nore cephalalgia.		o levis capitis dolor.		o		o		o
1	* ut ante.		o		o		o		o
4	* ut ante.		o		o		o		o
8	* ut ante.		o		o		o		o
2	* frigus brevius, ca- lor et sitis major.		o aliquod caloris in- crementum.		o		o		o
11	* frigus vix ullum, caetera ut ante.		o levis alteratio.		o		o		o
14	* valde gravis.		* aliquis capitis dolor.		o		o		o
15	* multo gravior, quam ante.		* o		o		o		o
9	* multo levior.		* levis accessio.		o		o		o
10	* levis accessio.		* adhuc multo levior.		o		o		o
11	* gravis ut ante.		* gravis.		o		o		o
13	* multo gravior, quam ante.		* gravis, ast priore multo mitior bre- viorque.		o levis horror per ½ horae.		o		o
16	* levior, quam ante.		* adhuc levior prio- re, et 3 tantum horarum.		o adhuc levior priore et tantum 1½ ho- rae.		o aliquis capitis dolor.		o
21	* cum gravi prae- cordiorum anxie- tate.		sine frigore, cum sola siti et anxie- tate.		o levior cum anxietate minore, at cum fri- gore sine horrore.		o		o
18	* ut ante.		levior.		o vel levis solum commotio.		o		o
19	* ut ante.		multo levior.		o levissimus.		o levissimus.		o
20	* brevior, quam ante.	ut ante.	o	* ut ante.	o	levis acces- sio.	levis accessio.	levis acces- sio.	o

IN QUOTIDIANIS

Paroxysmi post primam Salis Ammoniaci dosin ab Aegrotante sumptam secuti se, ut hic refertur,
habuere.

Paroxysmi	Primus.	Secundus.	Tertius.	Quartus.	Quintus.	Sextus.
in Casu 20	* multo levior.	o	o	o	o	o
25	* ut ante.	o	o	o	o	o
27	* levior et plus quam du- plo brevior et 3 horis tardius invadens.	* priori similis.	multo levior.	o aliqua tantum alteratio.	o	o
	* post dimidiam dosin, 1½ hora tardius inva- dens.	* a pars Salis mox vo- mitu rejecta. Febris ut ante.	multo levior.	rursus gravior.	o et porro decrevit ac desit, ast postmo- dum rediit, ut linea sequens indicat.	
28	* ut ante.	* ut ante.	multo levior.	* ut praecedens.	sine frigore, horrore vel tremore, ast paulo gra- vior.	o et porro indies decrevit, atque ita discessit.

IN TERTIANIS DUPLICIBUS

Paroxysmi post primam Salis Ammoniaci dosin ab Aegrotante sumptam secuti se, ut hic refertur, habuere.
Ubi advertendum, quod hic A unam et B alteram Tertianam denotat.

oxyfmi

A Primus. B Primus. A Secundus. B Secundus. A Tertius. B Tertius. A Quartus. B Quartus. A Quintus. B Quintus.

Casu 23

*duplo levior.	minus gravis.	o	multo levior.	o	levissimus.	o	o	o	o
----------------	---------------	---	---------------	---	-------------	---	---	---	---

24

* multo levior.	o aliqua alteratio.	o adhuc multo levior et 3 tantum horarum.	o gravior accessio.	o aliqua alteratio.	o gravis ut ante.	o aliqua alteratio.	* ut antea.	o aliqua alteratio
								Vide porro f

A Sextus. B Sextus. A Septimus. B Septimus.

†

multo levior et 3 tantum horarum.	o	o	o	etc.
-----------------------------------	---	---	---	------



V.

CAROL. P. THUNBERG

MED. DR. ET PROF. ORD. UPSAL etc.

DISSERTATIO

DE

MEDICINA AFRICANORUM.

U P S A L I A E,

1 7 8 5.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1900

1

1

1231 B (1) 15. 10. 1900

1900

DISSERTATIO MEDICA

DE

MEDICINA AFRICANORUM.

Multa remedia antiquitus in Pharmacopolia nostra introducta et veteribus multum saepe decantata jam dudum evi-
luerunt et oblivioni tradita sunt. Multa quoque alia medi-
camina, quae proxime elapsis seculis primum innotuerunt,
jam in officinas Pharmaceuticas illata quotidie a Practicis
cum fructu praescribuntur illis, qui atrocibus exeruciantur
morbis. Horum quidem numerum, qui certe exiguus non
est, sufficere facile crederes, H. L. ad omnes tollendos hu-
mani generis cruciatus; sed cum omnibus gentibus non
aeque opportuna sese offerat occasio, haec sibi acquirendi
medicamenta, necesse fuit, ut variae Nationes aliis uteren-
tur medelis, ad quas facilius illis, vel earum in patria, vel
in confiniis, aditus patet. Sic utuntur Ceilonenses *Ligno*
suo *colubrino*, radice *Lopes* Mallabari, *Periploca indica* ad
vomitus excitandum et *Plumbagine ceilanica* Vesicatorii loco
Cingalli, *Senega* et *Lobelia siphilitica* Americani, radice *Ninfi*
Sineneses et Japonenses, atque aliis alii.

Variae etiam in usu sunt tam apud Indianos quam
Africanos remedium species, quae adhuc ad cognitionem
Europaeorum non pervenerunt, quales non paucas sub tuis
itineribus in nuper dictis regionibus observavit Celeber. Do-
minus Praeses. Ex hisce remediis ea, quae Africae austra-
lis Incolae imprimis in usus suos convertunt, eligere mihi
contigit; illa igitur succincte descripta specimine medico
inaugurali publici juris facere constitui, ea tamen spe, ut
Tibi, B. L. conamina mea non fore displicitura.

1. *GERANIUM cucullatum* Linn. Syst. veg. Edit. XIV. p. 613.

Crescit locis montosis prope et extra Cap, in promontorio bonae spei.

Malvae plerumque herbam, ob vires cum Malva convenientes, Incolae appellant.

Herba, imprimis *folia*, parum odora et emollientia sunt atque in sacculis emollientibus ad resolvendum et emolliendum adhibentur.

2. *GERANIUM triste* Linn. Syst. veget. Edit. XIV. p. 615.

Crescit in collibus et campis sabulosis inter Cap et Drakenstein in Prom. bon. spei.

Radix hujus rubra adstringens est et ficcata inque pulverem redacta saepius illis praescribitur, qui Diarrhoea et Dysenteria laborant. Leviter adstringit et cum fructu adhibetur, post Laxans ad evacuandam saburram et acrimoniam datum.

3. *BRYONIA africana* Linn. Syst. veg. p. 870.

Crescit in collibus montium prope Cap et alibi.

Dauids wortel dicitur ab Europaeis Incolis.

Radix porosa valde nauseosa gustanti obvenit et imprimis a Belgis in usum vocatur, in Lue venera et morbis exanthematicis.

Decoctum diureticum, quandoque catharticum et emeticum.

4. *HAEMANTHUS coccineus* Linn. Syst. veg. XIV. p. 316.

Crescit ubique in dunis Capensibus vulgarissimus.

Bulbus in Promontorio b. spei *Scilla montana* appellatus, albus, fibrosus et satis magnus locis altis ficcioribus occurrit.

Acris et viscidus vim exferit incidentem et diureticam instar Scillae maritimae, ideoque ex illo acetum et oxymel scilliticum paratum in Asthmate et Hydrope aliisque morbis propinatur.

5. *ASCLEPIAS undulata* Linn. Syst. veg. XIV. p. 258.

Crescit in collibus prope Paradys, in Camenasie et alibi in Africes angulo maxime australi.

Bitter wortel radicem amaram et acrem nominare solent Hollandi, atque ob vim ejus diureticam ut plurimum decoctum Hydropicis bibendum commendant; Eundem in finem laude etiam extollitur *Asclepiadis crispae* radix.

6. RESOLVENTIA multa Africa profert; excellunt vero herbae sequentes, ut *Ocymi* species; *Selago corymbosa*, quae tota svaveolens; *Lantana africana*, *crispa* et *salvifolia*; *Salvia aurea*, *africana*, *paniculata*; *Geranium ciliatum* et *moschatum*; *Tanaceta* nonnulla; *Osteospermum spinosum* atque *Menthæ* variae fragrantissimae et Camphorae odore praeditae.

7. GRAVEOLENTIA varia, et illa quidem repellentia exhibet Africa australis medicamina, ut *Melanthus major*, *Eriocephalus* seu *wilde Rosmarin* dictus, foliis odore Tanaceti; *Diosma betulina*, *uniflora* et *pulchella*, quae Hottentottis *Bukku* dicitur.

Folia horum inter lapides in pulverem redigunt Hottentotti eoque corpus pinguedine ovina prius inunctum adspargunt, unde odor eorum fortis et non aduentis ingratus.

8. ARCTOPUS *echinatus* Linn. Syst. veget. XIV. p. 920. Crescit in collibus prope Cap vulgatissimus, infra latus orientale montium tabularis et Diaboli.

Sapore radix ingrata decocto mundificante saepe adhibetur, imprimis in Gonorrhoea.

9. LOBELIA *pinifolia* Linn. Syst. veget. XIV. p. 800.

Crescit in montium lateribus prope Cap et alibi vulgaris.

Radix resinosa sanguinem mundificandi vi pollet, rarius tamen usurpatur.

10. RICINUS *communis* Linn. Syst. veget. XIV. p. 865. in omni fere villa extra Cap cultus.

Seminibus vi draastica dotatis raro hic loci, fortiter purgandi caussa, utuntur Incolae, oleum vero ex illis expressum et leniter alvum ducens inter optima remedia domestica numeratur, et saepe parvis, sed iteratis dosibus, sumitur.

11. *ADIANTHUM aethiopicum* Linn. Syst. veget. p. 940.

Vrouw Haar dictum, vulgatissimum crescit in montium lateribus et fossis circum urbem Cap.

In fossis montium satis communis filix cum *Adiantho capillo veneris* qualitate, viribus et usu omnino convenit, nec non in tussi, raucedine et aliis morbis pectoris, sub forma decocti et syrapi propinatur.

12. *ERIOCEPHALUS* sub *Gnaphalii herbae* titulo apud Belgas in usu est herba diuretica, in Hydropis variis speciebus laudata.

13. *MESEMBRYANTHEMA* varia succulenta falsum praebent succum, quem usu diaetetico ad sitim restringendam Hottentotti ori admovent; Incolae vero ex Europaea gente ad leviter adstringendum in Aphtis et externe in Combustionibus usurpare solent. Succus vero fructuum *Mesembr. edulis* interne in Dysenteria propinatur.

14. *POLYGONUM barbatum* Linn. Syst. veg. XIV. p. 377.

Crescit prope Cap et alibi in omnibus fossis.

Herba juxta fossas in aquis crescens, acris, ad oedemata pedum quandoque tollenda adhibetur.

15. *LYCOPERDON carcinomale* Linn. Syst. veg. XIV. p. 981.

Crescit fungus hic oblongus in acervis argillaceis formicarium, in promontorio bonae spei.

Pulvis ater ad curanda ulcera cancrosa commendatur.

16. *OSMITES camphorina* Linn. Syst. veg. XIV. p. 783.

Crescit juxta rivos infra montes prope Drakenstein et infra latus orientale montis tabularis.

Bellis herba et folia appellatur ab Incolis haec planta siveolens.

Vis incidens, nervina et fortiter resolvens; spiritus ejus, *Spiritus Bellidis* vocatus, eam ob causam summo pere commendatur in tussi, raucedine, et morbis pectoris aliis, licet nimis calidus Nobis obveniat.

17. *PROTEA mellifera et speciosa* Linn. Syft. v. p. 139 et 141.

Succus in capitulis florum copiose collectus, ab insectis filtratione purificatus, et leni igne inspissatus usum mellis praestat in morbis pectoris, raucedine, tussi, ceteris.

18. *PROTEA grandiflora* Linn. Syft. veg. XIV. p. 141.

Cortex arboris adstringens ad sistendas diarrhoeas utilis judicatur.

19. *OXALIS cernua* Linn. Syft. veg. XIV. p. 433.

Copiose crescit locis cultis haec herba in Cap. b. spei, et ex succu *Acetosellae sal* conficiunt Pharmacopoei.

20. *CROTALARIA perfoliata* Linn. Syft. veg. XIV. p. 649.

Crescit in interioribus Cap. b. spei regionibus.

Foliorum decoctum fortiter diuresin promovere creditur et cum successu contra Hydropes praescribi dicitur.

21. *TESTUDINUM sanguinem* siccatum magni faciunt rustici Africani in morsura serpentum et aliis venenatis vulneribus; Sanguinem itaque inspissatum in theca servant secumque plurimi semper circumferunt.

22. *FAGARA capensis*, arbuscula in sylvis interiorum regionum capitis bonae spei crescens.

Hanc sub nomine *wilde Cardamom* seu Cardamomi sylvestris Incolae norunt et baccas aromaticas aliquatenus ingrati saporis, in Colica, flatulenta et Paralyfi adhibere sciunt.

23. *ADONIS vesicatoria* Linn. Syft. veg. XIV. p. 515.

Africanis: *Brandblad* ob vim urentem.

Crescit in montibus prope Cap, juxta Constantiam, trans Svellendam, alibi.

Acerrimae et rubefacientis plantae folia in Rheumatismo, Ischiade et variis aliis a frigoris et caloris vicissitudinibus ortis morbis, vesicatorii instar, contusa et externe imposita quotidie fere corporis artubus adplicantur.

24. *ALOË linguaeformis* Linn. Syft. veg. XIV. p. 337. optimam et purissimam ex omnibus Aloës speciebus

gummi-resinam stillat, qua in interioribus Promontorii b. spei regionibus nonnulli Incolae uti sciunt.

25. SOLANA varia, imprimis *Solanum bonae spei* dictum.

Crescit prope sylvam Essebosch et alibi; colitur in urbis hortis.

Baccae in unguentis quandoque adhibentur, et folia in prolapso Vaginae atque Uteri.

Succus herbae in unguentis ad depuranda et consolidanda ulcera, tota die adhibetur ab Africanis Incolis.

26. ALLIA varia, odore forti alliaceo, in Africa Australi contra Hecticam, Vermes, Suppurationes Incolis in usu sunt.

27. TULBAGIA *alliacea et cepacea* Linn. Syst. veg. p. 316.

Africae australis Incolis, *wilde knofflook*.

Crescit in campis depressis inter oceani littus et feriem montium proximam alibique, semper locis arenosis.

Radix bulbosa, tunicata, fibrosa, magnitudine pyri medio-cris, odore gaudet alliaceo, nauseoso, fortissimo, diu permanente, et ad Phthisin curandam proficua praedicatur.

TULBAGIA *cepacea* cum antecedente qualitate et viribus omnino convenit.

28. CAROXYLON *salsola*, Linnæi SALSOLA *aphylla* Syst. veg. p. 264. Africanis *Cannabosch* in locis saepe sterilissimis crescit.

Sal Sodae e cineribus hujus confectum cum pinguedine ovina saponem Africanorum constituit, non raro tam usu oeconomico, quam medico celebrem.

29. PIPER *capense* Linn. Syst. veget. ed. XIV. p. 74.

Africanis *Startpeeper* et *Boschpeeper* audit.

Crescit in sylvis Hauteniquas, Grootvaders Bosch et aliis sylvis prope rivos.

Fructus spiritu vini maceratos, stomachica possidere vi non vane credunt Incolae.

VI.

DR. EVERARDI IOANNIS THOMASSEN
A THUESSINK

DISSERTATIO

DE

OPII USU IN SIPHYLIDE OBSER-
VATIS PROBATO.

LUGDUNI BATAVORUM,

1785.

DE
OPII IN SIPHYLIDE USU OBSERVATIS
PROBATO.

INTRODUCTIO.

§. I. Inter omnia, quae tellus profert vegetabilis regni medicamenta, efficacia sua et singulari virtute longo abhinc tempore Medicis sese commendavit papaveris ille succus inspissatus, qui ab Indiis ad nos adfertur, sub specie gummi resinae, nobisque audit opium.

Ad illud remedium demum tanquam ad sacram anchoram confugit Medicus, quoties miserum acerbo dolore excruciatum nulli cedente herbae offendit, servatque hominem certo certius sub miseriarum onere succubiturum vel saltem ipsius dolores et cruciatus egregie mitigat. — Ab omni autem tempore non nisi trepidante pede hocce arripuerunt medicamentum, et parca valde manu administrarunt, facile perspicientes, quod dolores quidem vehementissimos sopiret, sed eo ipso metuentes, ne sub herba latens relinqueretur anguis, eo certius et magis furibundo morfu praedam arrepturus, quam primum sopor aegrotum relinquerit. Non mirum itaque, quod nimis iusto hac opinione extensa aliae hujus remedii vires salutare non longo abhinc tempore demum casu sint inventae. Ita in dysenteria ad violentissimos cruciatus mitigandos primum datum Opium mirifice adeo profuisse visum est, ut jamjam inter primaria et tutissima, reliquis remediis haud praetermissis, sanando morbo idonea medicamenta, a principibus in arte Viris habeatur. Sic porro in intermittentibus aliisque febribus urgente dolore datum, potentis aliquando febrifugi vices gerit. In tetano sic balneo frigido junctum unicum nuper in India Occidentali repertum est solatium *).

§. II. Vix ac ne vix quidem in casibus Venereis adhibitum fuit remedium, nisi paucis abhinc annis in Anglia,

*) Vid. Doct. Cohvane Dissert. Inaug. de Tetano. Glasgae 1781.

ubi non tantum tanquam anodynum ad dolores et cruciatus nocturnos ossifragos sedandos, sed et ad ulcera sananda fuit adhibitum, ex eodem fonte profluentia. Nuper autem inventum est, quod non tantum optimum esset variis in casibus medicamentum auxiliarium, verum etiam in multis primum, ita ut varii jam absque curationis spe, fortis suae relictis miseri, incassum tentato Mercurio, Opii largo usu plene fuerint sanati.

§. III. Quemadmodum saepe vago quodam experimento vel casu fortuito praestantissima deteguntur morbis sanandis praesidia, ita ut haud immerito inter principia Medicinae vaga experimenta et casus fortuitos memoraverit Boerhavius, ita et felici huic invento ansam dedit casus juvenis, qui, cum frustra adhibuisset per plures annos varias Mercurii preparationes, absque, ut pessima, qua laborabat, syphylis fugari posset, nullam jam sanationis spem fovens, palliare, quem sanare non poterat morbum, maluit largis Opii dosibus, non diu autem hocce usus est remedio, quin salutares in corpore effectus experiretur, et brevi ultra omnem expectationem optima frueretur sanitate.

Mirabilem hancce cum audivisset Opii ope productam sanationem Hassici exercitus, in America tum degentis, Archiater F. Michaelis, statim secum constituit se ipsum hac de re experimentis certiorum reddere *). In omnibus fere nosocomiis Americanis, speciatim autem in nosocomiis militaribus Novi Eboraci (New York) pericula hanc in rem ceperunt Medici, bono plerumque cum eventu. Hisce in Europa innotescantibus, eadem in nosocomiis Londinensibus repetierunt, in specie in nosocomio Sancti Bartholomaei, et Guyi, primusque inter eos doct. Saunders, dein vero in plerisque aliis hujus metropolis nosocomiis; horum exemplo animum sibi faciens doct. amicus H. Cullen, nosocomii Regii Edinens. Medicus tentamina quoque nuperrime hanc in rem instituit. Quorum omnium eventuum candide,

*) Medical communications vol. I. p. 307. On the efficacy, of opium, in the cure of the venereal disease; by Fred. Michaelis M. D. Physician General to the Hessian troops. Communicated, by Dr. Simmons, Read Dec. 30, 1783.

quantum ea colligere mihi licuit, enarrabo, inque his sic procedam, ut breviter.

I. Effectus sensibiles Opii in homine morbo Venereo haud correpto, enarrem, easque comparem cum effectibus in siphylide laborante; regimen modumque simul exhibendi in venereo morbo proponam.

II. Dein effectus in debellando morbo ipso vel eo mitigando exhibeam; eundo per singula.

III. Tandem aliquas exin memorem conclusiones.

C A P U T I.

DE OPII EFFECTIBUS ET EXHIBENDI MODO.

§. I. Varios, circa Opii in corpus humanum in statu sano actionem, consulens auctores, eos in duas secessisse partes video: alteram strenue pro vi ipsius stimulante dimicantem, quum altera e contrario eidem vim sedativam adscribat; qui priorem tenent opinionem asserunt, Opium directe post adsumptionem fibram muscularem ad actionem citare, quam sequitur status collapsus, vel debilitas, eamque indirectam dicunt, propter exhaustam incitabilitatem. In eo itaque omnis versatur differentia quaestionis, quod unus opio vim indirecte, alter directe sedativam adscribat.

Hancce si animo volvamus opinionum circa Opii operandi modum diversitatem, non adeo mirum videbitur, quod effectus sensibiles in corpus e diametro sibi invicem oppositos Opio attribuant. Qui Opium considerant tanquam stimulans, sequentes huic adscribunt effectus, scilicet: quod augeat pulsus frequentiam, et corporis calorem naturalem, cum faciei rubore, simul cum insolito laetitiae et hilaritatis sensu, quod, hocce statu aliquantisper continuato, dein sequatur indolentia, sensus fiant imperfecti, orianturque sopor et somnus, in quo sensibilibiter diminuuntur omnes secretiones, excretionesque, excepta sola perspiratione simul cum pulsu frequenti et pleno, quod a somno adsit debilitas cum frigoris sensu. Quod si autem major justo adsumatur quantitas, majores esse hunc hilaritatis sensum, calorem et pulsus frequentiam, adfirmant, sequi delirium et plena-

riam inebriationem, et nisi somnus obrepit, magnam inquietudinem, anxietatem, et dein insignem debilitatem ac lassitudinem. Contrariae opinionis patroni contendunt, pulsum numerum statim decrescere, respirationem fieri tardiorrem et languidiorem, faciem aliquando, sed rarius, leviter intumescere, calorem corporis imminui, sequi soporem et statum indolentiae, somnumque demum obrepere. Dosi ultra modum aucta, Opium producere vomitum vel saltem nauseam, corpus fieri insensibile, et convulsiones oboriri demum fatales, et in corpore extincto nihil inveniri, nisi aliquam sanguinis majorem in capite portionem.

§. III. Utraque de Opii effectibus opinio summos suos agnoscit defensores, suisque roboratur ingeniosissimis argumentis, quae omnia refellere vel examinare, meum non est. Ingenue autem fateri liceat, quod in institutis accurate experimentis, neque Doct. amicus Skeete in Dissertatione coram Societate Reg. Med. Edinens. neque Ds. Bards in sua Dissert. Inaug. neque ipse, effectus Opii stimulantis in corpore, experiri potuerimus: pulsus quippe constanter numero decrevit valde sensibiliter, respiratio evasit tardior, aliquando nausea, et faciei pallor accessere, simul cum sensu somnolentiae, et imminutione omnium secretionum et excretionum, aliquando etiam perspirationis: si majorem Opii quantitatem assumerem ad gr. ij et ultra, sequebatur statim somnus, cui resistere non poteram, sed qui cito turbabatur insomniis, et post somnum nulla resectio, sed potius nausea sequebatur.

§. IV. Quod si cum memoratis Opii effectibus in corpus sanum comparemus eos, quos producit in corpus viru venereo infectum, in cujusvis oculos incurrens prima fronte sese manifestabit differentia. Et primo quidem insignis est differentia in quantitate, quam ferunt aegri absque incommodo, quae si ab homine integra fruente sanitate assumere-tur non tantum molestissimas relinqueret sequelas, sed saepe ipsi foret fatalis: sic doses in primo initio gr. iij. de die, imo altera die statim gr. vj. valde ordinariae in America erant, quae dein absque prava sequela ad 3 vel 3 augebantur — Pulsus in hoc morbo ab Opio raro adficitur, in nostris saltem casibus, et in nosocomiis Londinensibus, hoc

constanter observatum est; verum, quando pulsus erat valde frequens et parvus, ordinario effectus praestabat sensibiles in pulsum, diminuendo mirum quantum ipsius celeritatem (indicio Opium gaudere vi sedante). Respiratio non adficitur sensibiliter, nisi rarissime: unicum tantum nosco casum, ubi dyspnoeam molestantem creavit. Quoad functiones naturales, ordinario effectum suum in appetitum aegri non exserit, exceptis iis casibus, ubi prostratus est appetitus, propter dolorem, quo sedato, appetitus jam naturalis evadit. Rarissimo autem in casu producit nauseam atque etiam vomitum: hanc vim constantiorem esse et majorem in Solido Opio, quam Tinct. Thebaica, vel Laud. liquido, quod optime a ventriculo fertur, docuit observatio. Opium per aliquot dies ab homine sano adsumtum cito molestantem creat alvi obstipationem: in hisce autem largus Opii usus saepe diarrhoeam creat, quam nonnulli Opii intestinis accumulationi attribuunt. Effectus hujus remedii in varias secretionem mirum quantum est varius; ita ut in uno multum augeat perspirationem, quam in alio suppressit, et insignem creat diuresin, ita ut insigniter urina quantitatem assumpti potus excedat. Nonnullis in casibus aequae ac Mercurius ingentem produxit salivae fluxum; talem casum quidam amicorum mecum communicavit, in nosocomio Londinensi, S^{cti} Bartholomei, ubi aeger, post assumpta gr. ix. opii solidi de die per aliquod tempus, copiosam provocavit salivationem, absque eo, ut in toto morbi decursu gr. Mercurii adhibuisset, non tamen videtur haec vel ulla alia secretio aucta aliquid valuisse ad ipsum curandum morbum, cum saepe absque ulla sensibili excretionem sanatus sit. Alter amicorum in unico casu directe oppositum vidit effectum; scilicet quod duo grana Opii de nocte data, per aliquod tempus, pertinacissimam salivationem suppresserint, ita ut postea merc. subl. corros. solutione iterum eandem, licet largis exhibitis dosibus, provocare non potuerit. Ordinario statum somni non mutat, foemina in nostro nosocomio de die \mathfrak{ij} . solidi opii adsumens dicebat se solita hora cubitum ire, solita expergefieri, et nullam in somno percipere mutationem; idem de reliquis fere omnibus experimentis mihi relatum est. Producit autem in pluribus casibus, saltem

quos mihi observare licuit, quemdam soporis et indolentiae statum, ita ut ad opus ordinarium peragendum haud adeo videantur parati; sed ad strictum regimen eo ipso lubentius inclinent, excessus evitent, in aliis autem, absque ullo sopore, mentis tantum tranquillitatem efficit. Vires aegri et ipsius valetudo caeterum non adficiuntur, nisi quod saepe oriantur manuum tremores, praecipue post derelictum ipsius usum, vel in initio: omnes autem Medici dicunt, quod illud symptoma haud quaquam terrere debeat, quum ordinario sponte cesset et raro impediat, quo minus dosis continuari, imo et augeri possit. Raro producit cephalaeam, quae facile etiam, absque alia medicina cessat. Singulare porro est, quod corpus inde habitum non contrahat, ita ut de necesse Opio egeat: illud quod omnino in corpore sano, vel aliis morbis obnoxio, accedere plerumque solet.

§. VI. Modus exhibendi remedium tanquam antiphilyticum est vel solidum Opium, vel cum aqua Cinamomi sub forma Laudani vel Tinct. Thebaic. (Pharmac. Edinb.)

Prudentia exigit, ut in quovis casu a dosi minori incipiamus, quamvis impune statim largas doses exhiberi posse, experientia docuerit: gr. j. prima nocte commoda erit dosis, dein altero mane gr. j. et vespere eandem dosin exhibere possumus, et sic unoquoque die gr. addendo ad \mathfrak{D} vel \mathfrak{Z} , vel si nondum ullum effectum sensibilem, produxerit ad \mathfrak{D} , et ultra procedere possumus. Si vero effectum praestiterit laudabilem, indicium est dosin sufficere, quod ordinario fiet exhibitione a gr. xij. ad \mathfrak{D} j. aliquando etiam ad gr. vj. vel viij. Nulla autem hic generalis exhiberi potest regula, quum omnino dosis statui aegri et idiosyncrasiae sit accommodanda, et medici prudentiae committenda.

§. VII. Regimen iuxta usum Opium omnino statui aegri est accommodandum, quippe plethoricus aliam requirit quam phlegmaticus, et morbo debilitatus, diaetam; illi nimirum ante opium usum convenit phlebotomia et diaeta parvior: huic C. Peruvianus vinum et caro. In genere autem diaeta non adeo stricta hic requiritur, et omnino sub Opium usu modica corporis exercitatio est laudanda. Ne Opium, nimis in intestinis accumulatum, molestam creet adeo diarrhoeam, Americani Medici bis in septimana praescribebant

medicamentum alvum laxans. Doct. autem Cullenus cuilibet grano Opii granulum adjecit aloës, quod praevertit non tantum accumulationem Opii, sed in casibus etiam aliis, semper optime occurrit alvi obstipationi; nonnunquam tamen idem Medicus alvi lotionem optimo cum effectu purgantis cujusdam salis ope administrat. Si tremor manuum aut cephalaea, aut debilitas aliquem pariat timorem optimum in Cortice Peruviano habemus remedium, et notatu omnino dignum est, quod annotat Doct. Michaelis de quodam amico, ophthalmia laborante, cui larga Opii dosis erat administrata, exiguo vini Madeirensis hauustu tremorem statim fugante. Monuisse supervacuum est, quod, si primæ viæ non sint puræ, alvi ductio, ante Opii usum omnino sit commendabilis.

§. VIII. His intellectis, procedamus ad usum Opii indigitandum in singulis morbi venerei casibus, non tantum in iis, ubi agit tanquam antisiphyliticum, verum et in quibus sedativam tantum et palliativam exercet vim.

C A P U T II.

OPII EFFECTUS IN MORBUM VENEREUM.

S E C T I O I.

IN GONORRHAEA VIRULENTA.

§. I. Gonorrhæa, vel potius Blennorrhagia, uti audit Doct. amico Schwediauer *), est inflammatio tunicae muciparae urethrae, orta ex stimulo quodam, quae, si venereum in causa est virus, venerea est. Effectus hujus stimuli et exin ortae inflammationis est muci major secretio, et quoniam vasa glandulaeque muciparae inflammatione conditionem morbosam induxerunt, mucus ille tenuis foetens et foedi coloris est. Quando haec inflammatio moderata est, omnino naturae relinqui potest, et absque ullo artis Medicae auxilio, solo regimine antiphlogistico ad felicem exitum duci potest. Rara autem haec est felicitas, et plerumque

*) Practical observations on the more obstinate and inveterate venereal complaints, by I. Schwediauer M.D. London 1784.

medici aptam manum ad symptomata, ab hac irritatione nata, moderanda requirit, quod praecipuum et fere unicum hic est Medici officium. Symptomata potissimum molesta hujus morbi sunt frequentes et dolorificae erectiones nocturnae, quas chordas vocant, et ardor urinae: ad priores nihil adeo conducit, quam injectio in rectum mucilaginosae cujusdam substantiae, cum largiore Laud. Liq. dosi, et interne haustum anodynum; vehementer ita hoc laudat summus I. Hunterus, ut in suis praelectionibus dicat, nihil adeo conducere, quam Laud. Liq. xl. guttas hora somni assumptas. Efficacissime moderatur ardorem urinae injectio, in qua larga solutionis Opii quantitas vel oleo vel mucilagini adjecta est. Quando constitutio debilis est, et valde irritabilis, ut dolor ingens sit, et materia tenuis valde excernatur, nihil magis conducit, quam Opium cortici Peruviano adjunctum. I. Hunterus commendat quarta quavis hora assumere x. L. Liq. guttas, ubi adest inflammatio erysipelatoxa, et tendit ad gangraenam. Doct. Hamilton, unus ex nosocomii Edinb. Medicis in quovis fere Gonorrhaeae statu, imo in ipso initio sequenti utitur formula, fallere fere nescia ab ipso constanter reperta, nec pravas quasdam relinquente post se sequelas.

R^x Opii ℥ij.

Aq. Font. ℥xij.
solve.

dein adde solut. cuilibet ℥ss.

Sacch. Saturn. gr. viij.

pro inject.

§. II. In genere illud est notandum, quod Gonorrhaea virulenta tractata solis mucilaginosi injectionibus, addito Opii usu interno et externo, simul cum diaeta diluente, multo citius ordinario cedat, quam quae V. S. nitrosis purgantibus, et quod pejus, drasticis Mercurialibus curatur, recteque sentit Doct. Schwediauer, quod huic simplici curationi debeatur, quod hodie tam rara sint exempla luis, tumorum testium, ulcerationum vesicae, et fistularum urethrae, et perinaei, quae omnia ex purgantium abusu ut plurimum sunt derivanda.

§. III. Mirum forsan videbitur, quod Opium adeo commendem in morbo, quem considero tanquam inflammatorium, quum Opium in quavis phlogistica diathesi nocere evidenter dicatur. Hanc autem nimis extendi opinionem plane convictus sum et plurimas dari inflammationes, in quibus optimos producit effectus, uti in variolis, morbillis, nephritide, hepatide, imo et peripneumonia, ac pleuritide, sive illud sit noxium inflammationi, qua tali, vel diminuat stimulum totius systematis, et sensibilitatem fibrae muscularis, uti putat Celeb. Professor Cullenus, de re ipsa ultra dubium constat. In Gonorrhoea certe plurima symptomata oriuntur ex irritatione stimuli corpori applicati, cujus effectus saepe diminuitur imminuendo totius systematis irritabilitatem, ad quod efficiendum certissimum remedium est Opium. Haecque conveniunt cum optimi Praeceptoris opinione, dicentis: „As most of the symptoms arise from „the irritation of a stimulus applied, the effects of this irritation may be often lessened by diminishing the irritability of the system; and it is well known, that the most „certain means of accomplishing this, is by employing „opium. For that reason I consider the practice both of „applying Opium directly to the urethra and of exhibiting it „by the mouth, to be extremely useful in most cases of „Gonorrhoea *).“

Huic de efficacia Opii in Gonorrhoea opinioni pulcre congruit etiam hodierna observatio, qua Opium interne sumtum unice curasse Gonorrhoeam probatur. Memorabilem casum mecum communicavit Ing. Lyons M. B. amicus optimus, scilicet, Philadelphiae experimenti causa Opium in pluribus casibus tentavit, quorum hic unus est.

Juvenis aetatis anno 18. per quatrimum Gonorrhoea adfectus fuerat, quando auxilium petiit. Inflammatio erat vehemens, multumque affligebatur erectionibus dolorosis per noctem. Statim ad Opii usum recurrebatur, incipiendo a gr. ij. mane et vespere; quod optime tolerare poterat, et quando symptomata evadebant mitiora, haecce quantitas per aliquot dies fuit continuata, tumque augebatur ad gr. iiij.

*) First lin. of the Practice of Physic. vol. IV. p. 401.

mane er gr. iv. vesperi: postea nulla aderat necessitas adaugendi dosin, sed continuo cepit gr. vij. de die usque ad plenariam curationem. Annotatu dignum est, quod, licet nunquam Opii usui antea fuisset adfuetus, hoc nullum praestaret in ipsius sanitatem effectum sensibilem: in promptu semper habebatur remedium laxans, quum alvi obstipationis metus erat; sed per totum illud tempus alvi status regularis erat, adeo, ac in sanitate, et nunquam illa fuit necessitas illud adhibendi.

Natura medicamenti semper illi fuit abscondita, et statim ac Gonorrhoea cessaverat, medicina omittebatur, absque ullo incommodo.

Neque injectio, neque ulla topica applicatio adhibitae fuerant, atque Opium manifesto videbatur reddere evacuatam ab urethra materiam, quantitate minorem, et minus qualitate irritantem.

S E C T I O II.

IN PHYMOSI ET PARAPHYMOSI.

§. I. Saepe fit, ut in Gonorrhoea ad summum inflammatione evecta, vel ipsa glande inflammata, sive ulceribus intra praeputium degentibus, acris admodum materia irriter adeo praeputium, ut inflammetur, tumeat, sese circa glandem constringat, vel ut retractum nullo modo reduci possit; prior phymosis, posterior paraphymosis audit. In utroque casu, cum symptomata ex irritatione materiae, et irritabilitate partium dependeant, nihil adeo conducere docuit experientia, quam largae Opii aqua soluti doses, additis fotionibus emollientibus, uti et clysmate ex mucilaginoso cum larga Opii quantitate, et simul dosin Laudani hora decubitus.

§. II. Hancce tractandi phymosin methodum commendant Ds. Foart Simmons *) et Ds. Schwediauer, mihi-que dixit Celeberr. Cullenus, se Opium haud quaquam inter inefficacia medicamenta in phymosi habere, nuperque in casu acerrimo largas Opii doses commendasse, ubi aderat

*) Treatise on the gonorrhoea.

phymosis cum insigni partium gangraena: Recensetque Ds. Michaelis casum; in quo aderat vehemens adeo inflammatio, ut praeputium jamjam maculam nigram ostenderet, adhibuit V. S. largam, falia purgantia incassum, ad operationem autem procedere debuit, qua facta febris quidem diminuebatur, sed praeputium omne erat plane mortuum, adhibuit tum Opii iij de die eo eventu, ut paucorum dierum spatio decideret praeputium, cessaret brevi Gonorrhoea, et ulcera glandis sanarentur.

S E C T I O III.

I N I S C H U R I A V E N E R E A.

§. I. Quam utile sit Opium in omni urinae suppressione, quae ex constrictione spasmodica oritur sphincteris Vesicae cuilibet practico notum est, tantique aestimat Celeb. Percivall Pott, hanc praxin, largas in Ischuria exhibendi Opii doses, ut testetur, se ab eo inde tempore, quo largas exhibuit Opii doses rarissime ad operationem molestissimam paracatheseos vesicae recurrere debuisse.

§. II. Speciatim autem in ista specie Ischuriae a multis commendatur, quae ex suppressione imprudenti Gonorrhoeae oritur, quando ex quadam causa externa virus venereum pristinum sub fraenulo situm derelinquit, et sese prope sphincterem vesicae collocat, ejusque spasmus producit. Ad huncce removendum clysinata ex oleo lini, decocto avenaceo vel hordei, cum laud. sufficiente quantitate commendat Ds. Schwediauer, exstatque casus in ultimo volumine observationum Medicarum Londinensium, in quo ex suppressa Gonorrhoea suppressio urinae advenerat, quam comitabatur ingens inflammatio: liberior Opii administratio hic evidentissimam producebat symptomatum amotionem.

§. III. Chirurgus Americanus evidenter eodem in casu bonum successum expertus est ab applicatione emplastri ex Opio puro cum aquae sufficiente quantitate subacti. Manifesto quoque profuisse vidi Opii liberam exhibitionem, ubi ex intolerabili excernendae urinae frequentia, absque eo, ut aeger nisi paucas guttas evacuare posset de tempore,

summa creabatur aegro molestia, imo hoc in casu Opium tam interne, quam forma enematis administratum, momentaneum saepe levamen attulit.

S E C T I O IV.

I N H E R N I A H U M O R A L I.

§. I. Virus venereum post retropressam, praepostera tractatione morbi, Gonorrhaeam aliquando, uti vidimus, sphincterem vesicae petit, aliquando autem tantum descendit ad illam urethrae partem, ubi vasa deferentia et vesiculae feminales sese aperiunt, vel et post curatam ichuriam altius adscendens huncce locum petit, ibique spasmus irritatione sua producens, aliquando momento citius vasis deferentis et epididymidis producit durum tumorem, aliquando absque, aliquando cum insigni dolore, qui tumor, si perverse tractetur, saepe ad testem ipsum sese propagat, ejusque tumorem, inflammationem, insignesque cruciatus producit. Sedes morbi haudquaquam in ipso teste est, virus venereum per nullam viam eo pervenire potest, sed irritat ad initium ductus deferentis, omniaque adeo symptomata sunt symptomata. Juvant itaque parum topicae applicationes sacchari Saturni, aquae frigidae etc. quae causam morbi non tollunt; sed hic primaria indicatio est, ut spasmus et irritatio urethrae tollantur, et ad pristinam sedem sub fraenulo revocetur virus. Contrariam ideoque praxin perspicacissimus Schwediauer primus introduxit, suadens balneum tepidum, topicam applicationem vaporis aquae calidae cum aceto ad perinaeum et urethram, circa penem fomenta emollientia; sed maxime laudat prius foeces ordinario clysmate evacuare ex oleo lini cum hordei decocto et Opio in anum injectis semel de die, simulque opium interne copiose assumere, quo modo saepius 24. vel 48. horarum spatio aegrum se sanasse adfirmat, qui alio modo tractatus tot menses ad plenam restitutionem requireret: suadet porro positionem per illud tempus horizontalem observare, et per omne tempus, quo gonorrhoea postea laborat, suspensorium ferre. Post hunc eandem methodum commendarunt Doct. Foart Simmons, aliique Anglorum Medici.

In hocce forte etiam casu incassum tentata supra memorata methodo conduceret perinaeo externe applicare emplastrum ex Opio puro, quod probabiliter eandem hic produceret vim antispasmodicam, ac idem illud praestat in curanda ischuria venerea, uti in praecedente Capitulo vidimus.

S E C T I O V.

I N B U B O N I B U S V E N E R E I S.

§. I. Quoties glandula lymphatica in aliqua corporis parte ex absorpta virus venerei portione tumet, bubo dicitur: obtinet autem bubo, quoniam virus venereum absorptum prius petit lymphatica in inguine, maxime in glandulis inguinalibus superioribus, dein infra axillas bubo non raro reperitur, rarius in collo, aliisve partibus. Fit autem saepius, ut ex sympathia hae glandulae sint tumidae, licet nulla adsit absorptio, priores dicuntur idiopathicae, aliae symptomaticae. Duplici autem in statu bubo Idiopathicus nostram requirit medelam, vel in initio, quando in statu adhucdum inflammatorio versatur, vel quando neglectus est, et pus sese formavit et illud jam sese evacuare incipit, ulcusque apertum est.

§. II. In primo bubonis statu, quando signa inflammationis valde sunt urgentia, pulsus est frequens, et molli; constitutio aegri valde sensibilis atque irritabilis: omnino abstinendum est ab evacuationibus, quae corpus magis reddunt irritabile, sed irritabilitas tollenda est Opii largis dosibus; et applicationibus externis cum Opii solutione, diaeta adhibenda est lautior, imo et Cort. Peruvianus convenit. Nonnulli autem eo procedunt, ut ad discutiendum bubonem Opium praescribant, cui tamen non adeo considerem, quam repetitis Tart. Emet. vel Ipecac. dosibus ad vomitum moderatum ciendum. Doct. Michaëlis in unico aegro bubonem discussit exhibendo Opium a gr. iij. ad gr. vj. de die, eumque, licet praeterea ulceribus laboraret venereis, nona septimana e nosocomio curatum dimisit.

§. III. Alter bubonis status est suppuratorius, quando materia turget bubo, fluctuatio sentitur et parietes de-

veniunt tenerae, tunc non amplius discutiendus, sed omni modo ad maturitatem pervehendus est, ita ut vel sponte sua disrumpatur, vel aperiri queat: nonnulli hunc in finem aperturam cultro faciunt, vel largo applicato caustico; observat autem summus Chirurgus J. Hunterus, utramque methodum esse periculofam, quum producantur non tantum insignis dolor et inflammatio, sed ulcerum margines deveniant collofi, et sanari facile negent, suadetque simul cum parvo caustico conjunctam applicare Opium, qua applicatione escharotici vis non infringitur, sed dolor tollitur et partis irritatio et inde consequens nova inflammatio evertitur.

§. IV. Aperto autem bubone ad ulceris sanationem ipsam optime convenit Opium, tum externe ipsi ulceri applicatum, tum et interne assumtum largis portionibus, duplicique iterum hic convenit respectu: scilicet, in casibus recentibus directe post aperturam bubonis et in iis casibus ubi ulcus mali moris jam evasit, Mercurio haud cedens amplius. Utrorumque horum casuum Opii largis dosibus curatorum exempla praebent Americanorum annotationes Medicae. Ad primum genus referri debent casus, quos communicavit cum Soc. Med. Lond. Doct. Michaelis, scilicet: viri nunquam antea infecti jamjam bubonibus in utroque inguine laborantis, cum aliis simul symptomatibus morbi venerei, disparuit alter bubonum, alter apertus est: margines sub quarta hebdomade callosi erant, ita ut ipsorum praecisio forfice necessaria dijudicaretur: postea autem applicuit solutionem Opii externe, et interne sensim augendo dosin, gr. xiv. Opii puri de die propinavit, eo effectū, ut ob omnibus symptomatibus tertio mense esset sanatus.

In bubone aperto simul cum ulceribus in aliis partibus dedit gr. xiv. Opii, tertia septimana dosi aucta, melior sese ostendebat bubonis facies et post aliquod temporis spatium dosi ad gr. xiv. aucta, omnia symptomata cessarunt.

In tertio denique casu bubone disrupto sua sponte ipsius admissionis die, Opium ad gr. v. datum fuit, eo successu, ut quarto jam die, bubo multo melius se haberet, et post sex sequentes dies plene esset sanatus. In omnibus autem hisce casibus Mercurius non fuit sive externe sive interne adhibitus.

§. V. Ad alteram classem referendi sunt bubones, qui per longum satis tempus perstiterunt absque eo, ut ulli remedio cedere voluerint: habitum ostendunt pravum, callosi sunt margines, ichorem tenuem et decolorem fundunt, corpus interea emaceratur, decrescunt vires, pulsus fiunt celeres et valde debiles; accenditur febris hectica, et misere pereunt aegri. Tantum abest, ut his in casibus conveniat Mercurius, ut potius eo ipso symptomata fiant pejora, ulcera sese spargant longe lateque et corpus magis magisque fiat irritabile. Unicum hocce in statu remedium, simul cum diaeta lauta, videtur Opium, felicissimaeque curae hujus ope plurima exempla profert Ing. Grant Nosocomii Novi Eboracensis generalis Chirurgus, itemque Doct. Michaëlis, quae breviter recensere lubet.

Momentaneum fere effectum se vidisse ex Opii applicatione asserit Exp. Grant in Juvene 25. annorum laborante bubonibus in utroque latere apertis atque tractatis more solito, permanebant autem in statu ulcerationis per quinque menses, per quod temporis spatium frictione introduxerat unguenti Merc. fortioris ℥iijss. quod constitutionem sufficienter adficere videbatur, diaeta morbo accommodata, omniaque alia, quae ad curam facere posse videbantur, adhibita fuere, nulla cum percipiebatur mutatio, saepius purgantia fuerunt adhibita. Non obstantibus hisce omnibus, non fuit emaciatus aeger, neque suas perdidit vires, quamvis ulcera essent fordida, callosa, et crasso margine instructa cum evacuatione ichoris, atque insigni dolore et inquietudine. Adhibebatur tum gr. jss. Opii, cum administratione diaetae parcae et tenuis et simplici ulcerum deligatione, sequenti die, cum nulla aderat mutatio, dosi Opii adaugebatur ss. gr. hoc die, die 4to. omnia sese probebant meliora, et intra tres septimanas ambo ulcera perfecte erant sanata, absque eo, ut necesse esset aliud adhibere medicamentum. Hujusmodi casus plures recenset, uti et Doct. Michaëlis, quas brevitatis ergo omittam. In genere tantum hic monendum, quod si flaccidum appareat ulcus, pulsus debilis et alia deficientium virium symptomata, tum Opium non adeo conveniet, quam cum irritabilitatis adlint indicia, sed quod eo in casu roborantia, cor-

tex, vinum, diaeta lauta et balneum maris propria sint remedia.

S E C T I O VI.

IN ULCERIBUS VENEREIS RELIQUIS, ET IN GENERE IN ALIIS SYMPTOMATIBUS AB ABSORPTIONE VIRUS VENERI ORTIS.

§. I. Vidimus huc usque de effectibus Opii in casibus, ubi proprie Siphylis adesse dici non potest, sed tantum topicos produxit in genitalia et partes vicinas effectus, absque ut virus ipsum a lymphaticis susceptum in ipsam humorum massam penetraverit, eamque foedo infecerit veneno. Tractandum itaque jam erit, de Opio, tanquam proprie sic dicto antisiphylitico, nobisque perquirendum est, quamnam illud exserat efficaciam in corpus hocce veneno penetratum; ne tamen nimis subtilis esse videar, sub hoc titulo etiam comprehensus sum ulcera venerea, licet in partibus ipsis generationi dicatis sint posita; absque ipsius massae infectione. In qua pertractatione, ut aliquem observem ordinem, experimenta variorum separatim sum relaturus, quamvis forsan pro diversis symptomatibus datum sit Opium a pluribus eodem modo: primo summarium exhibiturus sum observationum Doct. Michaëlis, quae fusius nuper editae sunt Anglico idiomate, quum primus sit, qui Opium commendaverit in hoc morbo tanquam specificum antivenerum, dein experimenta Exp. Grant nuperrime etiam fusius edita *a*): tandem collectas observationes aliorum virorum, quae mecum ab ipsis Auctoribus sunt communicata, finemque hisce inponam, addendo proprias, quas praeside Culleno feci observationes in nosocomio Edinensi.

Sequentes refert casus Doct. Michaelis.

Casus I. Miles, qui per novem septimanas de die in diem ingravescentibus laborabat ulceribus venereis circa anum et penem, ferocem, tenuemque materiam evacuantem.

a) Observations on the use of opium in removing symptoms of morbid irritability by A. Grant, Senior Surgeon of his majesty's military hospitals during the late war in America. London 1785. uti et Medical Journal of Dr. Foart. Simmons part. 5.

bus, tandem petiit nosocomium, quando partes generationi dicatae, perinaeum, femora et interna oris superficies condylomatibus tecta erant, totumque corpus livida eruptione erat conspurcatum. Incepit fumere gr. iv. extracti thebaici de die, ulceraque externe cum solutione eiusdem extracti deligabantur. Post hujus applicationem tertio die dosi ad gr. ij. augebatur. Quarto die ulcera ut plurimum sicca, et magnitudine multum imminuta deprehendebantur, et ab omni doloris sensu libera. Viginti dierum spatium omnia ulcera erant sanata, et non obstantibus hisce, usus gr. viij. Extr. Theb. per mensis spatium continuabatur.

Casus II. Quidam per quinque menses laboraverat Gonorrhoea, parvo glandis penis ulcere et bubonibus saepe curatis, deinde vero erumpentibus. Nosocomium intrans absque ullius antea remedii adhibitione, praesentia symptomata erant ulcera genitalium et faucium, phymosis et dolores nocturni brachiorum, quando lecto incallescabant. Adhibuit in initio gr. iij. Opii solidi de die, quae dosi hebdomadis spatium augebatur ad gr. xij. Quo elapso ulcera pene sanata, phymosis insigniter imminuta, bubones discussi deprehendebantur, atque unice de dolore dextri ilei conquerebatur. Versus finem autem quinque hebdomodum perfecte fuit sanatus. Dosi interea Opii ad ℥ss. de die aucta erat.

Casus III. Vir sese applicuit ad Nosocomium adfectus ingentibus ulceribus circa penem, scrotum et in faucibus simul cum condylomatibus in ano. Post adhibitionem gr. iv. Opii de die, quinto jam die ulcera sicca evadebant: die decimo tertio ulcera fere erant sanata, condylomatibus jam plane dissipatis, quando utebatur Opio ℥ ss. de die. Nova dein iterum ulcera apparuerunt, licet adhiberentur gr. xij. de die, quae autem Opii gr. xxiv. assumptione de die cito evanuerunt.

Casus IV. Aeger laborans recenti ulcere penis cum bubone, incassum adhibitis gr. ij. Merc. subl. de die, post usum Opii a gr. iij. ad ℥. ss. de die novem septimanarum spatium sanatus fuit.

Casus V. Miles laborans ulcere lato, foetido et dolente ad regionem superiorem femoris, itemque ulceribus

penis et doloribus nocturnis, absque effectu, quindecim pilulas mercuriales adsumsit. Opium administratum fuit sensim augendo dosin 2 gr. iij. ad vj. de die. Statim meliori facie sese ostendit ulcus, et versus finem tertiae hebdomadis, purum apparuit, dolores nocturni plene cessaverant et quinque septimanarum spatio ulcus sanatum fuit: redierunt tamen ulcera cum insigni manuum tremore et somnolentia, quae autem symptomata brevi tempore cessarunt, post Cort. Peruv. cum Opio largam exhibitionem.

Casus VI. In ulceribus praeputii et condylomaribus ad genitalia primo adhibuit Doct. Michaëlis solutionem gr. vj. Opii in aq. 3vj. externe quater de die. Sequenti die ulcera perfecte erant sicca, quamvis die praecedenti insignem ichoris quantitatem funderent, omnia condylomata applanata conspiciebantur, imo nonnulla plane jam disparuerant: omnia tamen modicae huic dosi externae cedere recusabant, facile tamen evanescencia adhibito interne Opio ad 3j de die, simul cum externa lotione, et sexta hebdomade ex nosocomio curatus exiit aeger.

Casus VII. Vir quidam frustra adhibuit per longum satis tempus solutionem merc. subl. corrosivi, ita ut sese ac antea pejus habuerit: nosocomium petens bina lata habuit glandis et praeputii ulcera cum paraphymosi. Cataplasmata V. S. S. Opium externe applicitum posterius fugarunt symptoma triduo. Ulcera Opio aqua soluto fovebantur, simulque interne Opium 2 gr. iij, ad v. adhibebatur, eo cum effectu, ut decimo octavo die jam esset sanatus.

Casus VIII. Aeger laborans phymosi et ulceribus praeputii unice curabatur injectione solutionis Opii sub praeputio novem dierum spatio.

Casus IX. Miles mensis spatio curabatur calomelanos ope a Gonorrhoea et bubone; tribus post curationem elapsis septimanis insignis condylomatum numerus sese ostendebat ad anum et partes genitales: adhibuit gr. vij. Opii, et simul externe solutio Opii applicabatur, puogenesis jam multum tertio die erat immutata, et decimo quinto magna pro parte condylomata jam disparuerant, et post elapsum mensem perfecte sanatus est, licet non ultra gr. vj. de die assumsisset.

Casus X. Miles ulceribus glandis, praeputii et eruptione frontis laborans, curatus est gr. iv. ad xiv. de die, trium mensium spatio.

Casus XI. Intra quinque hebdomadas sanata sunt ulcera larga sub praeputio, post assumptionem opii a gr. iij. ad v. de die.

Casus XII. Lata in quodam aderant ad scrotum et femora condylomata absque Gonorrhoea vel ulcere: adhibuerat decem calomelanos pilulas absque effectu, post adhibitionem externam et internam Extr. Theb. ad gr. iv. de die, altero die jam subsederant condylomata, et 19. diebus perfecte sanatus fuit.

Casus XIII. Femina per quinque annos siphylitica jamjam adfecta mali moris ulcere cum marginibus nigris fisticque in faucibus et uvula adfecta, palato morbido, partimque crusta nigra obtecto, voceque inde insigniter immutata, jussit Ds. Michaëlis fumere opii gr. iij de die, et decoct. Cort. Peruv. cum Elix. Vitr. gargarizare fauces. Decimo jam die manifesto melius sese habuit. Dosis ad gr. V. augebatur, continuabatur gargarisma et mensis spatio palatum sanum fuit, vox naturalis, reliqua vero ulcera sex hebdomades ad curam requirebant, dosi tamen Opii refracta ad gr. iij.

Casus XIV. Ulcus penis in quodam curabatur praeparatione quadam saturnina, post elapsum annum ulcera faucium oboriebantur: calomelas et Merc. sublim. corros. hoc ulcus cum uvulae tamen jactura curabant. Sequenti anno rediit ulcus. Jussit Doct. Michaëlis Opium sumi ad gr. iv. de die et garg. ex Tinct. Thebaic. g^{tt}. C. cum aquae 3vj. Effectus sequenti die fuit faciliior deglutitio, ulceraque multo meliorem ostendebant faciem. Dosi aucta ad gr. viij. omnia ulcera sanata erant, excepto tantum unico, profunde admodum sito, quod tamen die 14. sanatum fuit.

Casus XV. Aeger afficiebatur bubonibus et doloribus crurum violentis, absque effectu Merc. dulc. adhibuerat. Post usum Opii ad gr. iij. per aliquot dies ulcera sese ostenderunt ad os et praeputium. Opii dosis sic per quatuordecim dies continuabatur, sed pilulas ore rejiciens Laud. Liq. ad g^t. lx. adsumsit, quae dosis augebatur ad g^t. xl. secunda

quavis hora; quam dosin iterum diminuere debuit ad gr. xv. per aliquod tempus successu tamen respondente.

De omnibus hisce adfirmat Auctor, aegros post plures menses, imo annum elapsum, nullis symptomatibus venereis fuisse correptos.

§. II. Expertiss. Grant, Chirurgus generalis Nosocomiorum Anglicorum in America unice commendat Opium in casibus inveteratis, et ope Mercurii non curandis, hujusque exempla nonnulla profert, quorum summarium hoc est.

Casus XVI. Vir aetatis 34 vel 35. annorum, habitus macilenti et tenuis corripiebatur faucium ulceribus, et lato sinistrae tonsillae ulcere, dolore excruciante partis anterioris cruris cum perioestio incrassato et eruptione cutanea in regione thoracis: pulsus erat 130. minuti spatio, per aliquot hebdomades valde fuerat inquietus, absque somno, et mentis insignis aderat dejectio, atque anxietas. Illico omittebatur Mercurius, quem per satis longum tempus adhibuerat, et propinabat Opii gr. i ss. sequenti die omnis jam cessaverat dolor, atque optime dormiverat: augebat dosin ad gr. iij. vesperi et ij. mane, evidenti cum beneficio die 2^{do} utebatur instrumento Mudgiano ad vaporem calidum inhalandum. 3^{to} die ulcera puriora evidenter apparebant, et gradatim sic cura processit ad 24. diem, quando omnes partes sanatae erant. 8^{vo} die salivatio adgrediebatur, quae per undecim dies perdurabat ad pint i. de die, absque virium jactura, ita ut jam ad negotia procedere posset, antea lecto detentus.

Adhibuit per sex septimanas decoctum sarsaparillae, et per tres septimanas $\frac{1}{2}$ gr. merc. calcinati de die, ne aliquis foret metus remanentis veneni. In decursu 2^{dae} septimanae eruptio disparuit, et perioestei, quae aderat, incrassatio, vesicatorio cessit. Opii dosis a 24^{to} ad 42^{dum} diem diminuabatur ad gr. i. de die.

Casus XVII. Miles aetatis 37. adfectus erat ulceribus utriusque tonsillae et faucium, cum doloribus ossifragis, quae symptomata per trimestre spatium duraverant, adhibuerat Mercurialia, aliaque medicamenta absque successu. Habitus ipsius erat gracilis atque tenuis cum pulsu ab 120. ad 130. Prima nocte incepit sumere gr. i ss. Opii puri.

Secundo die, cum nulla oborta esset mutatio, augebatur dosis ad gr. ij fl. Tertio die ulcera meliora apparebant, et quovis alio respectu melius sese habuit 8^{vo} post Opii usum fauces relaxatae videbantur, et debilis apparebat, tumque omittebatur Opium, exhibitusque fuit Cort. Peruv. cum gargarismate adstringente. Die 10^{mo} Cort. producebat nauseam, ac dolores recrudescebant, et data sunt iterum gr. ij. Opii, sero et i. mane 11^{mo} iterum melius sese habuit: 12^{mo} data sunt gr. ij. mane et sero: die 52^{do} cum omnia bene cederent, dolores ossium disparuissent, omittebantur gr. ij. mane. Elapsa abhinc septimana, omnia ulcera perfecte erant sanata. Vires quotidie augebantur. Continuabatur gr. i. per 14. dies, et perfecte sanatus fuit.

Casus XVIII. Miles annorum 36. habitus robusti atque plethorici, adiciebatur parvis ulceribus tonsillarum et faucium, cum ophthalmia, salivatio absque ullo fructu tentata erat Mercurii Ope. Praescripsit expert. Grant diaetam parcam incepitque dare gr. j. Opii mane et sero. Insequenti die multo melius sese habuit. 4^{to} multo melius. 6^{to} nulla mutatio aderat. Hinc auxit dosin i gr. vespere. Per 14. insequentes dies continuo melius sese habuit, ophthalmia melior, fauces sanatae erant. 16. Omittebatur Opium mane. 18. Omitt. gr. i. sero. 23. Omnis inflammatio cessaverat, et quolibet alio respectu bene sese habuit, atque 20. dimissus est a nosocomio perfecte sanus.

Casus XIX. Navita aetatis 28. plethoricus ulcera glandis penis et phymosin contraxerat, ita ut praeputium esset gangraenosum cum doloribus violentissimis, pulsus erat 120 minuti spatio, et aliquando ultra, bis Mercurius os ipsius adfecerat, incepit sumere gr. Opii ij. sero, et i. mane. Transiegit noctem placide dormiendo, quod diu non evenerat. 9. Eodem modo sese habuit, et gr. ij. Opii praescripsit Medicus mane et vespere. 10. Mentis quietudo et animi aderat serenitas. 11. Dolor multo erat mitior, et praeputium gangraenosum separatum deprehendebatur a sanis partibus. 15. Melius sese habuit usque ad 18, quando ulcera tantum non erant sanata, tumque dosis Opii, quae aucta erat ad gr. vj. iterum diminuebatur ad gr. iv. de die:

die 21. dosis ad gr. ij. diminuebatur. 25. Plane fuit curatus; sumsit tamen gr. j. per alteram septimanam.

Adfirmat porro expert. Auctor se in aliis decem casibus deprehendisse salutares Opium effectus, quorum sex insignes erant ulceribus inguinum ad quaevis alia medicamenta rebellibus, et sese longe lateque diffundentibus, unus aeger penis ulcerationem, et tres ulcera faucium et tonsillarum habuerunt.

Eodem tempore in America, ultimo durante bello plurimi Medici et Chirurgi in nosocomiis Opium in lue Venerea propinaverunt optato cum successu, et in specie adeo felix hac in re fuit Doct. Scöpf, ut cuidam amicorum dixerit, se ab eo inde tempore quo adhibuisset Opium, in morbis venereis, ne granum quidem Mercurii propinasse. Doct. etiam Noodt, Medicus generalis exercitus Anglici in America testatus est, plurimos casus faustissimo eventu coronatos se vidisse.

§. III. Ab altera tamen parte et illud dicendum, quod haud quaquam adeo universalis fuerit haec felicitas, ut non aliquando fefellerit, ubi Mercurius brevi fecit curationem. Exp. Robertson cohortis 47. exercitus Anglici (Royal Highlanders) Chirurgus primarius, candide confessus est, se nunquam in lue confirmata, ubi Mercurius non fuerat adhibitus, in suo nosocomio curam Opio productam vidisse, licet saepius in aliis Americanis nosocomiis illud observasset, et quod cum satis diu jam Opium adhibuisset, saepius brevi aegros Mercurio curaverit, veniam mihi concessit ex insigni casuum numero selectos tres casus hic inferere.

Casus XX. Jacobus Mackay, miles admissus est in nosocomio 5. Aprilis 1781. Novi Eboraci. Symptomata erant tumor crystallinus praeputii, paraphymosis et ulcera Venerea, orta ex infectione recenti a foemina lue laborante. Regimen antiphlogisticum, V. S. S. salia laxantia per commoda intervalla fuerunt adhibita, simul cum applicationibus variis externis. Opium adhibitum fuit per septemdecim dierum spatium a gr. iij ad gr. xvij de die, ita ut gr. c. Opium assumeret, absque ullo effectu laudato. Opium interea produxit stricturam circa praecordia et dyspnoeam, ita ut ipsius usus omitti debuerit: acetum larga manu ad

hoc symptoma tollendum fuit exhibitum, effectu desiderato.

Curfus Mercurialis quatuordecim dierum spatio omnia haec symptomata removit.

Casus XXI. C. Hannach, admissus est 26. Maji 1781. Symptomatibus hisce laborabat: gonorrhoea, tumore testium insigni, et doloribus brachiorum, forte rheumaticis, atque bubone valde largo. Utebatur injectione ex solutione calcis cupri in Sp. salis Ammon. volat. ad plenam saturationem ad guttas x. in aq. commun. ℥viij. quae injectio brevi sistebat Gonorrhoeam. VSS. et cathartica brachiorum dolorem amoverunt; verum testium tumor cuivis remedio resistebat per x. dies, quando Gonorrhoea redibat. Bubo autem intra hoc tempus fuit discussus. Opium de die ad gr. iij. removit 7. dierum spatio testis inflammationem crescente iterum Gonorrhoea: rediens iterum levis testium inflammatio illo tempore, quo Opium adhibebatur, cito abiit post applicationem Cataplasmatidis cum Saccharo Saturni. Post assumptionem gr. lx. Opii, errore quodam assumsit ejus loco gr. xv. Pil. merc. Edinb. per duos dies, quae os adficiebant. Effectibus Mercurii remotis iterum incepit assumere Opium, quando Gonorrhoea iterum augebatur, et per biduum Opii gr. ij. de die assumsit. Conqueri jam incepit de doloribus nocturnis tibiarum, qui de tempore in tempus illi insignia excitarunt incommoda per plures menses, de quibus vero antea non erat conquestus; jam vero ad insignem violentiam pervenerant. Gonorrhoea etiam valde erat molesta. Opium regulariter fuit assumptum, et injectio repetita, cujus ope Gonorrhoea sistebatur quinque dierum spatio: dolores autem persistabant in eodem violentiae gradu. Viginti unius dierum spatio 72. gr. Opii assumpta erant, quando rediit tumor testium, doloribus manentibus iisdem. Opium tunc omittebatur, et administrabantur purgantia lenia et applicationes saturninae. Post quatri-duum, quando tumor subsedit, ulcerationes nonnullae sese manifestarunt in praeputio, et Gonorrhoea rediit. Iterum assumsit Opium, dosi sensim aucta, a gr. iij. ad gr. xvi. de die, ita ut in intervallo 20. dierum caperet 169. gr. Opii, absque ullo levamine. Ultimaes Opii doses producebant in-

signem nauseam et aliquando vomitum, et post ultimam dosin bis sanguinis coagulum tussi rejecit. Continuavit tamen eandem quantitatem pilularum gradatim ratione ipsius ventriculi status adaucta dosi per 3. septimanas. Exacta quantitas non fuit annotata: interim larga admodum satis fuit. Cum valde jam esset debilitatus diaeta lactea ei fuit praescripta. Cohorte iussa urbem relinquere ad nosocomium missus est ordinarius. Cursus Mercurialis fuit adhibitus et 6. hebdomadibus curatus fuit, ut fungi suo posset officio.

Casus XXII. Michaël Griffin, miles, admissus 17. Junii 1781. cum Gonorrhoea, phymosi et bubone non valde insigni, sed magnum pariente dolorem. Gonorrhoea persistenterat 14. dies, et jam injectio cuprea adhibebatur cum regimine antiphlogistico; trium dierum spatium ardor urinae et chordae erant remotae, tumque Opium adhiberi coepit ad gr. iij. de die et emplastrum Mercuriale buboni applicari. Intra sex dies bubone crescente, et phymosi augente, mittebatur opium, et recurrebatur ad parcas calomelanos doses. Octo dierum spatium ore adfecto, omnia symptomata erant remota, excepta Gonorrhoea, quae per mensem adhuc durabat, et tandem Copaibae balsamo superabatur.

§. IV. Quemadmodum in America septentrionali, sic et in Britannia varii admodum fuerunt. Opii experiendi ergo captorum experimentorum eventus, ita ut nonnulli Medici Londinenses effectus Opii salutes deprehenderint, alii frustra sanationem morborum venereorum hocce remedio per longum satis tempus tentaverint. Operae itaque pretium duxi singulorum experimentorum in nosocomiis eventus commemorare, prout ea mecum communicata sunt a Medicis Londinensibus, quibus pro hoc benevolentiae signo maximas publice refero vices, in primis Viro Doct. Th. Skeete, M. D. et exp. Th. White, valetudinarii Londinensis Chirurgus primario, amicis exoptatissimis.

§. V. Summa cura et omni attentione Opium tentatum fuit in nosocomio Sancti Bartholomaei, in quibusvis morbis venereis, eo cum eventu, ut omnes hujus nosocomii Medici uno confiteantur ore, morbum venereum se

hocce remedio solo sanare non potuisse iis in casibus, ubi antea Mercurius non fuerat adhibitus; imo ex quodam amico Londinensi intellexi, aegrum, qui largis utebatur Opii dosibus, cito e medio sublatum fuisse, iis vero in casibus, ubi antea per longum satis tempus Mercurius absque beneficio adhibitus fuerat, optimos ex hoc remedio experti sunt effectus, et Mercurio junctum Opium in plurimis casibus salutiferum fuit valde in lue venerea remedium.

§. VI. Nosocomii Sancti Thomae Medici etiam blandientes non adeo, experti sunt effectus, ac quidem expectaverant secundum relationem Medicorum Americanorum, videntur tamen nondum sufficientem habere observationum numerum, ut ab una parte Opii usum contemnere, vel ab altera virtutem ejus antiveneream stabilire et confirmare queant. Simul tamen etiam insignem hujus remedii usum ubi Mercurius fuit antea adhibitus, vel cum Mercurio dati experti sunt.

§. VII. Experimenta Doct. Saunders Nosocomii Guyi Medici omnium experimentorum Londinensium maxime pro Opii virtute antisiphylitica facere videntur, quum in multis casibus morbus plane sanatus fuit applicatione interna et externa Opii, absque ulla Mercurii adhibitione. Doct. Hinds, M. B. Pensylvaniensis plurimos se vidisse casus mihi retulit, in quibus Opio morbus curabatur in Nosocomio Guyi, et sequentes communicavit casus.

Casus XXIII. Juvenis annorum 18. trium hebdomadam spatio post communicationem cum femina suspecta corripiebatur gonorrhoea virulenta et aliquod tempus post gonorrhoeae insultum plura ulcera venerea apparuerunt circa radicem coronae penis: hoc in statu sese applicuit Doct. Saunders hujus Nosocomii Medico, particularem curam non habuit curandae gonorrhoeae, quum symptomata inflammatoria valde essent mitia. Fama Opii, tamquam remedii antisiphylitici tunc primum Londinum attigerat, statimque secum proposuit Doct. Saunders hujus remedii vires tentare. Aeger huic scopo convenienter cepit gr. j. Opii puri hora somni, forma pilulae, Dosis gr. i. qualibet nocte auxit, donec dosis esset gr. xij. Jussit simul Medicus, ut ulcera Venerea frequenter lavarentur Tinct. Thebaica.

Succellus ultra omnem expectationem respondit. Intra decem dies ulcera venerea perfecte erant sanata, usumque Opii omisit post adhibitionem ipsius per 14. dies. Singulare est, quod largae hae Opii doses parum vel nullum effectum soporiferum vel pulsus mutationem producerent.

Casus XXIV. In femina, in qua aderat siphylis cum eruptione cutanea maligna magnam produxit symptomatum imminutionem, quamvis non omnis plane eruptio post Opii diurnam adhibitionem evanuerit.

Casus XXV. In largis faucium ulceribus cum insigni dolore datum Opium, sensim ascendendo a gr. j. ad xvi. de die, junctum lotioni ulcerum cum Tinct. Thebaica, plenariam produxit curam.

§. VIII. Exp. Pearson nosocomii casibus venereis destinati, dicti the Locke-hospital, Chirurgus saepe hoc remedium tentavit, sed frustra, quum autem sibi proposuit experimenta publici juris facere in 2. volumine communicationum Medicarum societatis Medicae Londinensis, hic ea inferere non fuit visum.

§. IX. Expert. White, valetudinarium Londinensis Chirurgus (the London Dispensary) nuper mihi literis consignavit, se adhibuisse Opium in variis casibus venereis optimo cum successu. Inter alios binos refert casus.

Casus XXVI. Unum, in quo aderant faucium et tonsillarum ulcera, quae curabantur unice Opio, absque ut alia adhiberentur medicamenta, nisi aliquando purgantia.

Casus XXVII. Alterum, in quo aderant ulcera venerea in labiis pudendi, Opium unice, externe et interne adhibitum morbum sanavit, quamvis non adeo brevi temporis spatio, quo Mercurius ordinario haec ulcera sanare solet.

Ab altera parte observat, saepius voto curam non respondisse, imo et malum aggravatum fuisse post Opii adhibitionem. Considerat itaque Opium non tanquam specificum, sed ut remedium auxilium Mercurii egregium in plurimis morbis venereis.

§. X. In caeteris Angliae partibus nonnulli Medici hanc etiam praxin recentiore periculis subjecerunt, et inter alios in civitate Liverpool Vir Clariss. Withering noso-

comii hujus Medicus varia instituit experimenta cum Opio in lue venerea; verum omnium, quae scio, experimentorum maxime successu destituta. Adfirmat quippe in pluribus casibus Opium ulcera venerea sanasse, sed tantum apparenter, ita ut post aliquod tempus magis in corpus fureret venenum. Imo *) cuidam amicorum narravit, se quater hoc modo aegrum curasse, ita ut toties etiam rediret morbus, quo eo tempore adhucdum laborabat. Considerat ergo Opium in hocce morbo, tanquam remedium fallax et pallians.

§. XI. Enumeratis aliorum circa Opii efficaciam experimentis, reliquum est, ut videamus, quid in nosocomio Edinenſi Regio praestiterit in lue. Doleo autem, quod nostri casus non absolute sint conclusivi, quum demum D. Culeno oborta sit opportunitas Opium tentandi mense Aprili ultimo, quando demum venerei in nosocomio decumbentes ipsius curae committebantur. Ignoscas itaque quaeso, L. B. si casus tantum proponam, utut hodie iunt, quamvis omnes aegri nondum ad pristinam redierint sanitatem.

Casus XXVIII. An. Forbes, aetatis 22. April. d. 4. 1785. admissa.

In variis corporis partibus adsunt lata ulcera venerea, quae nonnunquam evacuant materiam adeo acrem, ut excoriationes et inflammationem partium vicinarum producat, laboravit per tres menses gonorrhoea, sed nulla alia topica adfectione genitalium: conquesta est saepius de tussi severa, speciatim tempore noctis, quae somnum tollit. Pulsus est 100 minuti spatio: alvus est regularis. Per sex menses laboravit amenorrhoea.

Utatur Iul. Mucil. urgente tussi.

Habeat Opii puri gr. i fl. hora somni.

6. Habeat Opii puri gr. iiij. hor. somni.

9. R̄. Opii puri gr. ij.

Sap. Hisp.

Aloes socot. ana gr. j.

m. f. pil. et F. h. m. singulatim n. xx.

*) Ornatissimo Juveni L. L. van Meurs, Med. Stud. qui haec mecum literis nuper communicavit.

capiat unam sexta quaque hora.

Habeat lagenam cerevisiae tenuis de die.

11. Tussis et alia symptomata sunt mitiora post
usum pilularum. Alvus est regularis.

Cap^t. pil. unam 4^{ta} quaque hora.

15. Ulcera plane sanata sunt, alia symptomata etiam
sunt laudatiora.

R̄. Opii puri ℥j.

Sap. Hisp.

Aloës Socot. ā. gr. vj.

F. massa. divid. in pilul. n. vj.

Cap^t. pil. j. 4^{ta} quavis hora.

16. Sumat cras mane Pulv. Rad. Jalap. ℥j.

18. Purgans debitum produxit effectum.

Omit. Pil. ex Opio.

R̄. Sap. Hisp.

Micae pan. āā. gr. ij.

Aloës Socot. gr. j.

Syr. Simpl. q. s. ut F. pil.

F. hoc modo n. xii. cap. pil. i. 4^{ta} quaque hora.

22. Dicit pilulas a ventriculo ferri non posse, produ-
centes quippe frequentem nauseam.

Omitt. pil. ex Sap. Hisp.

Rep. pilulae ex Opio.

25. Pilulae iterum a ventriculo bene feruntur.

Cont. Pilul.

27. Nauseat Pilulas, earumque tantum binas vel qua-
tuor de die sumit. Ulcera antiqua sanata sunt:
nonnulla nova circa nates sese ostenderunt paucis
abhinc diebus.

Cont. Pilul.

Maji.

4. Ulcera, quae nuper apparuerunt jam videntur
puriora.

Cont. Pilul.

10. Aliqua adest nausea et tumor ulceris alae sinistrae
nasi: ulcera circa femora apparent pejora; alvus est
naturalis.

Applic. ulc. nas. bis. in die paux.

Ung. e lapid. Calaminari

℞. aq. Fontis.

— Cinam. ana ℥iij.

Spir. Vol. Aromat.

— Corn. Cerv. ana ℥ij.

— Syr. Simpl. ℥ss.

Cap^t. ℥ss. vel ℥j. urg. lang. vel flatu ventriculi.

22. Novae nonnullae ulcerationes apparuerunt circa femora et manus: antiqua ulcera melius sese habent.

Cont. Pilulae.

Junii.

1. Ulcerationes sanantur.

6. Omnes plane ulcerationes evanuerunt.

14. Dimissa est perfecte curata.

Haec aegra saepius morbum venereum passa erat, et ab eo antea Mercurio curata, ulcera saepius etiam, quando fumebat Mercurium, recrudescere solebant, donec plenarie erant sanata: eodem fere modo ac in nostro casu illud cum Opio accidit. Nulla aderat mutatio vel in pulsu, vel in appetitu, vel in somni statu. Per longum satis tempus inscia fuit novi hujus remedii, donec admonebatur experimenta in se ipsa institui, recusavit fumere tantum pilularum numerum, quod tamen persuasione Medici deinceps fecit. Omnis adhibita est cura ne Mercurium caperet nobis inscijs, per octiduum remansit in nosocomio post plenariam omnium ulcerum sanationem.

Casus XXIX. C. B. aet. 36. In nosocomium admissa erat mense Octobris ultimo, laborans ulceribus largis depauperantibus circa pudenda et nates, quae usu Mercurii curata erant circa initium mensis Decembris: post horum curationem ulcus iterum sese ostendit in utroque nasi latere, et post sex septimanas fauces ulceratae deprehendebantur. Die 5. Aprilis, ulceratio narium fere curata est, sed faucium permanet, producitque deglutationem difficilem, ita ut potus nonnunquam per nares redeat: plura jam non adsunt siphylitidis symptomata. Robur atque corporis vigor insigniter sunt infracta, atque corpus perquam est emaciatum.

adeſt appetitus proſtratio. Alvus et catamoenia ſunt uti in ſtatu naturali. Per binos menſes ultimos Mercurius non fuit adhibitus; ſed nunc adeſt ſalivatio ab adhibito antea unguento caeruleo. Jam per tres ſeptimanas decoctum Sarſaparillae non adjuſit, quod antea ad ℥j. de die capiebat, cum ſymptomatum levamine. Utitur victu animali quotidie pro prandio.

6. Applicetur Cataplasma emolliens circa fauces et renovetur 4^{ta} quaque hora.

R̄. Merc. Subl. corr. gr. ij.

Aq. Font. ℥v.

Solve accurate.

Utatur pro garg. ter quaterve in dies.

Habeat Opii puri gr. ij. h. f.

9. Contin. Med.

11. Dolor faucium augetur.

R̄. Opii puri gr. ij.

Sap. Hiſp. gr. j.

Aloës Socot. gr. i.

Fiat pilul. et fiant h. m. n. xii.

Cap^t. pil. j. 6^{ta} quavis hora.

14. Dolor faucium remittit: deglutitio non adeo moleſta.

Cap^t. pil. j. 4^{ta} quaque hora.

16. Alvus per triduum obſtipata fuit.

Sumat cras mane Pulv. Rad. Jalapp. ℥j.

18. Purgans binas produxit alvi deſiſitiones.

Rep. pilulae cum Opio.

20. Salivatio continuo durat: alvus eſt regularis.

Cont. pil. ex Opio.

26. Alvus eſt mollis: pilulae ſenſibilem effectum non producant.

Maji.

1. Salivatio perdurat adhucdum: vox valde rauca eſt, deglutitio eſt valde difficilis, quod debetur aucto doloꝛi faucium: ſumit regulariter pilulas: alvus eſt regularis.

Cont. pilul.

5. Utatur garg. emolliente 4^{ter} in die.

8. Fauces haud melius sese habent;
 Utatur garg. rosarum 3. de die.
 Omitt. garg. emoll. Cont. Pilul.

20. Sanantur ulcera.

26. Alvi depositiones 4. adfuerunt heri: ulcerationes
 in faucibus sanatae sunt.

Om. Pil. pro hac nocte.

Licet sanata fuerit, nondum dimissa fuit.

Casus XXX. M. (Miller act. 17. admissa d. 26.
 April.

Laborat Gonorrhoea, largo bubone in inguine dextro,
 et incipiente bubone in latere sinistro: labia pudendi in-
 signiter sunt tumida, speciatim dextrum, cujus magna pars
 ulceribus tecta est: nymphae et clitoris in eadem sunt con-
 ditione: quovis alio respectu sana est: ulcera venerea et go-
 norrhoea apparebant adhuc 5. hebdomades et non diu
 postea tumor inguinis dextri.

Fiat VS. ad ℥vj .

Cras mane f^t . Sal. Glaub. ℥j . ss . ex aq. fervent. ℥xij .
 part. vicibus.

28. Medicamentum bene operavit.

℞ . Tart. Emet. gr. vij.

aq. Font. ℥ . iv.

solve.

Cap^t . ℥j . quavis $\frac{1}{4}$ horae, donec evomat.

29. Emeticum vehementer operavit: bubo non adeo
 dolet, nec adeo durus est.

Cap^t . Pulv. Rad. Ipecac. ℥j . et

bibat Infus. flor. Chamaem. ad promovendum vo-
 mitum.

St . Opii puri gr. ij. h. S.

1. Maji. Dolor et tumor glandularum inguinalium
 sensibiliter imminuti sunt.

St . Pulv. Ipec. ℥j . et bibat Infus Cham. ad promov.
 vomit.

℞ . Opii puri ℥i .

Solve in aq. bull. ℥viiij .

Inserviat ad lavandas partes ulceratas.

3. Bene vomuit. Bubo decrefcit. Ulcera venerea fanari incipiunt.

Repet. Emet. Vefperi.

Cap^t. pil. 6^{ta}. quaque hora, ut praefcriptum pro Forbes. Cont. lotio.

8. Alvus paululum eft adftricta; naufea aliqua nonnunquam adefl.

Omitt. Pil. cras mane

Cap^t. Tincturae fennae Comp. ʒ. ſſ.

10. Naufea non amplius adefl: bubo lateris dextri decrefcit, finiftri augetur: alia fymptomata multo funt mitiora.

Hac nocte capt. pulv. Rad. Ipecac. gr. XV. pro emetico. Cras redeat ad ufum pilul. anodyn. Cont. folutio Opii.

15. Nulla poft pilularum adfumptionem adefl naufea: bubones decrefcunt; alvus eft regularis.

Cap^t. pil. 4^{ta}. quaque hora.

17. Aliquando adefl fomnolentia: alvus eft regularis.

Cont. Pilulae ex Opio.

23. Nullus ex Opio fenfibilis effectus percipi poteft, nifi poft prandium levis fomnolentia.

Cont. Pilul.

27. Omnia fymptomata multo mitiora funt; dicit fe bis evomiffie pilulas et naufea eſſe correptam.

Omitt. Pilul. per biduum.

cras mane Cap^t. fal. Glaub. ʒſſ.

ex aq. fervent. ℥. i. part. vicib.

1. Junii. Symptomata leviora funt: ulcera circa labia permanent.

Fiat folutio cum duplici Opio.

7. Ulcerationes feſe latius extendunt.

Laventur ulcera folut. faturnina; deinde utatur ung. faturnino.

Linquens nofocomium Gonorrhoea et bubones fanati erant, ulcera vero et excoriatio eodem fere in ftatu verfabantur, ac quando in nofocomium recipiebatur.

Cafus XXXI. B. R. aet. 20. admiſſa d. 12. Maji.

Mensis ab hinc tempore glandulae in inguine sinistro et capite femoris tumere incipiebant, et dolorem creare, quae symptomata gradatim increverunt. Jam insignis aderat tumor in inguine et in parte superiori femoris: in utroque facile fluctuatio percipi poterat. Incisione facta in tumore inferiori insignis quantitas materiae purulentae sanguini mixtae evacuabatur. In parte superiore duae parvae aperturae sese ostendebant, quae incisione facta dilatatae sunt. Cataplasma emolliens utrique est superpositum.

14. Rep. Catap. emolliens 2. in dies.

R̄. Opii puri gr. ij. h. f. et rep. cr. mane.

15. Capiat Opii puri gr. ij. 3. in die.

17. Capiat Opii puri gr. ij. 4^{ta} quaque hora.

11. Junii Aliqua somnolentia adfuit tempore matutino.

Hora 10. matutina pulsus erat 96 et plenus. Hora septima vespertina pulsus erat 102. plenus et mollis.

24. Ulcera apparebant puriora et ad sanationem disposita.

Casus XXXII. A. C. aet. 19. admissa d. 18. Maji.

Conqueritur de dolore intenso, procedente ab utroque genu ad malleolos, et a cubito ad carpum utrumque. Hi dolores exacerbantur post meridiem et lecti calore, sed mane mitissimi sunt; adsunt praeterea dolores lancinantes in regione maxillarum et temporum: amygdalae valde sunt ulceratae et velum atque uvula inflammata. In brachio dextro complures sunt papulae prurientes et valde dolosae post assumptionem liquorum spirituosorum. Parca adest evacuatio vaginae et multae excrescentiae fungosae et condylomata in regione labiorum et fossa naviculari. Saepius perpeffa fuit morbum venereum; sed quo jam laborat advenit mensis ab hinc spatio. Nulla adhibuit medicamenta.

R̄. Opii puri gr. ij. h. f.

20. Aliqua de die adest somnolentia.

Rep. pil.

22. Alvus adstricta est.

Cras mane sumat Sal. Glaub. ʒj.

25. Cap^t. Opii gr. ij. h. f. et rep^t. cras mane.

27. Heri aliquibus symptomatibus febrilibus 'adficie-
batur: vomitorium assumsit hoc mane, et nunc me-
lius sese habet. Pulsus et cutis naturalis sunt.

28. Redeat ad usum Opii mane et vespere ut antea.
Junii. 1. Dicit se valde esse soporosam mane, quae
aliquando somnolentia per totum diem durat.
Symptomata siphylitica multo sunt leviora. Gonorr-
rhæa aucta est.

Cap. Opii gr. j. solummodo mane et vespere.

Rx. Aq. Rosarum ℥iv.

Acet. destill. ℥ss.

Sacch. Saturn. ℥ss.

Solve: sign. Infus. adstring.

inj. ℥ss. in vag. 3. in d.

10. Gonorrhæa decrescit: aliqua adest dysuria per
3. dies.

Omitt. inject.

Rx. Olei Ricini ℥j.

Tinct. Senn. comp. ℥iiij.

M. F. haustus.

24. Quando pro ultima vice hanc foeminam vidi, do-
lores multo erant mitiores, ulcera in faucibus et ge-
nitalibus ad sanationem disposita, et Gonorrhæa
ferme cessabat.

§. XII. Edinburgi inter alios etiam remedium hocce
in lue confirmata tentavit Doct. Webster, M. D. et Chemiae
praelector, in aegra, quae incassum alia tentaverat reme-
dia; satis insignes etiam adhibuit Opii doses, quae saliva-
tionem producebant, eamque plenarie sanabant.

C A P U T III.

ANIMADVERSIONES CIRCA OPII VIM ANTISI- PHYELITICAM.

§. I. Prolatis jam ipsis casibus atque experimentis, me-
rito quaeritur, quidnam ex tanta experimentorum facto-
rumque diversitate circa usum Opii, ejusque operandi mo-
dum in variis luis venereae symptomatibus sit statuendum.

Si animum advertamus ad varios casus, in quibus Opium exhibetur, statim in cujusvis oculos non potest non incurrere, quod pro varia in diversis aegris indicatione, etiam vario scopo illud propinetur medicamentum; triplex autem mihi omnis haec varietas constitui commodo posse videtur, et ex triplici fonte ipsius operandi varia methodus explicari. Agit scilicet: 1. tanquam remedium mitigans et symptomata leniens. 2. Tanquam remedium primum, sed tantum vi sedante. 3. Tanquam remedium primum et antisiphiliticum.

§. II. Opium tanquam remedium leniens symptomata considerari debet in Gonorrhoea, Phymosi, Paraphymosi, Ischuria venerea, testium tumore, et bubonibus sympathicis, quum omnia haec symptomata sint tantum topicae adfectiones, quae non ex infectione massae humorum, sed ex irritatione virus venerei in cavo urethrae haerentis proficiunt. Opium ergo agit hic vi sua sedante, quia sensibilitatem hujus partis auctam diminuit, ita ut ad stimulum non adeo sit sensibilis, et sic per naturae et artis molimina dilui atque evacuari possit virus, absque ut stimulo noxam creet, vel eadem vi sedante productum spasmus referat ac solvit, atque sic aequabilem restituit humorum circulum.

§. III. Si casuum, quos exhibuimus, catalogum lustremus, plures inter eos inveniemus, in quibus Mercurii variae praeparationes per longum satis tempus fuerunt exhibitae, absque eo, ut luis symptomata et in specie ulcera venerea sanarentur, quae directe post adhibiti Opii quantitatem evanescebant, quaeritur, quomodo hic operetur Opium?

Credo quod facile hoc explicari possit, absque eo, ut Opio vim specificam antiveneream hisce in casibus adscribamus. Mercurius quippe vi specifica, sive illud faciat eliminando sive obtundendo, sive compositum innoxium cum veneno venereo constituendo, certe inefficax reddit venenum, sed simul nulla hic gaudet vi specifica ad sananda ulcera semel a viru producta, irritamentum tantum tollit

Mercuriis, sicque viribus naturae medicatricibus ansam praebet illud damnum refarciendi.

Quum autem merc. sit medicamentum valde efficax et stimulus, in constitutionibus sensilibus conditionem talem inducit fibrae muscolari, quae morbosa est et proprie nimia irritabilitas audit, qua fit, ut ulcera, propter nimiam vasorum irritabilitatem vi naturae sanari nequeant: opium autem vi sua sedante illam fibrae muscularis sensibilitatem tollit, ita ut ad conditionem naturalem reducta vi vitali, ulcus sanari possit. Hanc opinionem probant sequentia: pulsus, qui in hisce casibus est oppressus, debilis atque frequens, fit liberior, plenus et tardior, atque ad hanc pulsus mutationem adeo attendit Exp. Grant, ut eo usque dosim Opii augeat, donec pulsus celeritas atque debilitas sit sublata: dolor antea valde molestus decrescit et tandem plane cessat, placidus jam obrepit somnus: ulcera, quae antea stricta, marginibus callosis instructa et crispata erant, jam relaxata deprehunduntur, marginesque sese explicare incipiunt, plerumque loco ichoris bonam producunt materiem purulentam, et sese ad sanationem statim disponunt. Idem illud confirmant alia ulcera non venerea, quae propter partis nimiam irritabilitatem sanari nequibant, quae Opii solo usu curata sunt: ita aliquando Opium, teste Exp. Grant, ipsum pertinax oris carcinoma cicutae junctum, itemque ulcera sordida et diuturna crurum, sanavit. Hujus rei memorabile exemplum vidit exopt. amicus Doct. Wistar in homine, qui per biennium ulcere diuturno fungoso cruris laboraverat, jam vero ad nosocomium transferebatur tetanoplexus, quem ex levi alterius cruris vulnere contraxerat, propinatur Opium a gr. j. ad Dr. j. adscendendo, absque ut levaretur tetanus, sed ulcus, altero post Opii adhibitionem die jam circulum ostendebat, qui vulneris cicatrificationem praecedere solet, 5. die, quo homo occubuit, fere clausum deprehendebatur.

§. IV. Inter eos, quos tradidimus, casus dantur nonnulli, qui neque ad unum neque ad alterum genus referri possunt: scilicet, ubi Opio lues curata fuit absque Mercurii adhibitione, vel saltem absque usu talis quantitatis

huius specifici, quae cum aliquo fundamento censerī potest subegisse virus.

Difficillimum certe hic est determinare, qua ratione agat Opium, num vi sedante, num vero agat vi specifica antisiphylitica, eodem modo ac argentum vivum. Circa hanc rem varios consulens Medicos, qui Opium satis superque in morbo venereo examini subjecerunt, omnes dubios atque haesitantes inveni, confitentes se vidisse miros in casibus recentibus venereis Opii effectus, absque ut Mercurius adhibitus fuerit, sed tantum etiam his opponi observationum catalogum, in quibus usum non praestitit, ut plurimi valde de virtute specifica dubitent, imo omnes adhucdum plane iudicium suspendant, nec de hac quaestione decidere ament, priusquam iis observationibus repetitis maior lux affulgeat.

Ab altera tamen parte et illud observandum, quod facta negativa haud quaquam destruant factorum positivorum riteque probatorum veritatem. Viro ingenuo facta momentosa referenti omnino fides denegari nequit, inprimis cum tentamina nunnulla aliorum illa confirmant.

Nonnulla, quae refert Doct. Michaëlis, facta omnino videntur decisiva, eo magis, quod auctoritas Doct. Noodt aliorumque Medicorum ea confirmet. Imo Doct. Schöpf, vir ingenus et candidus, adfirmat, se ab eo inde tempore, quo Opium adhibuit, ne granulum quidem Mercurii in morbis venereis propinasse, et si casus nostros, atque Doct. Saunders oculo lustremus, magna certe oritur suspicio, dixerim fere probabilitas, revera Opium quadam gaudere vi virus venereum vel destruendi vel eliminandi.

§. V. Non tamen diffitendum, quod ab altera parte tot momentosa contra liberio rem Opii usum adferri possint argumenta, ut certe accuratum requirant examen, ad quod jam breviter sum transiturus.

I. Objici potest, quod *sanationes hae, quae Opii usum sequebantur, non probent Opii effectum antivenereum*, et certe multa ulcera, dolores nocturni etc. pro venereis saepe ha-

bentur, quae haudquaquam sunt venerea, et ex alia longe causa procedunt: dantur plurima symptomata venerea, quae, sola natura adjutrice, cessarunt per aliquod tempus; potus diluentes, lignorum decocta, diaeta nutriens, aliaque absque Mercurio non raro antiqua atque inveterata ulcera venerea sanarunt; sed ab altera parte subita est adeo haec mutatio in partem meliorem, ut omnino Opio adscribi debeat.

II. *Obstant tot casus, in quibus Opium non successit, ut hicce numerus certe multo sit major, quam eorum, in quibus sanationem produxit.* Multi certo et plurimi dantur, in quibus tanquam specificum, non produxit curam, imo in manu unius alios longe produxit effectus, quam in alterius manibus. Interim tamen illud verum, quod saepe et alia medicamenta in uno fallant subjecto, quae in altero efficacissimum constituunt remedium, imo quotidie a quovis Medico adhibentur: cicuta, aconitum, hyoscyamus, flammula Jovis, aliaque, quae immensus venenorum laudator Störckius commendavit, quamvis vix, ac ne vix quidem, nisi in ipsius Störckii manibus effectus desideratos praestiterint, quod tamen de Opio dici nequit.

III. Alii pravos Opii effectus urgent, *quod Opium producat effectus ipso morbo peiores: quod corpus huic remedio ita adsuescat, ut dein usus omitti nequeat: quod hic largae requirantur Opii doses, quae symptomata pessima producant, illudque Indorum (amokroepers) et Turcarum exemplo probant.* Posterius omnino haud inficias imus, revera somnolentiam, tremores manuum, diarrhaeam etc. producit, ita ut aliquando usus Opii continuari nequeat. Testantur autem simul omnes Medici hos effectus rarioribus esse annumerandos, et facile denuo tremores hosce, atque superstitem debilitatem sanari: nec reticendum, Chirurgum quemdam, qui hoc mecum communicavit, largas Opii doses dedisse Viro, morbo venereo laboranti, qui non diu post in febrem malignam cecidit, qua e medio fuit sublatus; licet tunc temporis nulla id genus febris in nosocomio grassaretur, ea propter Opio adscripsisse, quo autem jure equidem haud perspicio: imo et in nosocomio Sancti Bartholomaei subito

hominem fuisse mortuum, qui largas assumserat opii doses. Videntur autem siphylitici huic remedio haud adeo adfuescere, quam alii, ita ut dosis pro lubitu diminui possit absque eo, ut pravae inde observentur sequelae, vel somnus aliquo modo afficiatur, illudque variis exemplis comprobatum vidi.

IV. Omnium autem momentissima illa est obiectio, *quod sit tantum medicamentum pallians; quod non tollat morbum, sed tantum prohibeat vi sua narcotica et sedante, ne prae vos suos effectus in corpus virus venereum sortiatur.* Fateor, quod venenum diu, imo per annos, in corpore latere possit, absque eo, ut effectus producat: ulterior ergo observatio diuturna probare debet, utrum sit pallians, an vero revera destruat virus. Doct. Michaelis certe adfirmat priores aegros suos per elapsam jam annum bene se habere. Doct. autem Saunders, White, Cullen, alique de hoc adhucdum dubitant.

V. Denique dicunt nonnulli, *si jam probatum esset Opium, gaudere revera vi antivenerea, quid inde? An non remedium satis tutum habemus in Mercurio, prudenter adhibito?*

Haec obiectio, quamvis prima fronte videatur esse valde momentosa, fundamento tamen mihi omnino destituta esse videtur. Cortex Peruvianus optimum certe est febrifugum remedium, quare igitur Medici noctes insudant diesque ita immaniter, ut et aliud inveniant, quare in arnica, hippocastano, salice alba vim antifebrilem quaerunt, et revera detectam esse sibi persuadent, atque gratulantur?

Videmus certe multis in casibus, propter variam aegrotorum constitutionem vel idiosyncrasiam unicum remedium aliquando inefficax deprehendi, imo noxium, cum alterum ex eadem classe directe morbum sanat. Sed praeterea tantum abest, ut semper Mercurius morbum sanare, et a quovis remedium tale heroicum innocue ferri valeat, ut contra in constitutionibus valde sensibilibus quovis modo datus Mercurius vel directe molestam producat salivationem, vel diarrhaeam vires exaurientem, vel convulsiones horrendas.

In casibus, ubi scorbuto jungitur morbus venereus, Mercurius nunquam dari potest, et pessimos pedissequos habet effectus: scilicet cruentam salivationem, imo et ipsam mortem: in hocce casu eo magis convenit Opium, cum in Americano nosocomio Haslariensi nuper utilissimum etiam contra scorbutum deprehensum sit remedium.

§. VI. Haec itaque si pensitemus, jure concludi posse puto, Opium in variis casibus, utpote utilissimum remedium auxiliare se commendare et conducere in ulceribus ex lue quidem ortis, nunc vero non amplius venereis: denique etiam iis in casibus, ubi contraindicatur Mercurius vel illud specificum fallit, Opium tuto, sed prudenter, dari posse dosibus satis insignibus, absque ullo periculo.

VII.

DR. HERMANNI DIEDERICI REIMARI

DISSERTATIO

ANIMADVERSIONES QUASDAM

DE

OPII, PRAECIPUE IN FEBRIBUS,
USU, EXHIBENS.

LUGDUNI BATAVORUM,

1 7 8 4.

DISSERTATIO MEDICA

ANIMADVERSIONES QUASDAM, DE OPII,
PRAECIPUE IN FEBRIBUS, USU, EX-
HIBENS.

Legibus Academicis obtemperaturus, longe lateque thema pro dissertatione inaugurali quacsivi, donec tandem, studiorum tempore fere elapso, amicorum persuasu, ad regiones practicas animum advertens, hocce argumentum, ut materiam, a paucis adhuc tractatam, quae summi tamen momenti est, non sine diffidentia mihi sumserim. Ignoscat igitur L. B. si notiones non satis maturatas, ob experientiae ac iudicii practici tenuitatem, passim a me propositas reperiatur.

*If vain the toil,
You ought to blame the culture, not the soil.*

Medicamentum nostrum, opium genuinum, ex oriente nobis allatum, succus est inspissatus *Papaveris somniferi* (Linn.) Gummi resinam refert; frustulis majoribus extus rubrofuscam, subsplendentem, fractura intus viridescentem vel nigricantem, opacam, plasticam, digitis adhaerentem, odore narcotico, sapore acri amaricanti calidiusculo *).

Herculeus certe foret, augeoque ejus simillimus, labor, si omnes, vel tantum plurimos, de opii natura et usu auctores, vel perlustrare, vel breviter recenscere tentarem. Sufficiat inter plurimos annotare, cl. Young**), Tralles***), Alston****), Cullen †), ac Murray ††), qui duo posteriores,

*) Vide Petr. Jonas Bergius Mater. medic. ex regno vegetabili.

**) George Young treatise on opium.

***) Tralles Usus opii salubris ac noxius.

****) Alston materia medica.

†) Cullen Lectures on materia medica.

††) Murray Apparatus medicaminum.

concisione, nitida elegantia, nec tamen nimia brevitatem, caeteris facile palmam praeripiunt. Nec ego, cui ambobus uti praeceptoribus aestumatisimis licuit, hocce iudicium temere profero, sed ut vocem unanimum publici juris facio. Iam quoque usus huius medicamenti historiam optime protulere le Clerc *), Alston, ac Tralles. Hippocrati an jam notum fuit, dubitant, negare tamen non audent. Serapio empiricorum signifex, opium ut et hyoscyamum, (similis fere indolis medicamentum) externe, pro doloribus leniendis usurpavit. Galenus etsi timidus in exhibitione opii, theriacam tamen Andromachi, ex opio, aromaticis, numerosissimaque farragine confectam, ipse commendat. Arabes tunc, Rhazes, et Avicenna, opium ut validum aestimarunt medicamentum. Revivificatis dein scientiis, Theophrastus Paracelsus, liberiori ejus in morbis propinatione, timores aliquantulum dispulit; Helmontiumque discipulum, praeconem ejus forsan nimis partialem praestitit. Boerhaave et ejus discipuli, opium summa cum cautela adhibere, dum Stahliani, eorumque affectae, ejus usum quam maxime damnare; etsi Sydenham Anglorum Hippocrates, id brevi antea tempore, inter prima medicinae numeraret instrumenta, quem postea Young, Mead, Pringle, Whytt, Lind, alique secuti, saepissime illud in praxi adhibuere.

Antequam vero de usu, ac exhibitione huius medicamenti, aliquid proferre audeam, necesse est primum, ejus effectus in corpus humanum considerare, ne oculis quasi occoecatis iter ingrediamur. Varii hic medici, prout vel chemici, vel mechanici fuere, opii operationem, suis explicare tentarunt principiis, ac hypothesebus. Chemici igne opium, sicut plurima alia medicamenta, torquere violentiore; hacque methodo, virtutes ejus ex intimis quasi naturae secretis, eruere conati sunt. Nec melius proficere, leniorem viam incedendo, simplici que solutione, ac moderata digestionem tractando; varius enim, variis experimentorum exitus. Neumann **) plus resinosi, Alston plus gummosi,

*) Le Clerc Histoire de medecine.

**) Vide Neumanns Chemie.

in opio inveniri dicunt *): Alston ex opii crudi unciiis duodecim, quinque materiae gummosae, quatuor resinae, ac tres magnatis uncias obtinuit, quod nec in aqua, nec in spiritu vini solubile, aquae superficiem, ut massa spumosa, pinguis, ac graveolens tenebat. Exhalat autem, in omnibus hisce operationibus, efficacissima pars, sub forma vaporis maxime graveolentis; nec hucusque seorsim servari potuit, etsi aqua, ac spiritus vini, leni igne peracta destillatione, illam secum rapiant, effectusque opii tunc exferant. Jam quoque recentis tantum opii manipulatio, testante Cl. Lorry, mentis excitavit emotionem, semihorae somno dissipatam. Huicce autem quasi spiritui rectori, maximas ejus virtutes deberi, et coctione, et torrefactione producta inertia, demonstrat. Uncia enim dimidia opii, per triginta sex horas cocta, grana duodecim ponderis, cum illisque, testante Büchnero, omnes fere perdidit vires.

Alii Opium cum corporis humani fluidis miscuere, suntque, qui inde sanguinem solvi putarunt, dum alii potius inspissari, observasse autumant; differt autem quam maxime, sanguis extra vasa mortuus, a latice illo vivo, corporis ima penetralia pervadente, cumque solidis vivis sympathizante **). Experientia tali quoque contradicit effectui,

*) Gummosi, ac resinosi respectiva quantitas, ubi combinata sunt, quam difficillime chemia determinantur; gummi enim ope, magna resinae quantitas in aqua solubilis redditur, ac spiritus vini, resinae juncti, gummi sat largam excipit portionem, quam solam respuit.

**) Sanguinem non esse fluidum mortuum, sed vera vitalitate praeditum, primus cl. Io. Hunter, chirurgus londinensis, contendere ausus est. Coagulatur, dicit ill. vir, certis sub conditionibus, in corpore vivo, in vasa viventia, sanguinem per id ipsum coagulum propellentia; quod auditoribus, dum praelectionibus suis adessem, duobus forsan simili non gaudentibus praeparatis, demonstravit. Primum est, injectio thrombi, in arteriae cruralis apri, transversim sectae orificio fere contracto. In secundo, post ob morbum testiculi, cum haematocoele conjunctum, peractam castrationem, testiculum injectione replevit, et tunc vasa duo minutissima, in duo sanguinis, in tunica vaginali coagula, intrantia, materiaque injectionis repleta, nobis cum illo perspicere licuit. Sympathizat sanguis cum solidis, sicque respectu necessitatis, saepe vel serius, vel citius, coagulatur; quod cl. Hewson,

in corpore vivo, cl. enim Lettsom, sanguinem sanissimum, e venis foeminae, quae per multos annos laudano utebatur liquido, profilientem vidit. Alii eadem methodo, eximiam in opio vim, experimentis probarunt, adesse antisepticam; inter quos cl. Pringle secutus, novissime eminuit, Jo. de Haes *) qui hoc fundamento innixus, usum ejus in variolis defendit. Lis tamen adhuc inter medicos agitur maxima, an remedia sic dicta antiseptica, plus in corpus vi sua polleant stimulante, an potius solum antiseptice agant. Priorem nuper cl. Millman **) opinionem, argumentis certe validissimis, stabilire conatus est; quibus et ex hujus medicamenti historia, subitae putrefactionis corporum, opii nimis larga dosi enecatorum, casus addi possunt.

Nec plus valent experimenta, de opio in venas injecto, dum blanda mucilago, in haec vasa injecta, jam nimii stimuli effectus edit, aerque atmosphaericus, in venas injectus, animalibus semper mortem infert. Whytt quoque experimentis demonstravit, et corde exempto, opium suas vires in systema exferere posse ***), subiti quod et effectus, ex eo probant, antequam enim aliquid absorptum esse, putare possumus, jam virtutes apparent.

Omittamus autem haec, aliaque experimenta similiter ad certam conclusionem inepta, consideratisque muta-

plurimis probavit experimentis, quorum aliqua, a cl. Loder ac me, anno praeterito Rothomagii repetita, similes nobis monstrarunt evenus. Stimulis afficitur, vitalitate enim subito exhausta, cum solidis consimilem subit alterationem, sic in animalibus omnibus fulgure necatis, et in hominibus subita ac vehementi animi passione extinctis, non coagulatur. Quod et accidere dicitur, ubi nimia dosi opii mortem infert! Nec fluiditas, ut argumentum contra vitalitatem valere potest, observationibus enim microscopicis constat, sanguinis particulas rubras, vesiculas esse organisatas, cerebrumque in infantibus semper fluidum, quod tamen vita carere non potest.

*) In Dissertat. Inaugurali, Trajecti ad Rhenum 1783.

**) Millman on the Scurvy, Lond. 1782.

***) Experimenta cl. Whytt ac Monro in animalibus instituta, alias inconclusiva, dum uti jam Haller monet, nimia vis animalibus, ante applicationem opii illata, causam effectuum dubiam reddit.

tionibus, post opii ingestionem in corpore vivo se prodentibus, explicationem quorundam postea tentemus.

Post opium assumptum, pulsus oritur frequentia, cum calore corporis, vultusque rubore, mens hilaritatis sensu afficitur gratissimo, veraque oritur magnanimitas, corpus ad omnia munera aptius apparet, imaginatio fervet, fereque semper jucundissima sibi met fingit phantasmata, paucis exceptis, ubi contrarium accidit. Dum haec phaenomena, per aliquod temporis spatium adfuere, sensus imperfecti evadere, imaginatio decipere incipiunt; deliriumque oritur, cum intoxicatione, ubi sensus fere evanescunt, desinens in stuporem, ac somnum, durante quo, pulsu saepius crebro ac pleno, aliquando tamen parvo ac tardo; transpiratio plus minus, ad sudorem usque, augetur, aliis excretionibus, praesertim alvina, imminutis. Expergefacto corpore, nisi aliis sustentetur stimulis, languor, debilitas, morositas, frigorisque sensus, accedunt.

Defectus autem adsunt immedicabiles, in hac effectuum enumeratione, generaliter enim abstracta, non potest quin, in omnibus casibus, justam nobis non praebeat imaginem. Variant nempe mirifice effectus, secundum status corporis, vel morbo, vel idiosyncrasia, vel consuetudine, diversos. In quibusdam serenitas ante pulsus incrementum, statim fere post ingestum opium, in aliis huic medicamento jam assuetis, post horae fere spatium, pulsu jam insigniter aucto, apparet. In prioribus, pulsus durante somno plenior, quam in his, ubi longius quoque durant effectus stimulantibus. In aliis, ob morbum spastice retenta materia eliminatur, dum alias, aliae, excepto sudore, excretiones compescuntur. Willisius sic ac Berger opio vim tribuere diureticam. Variant eodem modo, mutationes in corpore, secundum diversitatem doseos, minorem enim dosin, nec sequitur somnus, nec languor; dum largiorem, e contrario, in non assuetis, somnolentia fere statim, absque insigni alacritatis sensu praegresso succedit, nec semper nimis largam dosin sudor comitatur.

Serie hac phaenomenon rite perpensa, duo quasi potestates contrariae nobis statim primo intuitu sese objiciunt, stimulans nempe, ac sedativa, seorsim mox tractandae.

Unicuique eodem tempore, maxima quaedam ante oculos versabitur analogia, inter vini ac opii effectus, quae dum ex eorum actione in nervos oriantur, difficillime explicatu.

Veteres dum soporiferis omnibus frigidam tribuerunt naturam, opium in quarto, et ultimo gradu, frigidum enuntiarunt, inde omnes illae imaginariae correctiones, stimulantium validissimorum adjectione, cujus erroris, Theriaca, Democratisque, ac Mithridati confectiones, exempla stupenda, in neotericorum pharmacopoeis, sparsim adhuc existunt. His autem si auctoritatibus bellarem, virorum illustrissimorum sententias opponere possem, Helmont jam opium naturae esse calidae asseruit. Pitcairn ejus granum unum, granis sexaginta salis volatilis cornu cervi aequivalere dicit. Sydenham, Boerhaave, Young, Tralles, ac Tissot, omnes opio vires adscripsere stimulantibus ac cardiacas. Et quamvis cl. Ludwig hanc opinionem amplecti noluerit, illudque in fine debilitare contendat, opium tamen, aequo jure quo vinum, nomine cardiaci gaudere posse, confiteatur *).

Externe cuti admotum, medicamentum nostrum vesicatorii fere ad instar agit, ori amarum se praebet, moxque in lingua ac palato calorem excitat, per quadrantem fere horae durantem, cum aucto salivae fluxu. Nares irritat, ac sternutationem creat. Ingesto, vis cardiaca patet, et frequentia pulsus, ac alacritate insequente, cujus rei testem habemus, inter alios fide dignissimum, cl. Haller, qui in se ipso, opio assumpto, ex octoginta ad centum ictus, observavit ascendere pulsus. Inter Orientales, ubi religio vini usum prohibuit, opio easdem gratas in se producant mutationes, et Alpinus de Aegyptis commemorat, illo carentes, loco ejus, vinum creticum, piperi, aliisque aromatibus nuptum, assumere. Sydenham, aegrotis, pulsu vix micante, Laudanum suum, ut cardiacum fere unicum propinavit. Young nimia ambulatione defessus, Laudanum assumpsit, et quamvis per totam fere somno carebat noctem, tamen tranquillissimam vitae suae vocat. Idem illud, brevi ante chirurgicam commendat operationem, non tali dosi, ut sensibilitatem quodammodo tollat, sed ut aeger magnanimus

*) Adversaria medico practica vol. I. pars III.

evadat *). Vim autem opii cardiacam, imprimis probare videtur, ejus a cl. Pott in gangraena senili propinatio, ubi tali cum fructu adhibitum fuit, ut specifici nomen fere mereri putaret, quod etiam, cl. du Pui, in nosocomio Enkhufano, feliciter successit. Non solum enim vis vitae restauratur, sed quasi renovatur, et augetur, sexagenarios enim, jam diu effoetos, ad veneris praelia aptos reddidit rursus, unde hoc remedium, a plurimis et inter aphrodisiaca numeratur, qua virtute, ut stimulant, sicut et vinum, moderata dosi ingestum, equidem gaudet, priapismum tamen, in turcis semimortuis, potius inter spastica numerandum censeo symptomata. Virtute enim directe aphrodisiaca polle-
re, contradicere videtur, Laudani summo cum fructu in pollutionibus nocturnis exhibitio, remedium, quod cl. Hunter, maximopere commendat. — Inter Belgas quoque, cl. Stinstra, in Dysenteria putrida, Laudanum summa cum euphoria exhibuit. Opii igitur viribus stimulantibus, supra memoratis, extra omne fere dubium positis, ex subitis ejus effectibus, inter stimulantia quam citissime diffusilia, primum quoque fere gradum, occupare videtur, quod in non assuetis quam maxime patet, opii enim pillula, saepe fere statim vomitu rejecta fuit, mutationibus expectatis jam productis.

Ut autem nostrum exferat medicamentum effectus suos stimulant, dosi adhibendum est parva, id est tali, quam postquam medicinae vires deferbuere, non insignis sequitur languor, alias enim sedativa apparet vis. Quam difficillime autem haec dosi determinanda, dum non solum aetas, consuetudo, sed et status corporis particulares, (qualis verbi gratia in typho occurrit), qui majorem multo stimuli quantitatem ferre possint, quam sanus, considerandi **). Sic cl. Pott, aegrotis suis, grana duo opii, bis vel

*) Cardiacam hic opii vim prodesse, casus quoque ill. Richter, praeceptoris quam maxime colendi, probare videtur, qui post extractam vetulae cataractam, illam summo cum terrore, ex spiritu frumenti aliquantulum intoxicatam vidit, optimo tamen cum curationis exitu.

**) Edinae, in typho libras tres vini lusitanici rubri intra nycthemeron, ab aegris, spirituosius minime addictis, summa cum euphoria assumpsit, vidi.

ter de die propinavit, doses, quae singulae, in homine sano, somnum cicerent. Maxime autem hoc patet in tetano, ubi incredibiles doses, sine somno infecuto, datae fuere. Cl. Hunter tetanico, grana duodecim opii, intra horam, absque vel somno, vel morbi diminutione apparente, exhibuit; dum interea, cephalalgia, rubor faciei, ac oculorum, leveque delirium, doses augmentum vetuere *). Lue quoque venerea, diras suas in corpore devastationes exserente, pulsus saepissime tardus, aegerque largiorem solito dosin opii ferre potest; unde hoc in morbo, ut stimulus, vires vitae, ad miasma vel ejiciendum, vel alterandum, idoneas reddens, curam effecisse autumo. Mercurii enim quasi antidoti, actio specifica in miasma, jam a multis inter theorias recensetur explosas, vique ejus stimulantem plurimum tribuitur. Mihi quoque, inter alia, exemplum luis confirmatae, lauta, ac tamen regulari diaeta sanatae, ex ore amici, fide dignissimi, excipere accidit.

Consideratis sic obiter viribus opii cardiacis, ad sedativos ejus ordo nos ducit effectus, sedare autem, non solum ab omnibus uno fere ore contenditur, sed et luce meridiana clarius, ex phaenomenon enarratione apparet.

Patefacit se vis sedativa, primo functionum animalium imminutione, sensus enim ac saepe motus voluntarii organa imperfecta evadunt, donec ex hisce vitiis, aliquando ortum delirium, in somnum desinit. Doloris lenimen, omnium opii effectuum gratissimus, ac motuum abnormium sedatio, huic vi tribuendi, ut et excretionum omnium, excepta transpiratione, imminutio. Pulsus parvus autem, ac lentus, ejus actionem aliquando sequens, (immo fibras cordis debilitans vocatum fuit remedium), ut et languor, ac debilitas immo aliquando mors insequens, ad hujus potestatis, in functiones vitales effectus, referenda **). Sed et externe applicatum vires exserere potest sedativas: saepe in gonorrhoea chordata, optimo cum fructu, in cataplasmate adhibitum vidi, stranguriamque, ex solutionis saturatoris

*) Hunter in praelectionibus.

**) Probant quoque experimenta cl. Monro, ac Rob. Whytt, in ranis instituta, quibus vim opii cardiacam destruere studuerunt.

corrosivi sublimati, ob gonorrhoeam benignam, injectione; Laudano liquido, glandi ac urethrae cursu illinito, magico quasi modo, intra horae spatium sublatam, observare licuit. In ophthalmia scrophulosa, Laudani guttas tres vel quatuor, oculo instillatas, inter remedia efficacissima merito censer, autopsia suadet. Summo quoque cum levamine, in scirrho dolorifico prostratae, indeque stranguria quadam orta spastica, opium sub forma clysmatis propinavi, qua methodo, et in cancro uteri dolentissimo, immo in cataplasmate, ulceribus nimis irritabilibus ipsis, eodem cum eventu, adhibitum fuit.

Ubi efficere ut opium vires suas exferat sedativas cupimus, largiori dosi ingeramus oportet, alias enim cardiaci supra memorati sequuntur effectus; et hic quidem observandum, dosin quoad aetates, hic optime sic determinari, ut cum viginti Laudani guttas adulto, tum junioribus, quot annos habeant, tot guttas exhibeamus.

Difficillime certe, horum effectuum, tam diversorum, ratio reddenda, vel enim duae vires directe contrariae, in hocce medicamento existere credendum; vel una vis, pro causa effectuum alterius, quae tunc evanescit, agnoscenda, Prior positio absurditate evidentissima laborare videtur, calidum enim ac frigidum, humidum ac siccum, sapidum ac insipidum, semel ac simul, in una eademque substantia, adesse posse, non magis sensui communi contrarium. Hac igitur rejecta opinione, adhuc manet quaestio, utra vis sit vera contrariorum effectuum causa? Et sunt quidem, qui corporis solito majorem actionem, non vi directe stimulant, sed reactioni, virium naturae medicatricium, adscribunt. Sedantes autem tunc necesse esset effectus primo se prode, paroxysmumque quasi febrilem oriri; quod tum hic observationi contrarium, et haec theoria oblivioni committenda; solaque quae superest explicatio, vim nempe stimulantem, causam quoque esse eorum phaenomenon, quae sedativae effectus vulgo censentur, amplectenda.

Onnem certe excitationem validam, et subitam corporis, fere semper sequitur potestatis nervosae collapsus quidam, ac saepe somnus, modum autem, et rationem, cur haec fiant, me cum plurimis, in arte medica ac me multo

peritioribus, ignorare, lubenter confiteor. An corporis, post certum tempus, respectu stimuli cujusdam applicati, excitabilitatem amissam? an consumptionem stimuli ipsius, actione; vel mitigationem ejus per liquores gastricos, adque stimulos leniores, nimis subitum inde transitum, pro causa agnoscere licet? — Nescio. Sufficiat experientia multifaria probari, stimulantia alia, nimis libere adhibita, sedativos quoque edere effectus; quod quidem quotidie in spiritu vini observamus. Aromatum recentiorum halitus, testante Boerhaave, soporem saepe inducit. Oleum animale, annuente Hofmanno, placidum creavit somnum; immo fluidum electricum, a neotericis, ut stimulans omnium maxime penetrans celerrimeque se diffundens, summo cum fructu in medicina adhibitum; nimio impetu applicatum, asphyxiam, mortemque ipsam, producere valet. Ex decocto tabaci nimis saturato, sub forma clysmatis contra ascarides adhibito, profundissimum soporem, mortisque periculum ortos esse, ex ore amici, fide dignissimi, accepi. In morbo quoque prostatico, supra memorato, opium semper per horae quadrantem, irritationem doloresque augebat, antequam sedativi effectus gratissimi apparuere.

Superfunt tamen adhuc phaenomena, quorum ratio requiri potest, et inter ea differentia eminet pulsum; nam ut supra jam dictum fuit, in non assuetis, durante somno creber ac fortis observatur, dum in assuetis, ac largiori dosi utentibus, debilis, ac tardus invenitur. In illis collapsus potestatis nervosae, quoad functiones animales, jam adesse videtur, dum opium absorptum, cor, et vasa sanguifera, ad majorem excitat actionem. In his, consuetudo opium minus in corpus efficax reddidit, ita ut collapsus in functionibus vitalibus, eodem tempore fere, ac in animalibus accidat. Forsitan quoque tunc, ut ex enarratione patere videtur, excitatio functionum animalium, ex vitalium excitatione pendet. In prioribus, sudor auctae sanguinis circulationi, dum in his si apparet, relaxationi vasorum extremorum tribuendus; pruritus autem cutis, ex diathesi phlogistica, in vasis cutaneis producta, pendere videtur.

Alvi obstipatio fere semper ex opio oritur, ob stimuli sufficientis, postquam vis ejus deferbuit, defectum, ac sudo-

rem comitantem. Idem autem, vino utentibus accideret, nisi acidum in vino, intestina postea stimularet; facillime quoque huic opii vitio medemur, leniorum laxantium, vel ehylinatum stimulantium, exhibitione. Nec diuretica, optimo cum fructu, medicamento nostro, ubi urinae secretionem cohibet, adjici posse, ullus dubito. Salivationis autem mercurialis nimiae imminutio, opii solutione aquosa, more gargarismatis adhibita, ex effectibus sedativis certe pendet.

Ventriculo quidem inimicum, pronunciavit cl. Tralles remedium nostrum, hoc tamen, non nisi nimia dosi propinatum, vel ubi obstructio alvi non soluta fuerit, accidere contendam; et sunt probati auctores, quos inter Kaempfer, qui illo assumpto, appetitum auctum, se observasse testantur. Nimie autem adhibitum, quam maxime, et ventriculo, et toti corpori nocere, minime negam; immo ex ore amicorum, qui in oriente medicinam per aliquod tempus exercuere, accipere mihi contigit, opii nimios amatores, similiter ac Bacchi sectatores, saepissime nervorum morbis, Hepatis obstructione, indeque hydrope laborare,

Ex supra memoratis, generales quasdam cautelas, in adhibitione opii observandas, eruere possumus; maxima imprimis circumspeditione opus est, dum opium ut sedativum, inflammatoriis in morbis propinamus; actione enim vasorum valida, impetuque sanguinis ac calore auctis, optimi quidam practici ejus usum repudiarunt; nec negari potest, medicamentum nostrum, topica determinatione, vel inflammatione, cum plethora, ac statu vere phlogistico corporis existente, plus damni, quam utilitatis attulisse. Experientia tamen quoque demonstrat, plurimos, ex antiquis receptis opinionibus, nimium contra ejus usum in inflammationibus invehere: cl. enim Chalmers, etsi praxi forsan nimis temeraria, in Carolina meridionali, pulvere Doveri sub ingressum morbi ingesto, peripneumonias, aliasque inflammationes, feliciter sustulit. Plethora autem sublata, ac aliis evacuationibus praemissis, optimo aliquando cum successu, ad symptomata levanda, in veris indolis phlogisticae morbis exhibetur. Huxham sic in pleuritide adhibuisse comme-

morat, inque nosocomio Edinensi, cum euphoria ita praescriptum vidi, in aegro vera pleuritide laborante.

Alia adhuc adest corporis conditio, exhibitioni opii contraria; illa nempe, ubi fordes adsunt in primis viis, earum enim evacuationem impediendo, irritabilitas in corpore augetur. Praemissis autem evacuantibus, non solum optimos in morbis edit effectus, sed et ex iis natos tumultus, optime sedabit; qua praxi Sydenham usus, post emesin vel alvi purgationem, fere semper Laudanum adhibuit. Necessitate quoque urgente, simul cum purgantibus adhiberi potest, compositio a plurimis summopere laudata, semperque sic alvus libera servanda.

Peculiaris opio quoque actio in organa bilis tributa, quam acriorem, ac magis putrescentem, ejus usu reddi, creditum fuit; dum ejus faustissimi, praemissis potubus blandis ac diluentibus, effectus in cholera, contrarium probare videntur, immo opii potestas antiseptica, bilem potius corrigere deberet.

Transeamus nunc, ad nostri medicamenti in febribus administrationem et usum; ac primo quidem intermittentibus breviter consideratis, ad continuas, maxime animum vertamus. Quinque autem ut puto modis, opium prodesse potest in intermittentibus, quos sigillatim breviter perpendere in animo est. Adhiberi scilicet potest,

I. *Ut stimulant ac cardiacum extra paroxysmum.* Stimulantia enim, post debitas evacuationes, intermittentes sistere posse usu innotuit. Theriacam, Riverius in tertianis rebellibus, venae sectione, ac purgantibus, ubi opus erat, praemissis, dosi drachmae unius, mane per triduum optimo cum effectū propinavit. Heuermann, intermittentes, calore praeternaturali, ac cephalalgia, etiam in apyrexia praesenti, opii grano uno, vel Laudano liquido, ad guttas viginti, alternis vel tertiis diebus vespere dato, dum corticem interea quoque praeberet, profligavit *). Viribus vitalibus fractis, hocce remedium plurimum convenire recte asserit, alias enim, in continuas mutari, vel inflammationes topicae accedere possunt. Amicus quoque fide dignissimus

*) Heuermanns Chirurgische Bemerkungen.

Goodwyn, tertianas rebelles, in comitatu Kent in Anglia, guttis quinque laudani, quovis bihorio exhibitis, fugavit.

2. *Ut stimulans incipiente frigore febrili.* Hoc modo a cl. Berryat, Laudanum in infuso centaurii minoris exhibitum *) fuit: imo cl. Hoffmann in febre soporosa, laudani guttis quadraginta quatuor, sub initio frigoris ingessit, pulsu majore, respiratione liberiore, ac paroxysmi febrilis suppressione, insequentibus. — Cl. Gregory, aliquando hanc opii administrationem succedere vidi, dum Laudani guttas triginta, et spiritus lavendulae compositi drachmam unam, ex aquae Menthae piperitidis Uncia una, incipiente frigore propinavit; quo medicamento, calorem solito mitiorem, ac citius finitum, sudor profusus excepit. Cortex tamen, aliaque medicamenta, quibus febris ante resistit, simul propinata fuere. Cl. Lind, dum infantibus opium ingerere non potuit, ingruente paroxysmo, tincturam thebaicam cum linimento saponaceo, dorsi spinae illinivit. Cavendum tamen, in hac administrationis methodo, ne opii dosis sit nimia, alias enim sedativos, hic funestos, exserere posset effectus; cujus exempla Eller, ac Morton protulere, ubi frigore febrili ingestum, apoplexia, vel coma secuta sunt.

3. *Ut sedativum, brevi post inchoatum calorem.* Hac methodo, primo, optimoque cum successu, a cl. Lind administratum fuit **), aquae fontanae sesquiunciam, aquae alexiteriae spirituosae, ac syrupi e meconio āā drachmas duas, cum laudani guttis quindecim, vel viginti, semihora post incoeptum calorem exhibuit. Calor hoc remedio minuitur, vel aufertur urentis sensus, sudorem efficit copiosorem solito, cum mollitie cutis, ac saepe recreantem procreat somnum. Hunc virum cl. Odier secutus, opium fausto cum eventu, et jam delirio praesente, exhibuit ***). Illustrissimus quoque Cullen, experientia permotus, huic methodo assentitur. Lind, infantibus, Syr. e meconio drachmas duas, extra vero paroxysmum, clysmata ex corticis extracto, ac laudani guttis aliquot, exhibuit, dum alvi dejectionem magnesia ciebat.

*) Vid. Memoires présentés à l'Acad. Roy. des Sciences T. 2,

**) Vid. Lind on the diseases of Europeans in hot climates.

***) Vid. Duncans Medical Commentaries vol. 6.

4. *Ut diaphoreticum, ante paroxysmum.* Optime hoc scopo aliis medicamentis adjungitur, quae actionem ejus, ad vasa cutis determinant. Sydenham pillulas cochiae majores, theriacam, ac aquam vitae, quatuor jam ante paroxysmum horis ingessit, sero lactis cerevisiato, sudoris post horas paroxysmi aliquot continuandi causa, simul adhibito, sicque intermittentes profligavit. Fordyce, intra paucos dies, quartanam biennem, pulvere Doveri, eodem modo exhibitto, sanavit.

5. *Ubi diarrhoea corticis efficaciam impedit.* Commemoratione hoc egere non videtur, dum diarrhoeam, non ex fordibus, sed ex nimia irritabilitate intestinorum ortam, intelligimus, cortexque opio junctus, fere semper facilius febres sistit; plurimique viri, opium cum cortice, ad vomitus, vel dolores in febribus assopios, feliciter adhibuere.

Antequam vero speciatim, de usu medicamenti nostri, in febribus continuis, ad quas nunc ordo nos ducit, loquamur, necesse est, objectiones quasdam contra illud factas remove. Illi enim, qui febrem, in solo humorum circuitu aucto, consistere credunt, vehementissime adversus hoc remedium solent declamare; quoniam dum sanguinis motum citatiorem reddit, febrem simul augere debeat. Practici autem nunc, et alia stimulantia, in ultimo continuarum studio, ubi vires deficiunt, summa cum utilitate adhibent; vinoque ipso, pulsum non solum plenior, sed et tardior reddit.

Alii opium, ut excretionem imminuens, ita et crises impediens medicamentum, repudiarunt, sed tamen jam cl. Young, in acme febrium, ubi aeger somno caret, cumque vires vitae deficiunt, illud quam maxime commendat; et casus sequens, ubi opii ingestionem, urina secuta est critica, contrarium probat *).

Will Sutherland, aetat. 21. miles 1781. Die 16to Novembr. post quam febrili contagioni se exposuisset, subito languore, frigore, nausea, cephalalgia, ac somnolentia

*) In aliis quoque casibus, ubi morbida corpus laborat irritabilitate, opium excretionem sanas, potius promovere, praxis docet; sic in colica pictonum, alvum solvit, inque partu difficili caute propinatum, dolores partus, ac expulsionem foetus promovet.

correptus, lectum ingressus, mox calorem solito sensit majorem, absque tamen sudore insequente. Die 17mo. post venesectionem, paullulum vesperi sudavit, et die 20mo. in nosocomium Edinense receptus est, quod tunc frequentabam. — Lingua illi tunc erat albida, ac humida, sitis modica, cutis mollis, alvus adstricta, pulsus 108 intr. minut. cl. Gregory sequentia parari curavit medicamenta. Capiat solutionis antimonialis unciam dimidiam quavis semihora, donec vomuerit, incip. statim.

Injiciatur enema commune vesperi: foveantur crura vesperi per horam, panno laneo, humido, calido. Incipiat cras mane fumere, corticis peruviani ʒj. quovis trihorio, ex lacte ebutyrato. Habeat julapii salini ʒj. quovis trihorio.

21mo. Nov. Ex solutione emesin ac dejectiones passus est. Paullulum somni per noctem habuit, pulsus 102, lingua et cutis ut heri. Repet. medta, excepta solutione et enemate. —

22mo. Somno per noctem, ac appetitu paullulum gaudere incipit, pulsus 108, alvus naturalis: contin. medta.

23mo. Bene dormivit, appetitus redit, dejectio alvina nulla. Lingua rubra sicca, injic. enema vesperi, fiat fustus per horas duas: contin. medta.

24to. Male dormivit, ac de anorexia conqueritur, enema respondit lingua rubra humida. — Omittatur cortex, repetatur julap. salinum, et fustus. Habeat haustum ex aq. Menth. ʒβ, et laudani liquidi guttis xxv hora somni.

25to. Bene dormivit, appetitus redit, puls. 108, lingua sicca, cutis calida, cont. medta.

26to. Bene dormivit, appetitus augetur, puls. 108, plenus ac mollis, alvus naturalis, levis in urina, mane ejecta, apparet nubecula.

17mo. P. 90. Cutis fere naturalis: contin. medicamenta, et habeat aquae cardiacae ttj. de die. —

28vo. Convalescit, urina hesternae, sedimentum copiosissimum dejecit.

4to Decembris. Diaetam accepit plenam, ac nono exivit sanatus.

Opiatum hoc in casu, non solum somnum inducendo, sed et spasmus in renibus solvendo, contra opinionem vulgarem, ad crisin perficiendam profuisse, videtur. Fetus autem calidi humidi, quam maximi in continuis usus sunt; aegrotum quietiorem reddunt, delirium compescunt, ac somnum inducunt; an spasmi cutis solutione? Applicatio tamen per horam, vel bihorium continuanda, alias effectum non praestant. —

Objectionibus igitur hisce remotis, quas in curatione continuarum indicationes implere, quibusque sub corporis conditionibus, iis aptum sit opium, considerare oportet; et hic prima, maximique ut nunc temporis censetur momenti indicatio occurrit; spasma nempe superficialis solutio. Et si autem hic spasmus, ut ex praegressis patet, saepissime optimo cum fructu, in febribus opio solutus fuerit; provide tamen, et circumspicte hic agendum erit; ac ubi plethora, vel fordium signa adsunt, evacuationes primum institutendae. Sydenham, in febre pestilentiali, statim post venae sectionem, nisi vomitione impediabatur, theriacae drachma dimidia, optimo cum eventu, sudorem excitavit; et ubi jam alia incassum adhibita fuere sudorifera. „Multi dicit, „me authore, in diaphoresin viginti quatuor horarum con- „jecti, et tantum abest, ut se exinde debiliores factos quererentur, quin potius, quantum humoris sudando discessisset, tantundem novi roboris sibi accrevisse profiterentur“ in alio tamen loco, ipse quoque, phrenitides, ac pleuritides, ex diaphoreticorum usu in febribus, ortas esse commemorat. Cautioris igitur practici est, hoc medicamentum, non nisi praemissa, vel venae sectione, vel intestinorum evacuatione, exhibere, et tunc pulverem Doveri, theriacae multum anteponendum esse, putare liceat; dum sal medius, et emeticum, in illo cum opio juncta, ejus vires stimulant minuant; haecque compositio, potentissimi sudoriferi nomen, non immerito gerit. Cavendum praeterea, ne calor corporis nimium augeatur, ne sudor sit partialis, vel inaequalis; neque nimis cito, vel frigore sistatur, per viginti quatuor enim fere horas, absque somno continuandus. For- san quoque, laxantia leniora, durante sudore agentia, hanc

methodum minus periculosam reddere possent. Simili quoque etsi tutiore modo, in principio typhi ex contagio, postquam medicamento antimoniali, vomitus, vel alvi dejectiones, producti fuere, laudani guttas xxv ingestas somnum placidum inducendo, celerem morbi et felicissimum exitum produxisse, aliquando videre contigit.

Insignis utilitatis esse potest medicamentum nostrum, nisi vel valida diathesis phlogistica, vel sordes tenaces motu difficiles, in primis vetant viis, ad delirium in febribus compescendum, somnumque placidum, ubi aeger illo eget, inducendum: et hic quidem, largior saepe opii dosis necessaria, dum minor somnum producere non valet, sed potius irritationem auget, cl. sic Lettsom deliria in putridis laudano fugavit, ad guttas xxv exhibito *) et cl. Fordyce, die 7ma febris miliaris, suadente Duncano, centum ac viginti guttis laudani, intra nycthemeron sumtis, delirium sistere ausus est, clarius autem ejus administrationis in tali casu methodus, ac utilitas, ex historia patebit sequenti.

Rahel Robertson puella aetat. 21 annor. die 19ma novembris 1781, languore, frigore, cum insequente calore, cephalalgia, ac artuum doloribus, correpta fuit; absque sudore comitante, die 26to, symptomatibus, exceptis doloribus, qui mitiores, continuantibus, in nosocomium Edinense recepta. Pulsus 96 intr. minut. cutis calida, lingua albida humida, cum siti tamen, alvus ac menses regulares fuere; nulla adhuc medicina ei adhibita erat. Nunc praescripta fuere. Habt solut. antimonialis unciam semis, omni semihora, donec vomuerit. Capiat julapii salini, ℥j quovis trihorio. Foveantur crura vesperi per horam unam, et habeat haust. anodyn. c. guttis xxv laudani hor. somni.

27. Solutio respond. Cutis humidiuscula, lingua sordida, male dormivit, pulsus 102. Capt. pulver. cortic. peruv. ℥ij. 4ter de die, repet. fots, et julap salin. et haust. cum guttis xxx.

28. Pulsus 84, cutis naturalis, bene dormivit, lingua est sicca cum anorexia, alvus adstricta: enema commune vesperi nisi prius dejecerit, repet. reliqua.

*) Vid. Medical Memoirs.

29. Pulsus 96. Bene dormivit, cutis naturalis, lingua obfessa, enema respond. Convalescentem se sentit. continentur medta.
30. Pulsus 96. Bene dormivit, anorexia, lingua obfessa: omittatur cortex, foveatur os aqua tepida cum lacte, et repet. subinde. Incipiat fumere \mathfrak{D} ji crystallor. tartari, quater de die: repet. reliqua.
1. Dec. Pulsus 96, mollis ac plenus, male dormivit cum delirio, lingua aspera dolens, anorexia, alvus naturalis. Habeat vini lusitanici rubri \mathfrak{Z} vjii, cum pari quantitate aquae font. in die: repet. reliqua.
2. Pulsus 96 debilis, male ac cum delirio dormivit, cutis sicca calida, lingua melior apparet, anorexia ac fitis, alvus adstricta. Repetat vinum ad \mathfrak{L} ss; cum \mathfrak{L} ss aquae de die: repet. crystall. tartari, habeat enema commune vespere nisi prius dejecerit. Foveantur crura per hor. unam, et habeat haust. anod. cum guttis xl hor. somn.
3. Pulsus 96. bene dormivit, cutis calida, lingua sicca, anorexia ac fitis ut antea, paullulum adhuc adest deliri: repet. medicamenta.
4. Pulsus 90. plenus ac mollis, lingua humida, sed dolens, bene dormivit, ac multo minus delirat: rep. medta.
5. Pulsus 80. mollis, delirium ac anorexia adhuc remanent, alias convalescit: rep. medta.
6. Pulsus naturalis, dormivit cum insomniis, etsi vigilans non delirat, sudor adest, alvus naturalis, appetitus et lingua melius se habent. Omittat. vinum ac haustus anod. rep. reliqua.
7. Convalescit: repet. medta.
14. De anaesthesia sed tamen absque paralyfi, in manu conqueritur sinistra. Adeat machinam electricam, et educantur scintillulae plurimae ex parte affecta.
17. Exit sana e nosocomio.

Principio, hoc in casu, guttas xxx laudani suffecisse, ad somnum producendum, hocque per tres dies valuisse,

apparet; donec vel medicamento consuetudo, vel status corporis, qui majores ferre posset stimulos, dosin largiorem, ad eosdem effectus producendos desiderasse videntur, quae et feliciter successit. Inprimis autem, ob cum colluvie gastrica conjunctum morbum, hujus medelae successus, omnem mereri videtur attentionem; demonstrat enim evacuationibus debitis institutis, opium aliquando cum successu adhiberi posse, dum cortex ipse absque his, febrem sistere non potuit, sordesque potius auxit. — Similes quoque observare licuit mihi casus, quos referre, tempus ac spatium ventunt. In quodam aegro delirante, guttas xxx laudani, vomitu rejectas, nil boni attulisse vidi, dum biduo post, guttae xl, non solum delirium removerunt, sed et cutim antea siccam, humidam reddidere. Determinatione quoque sanguinis versus caput, sanguisugis sublata, laudanum optimo cum effectū propinatum fuit. Diarrhoeam in febribus, ubi non est stercoracea, vel levamen affert, sed potius debilitat, opio saepe optime sisti posse, notum est, atque a plurimis practicis quotidie in usum vocatur.

Restat adhuc memorabilis indicatio, quam opio impleri posse contendimus; illa nempe, quae in ultimo continuarum stadio, cardiaca ac antiseptica postulat. Etsi enim raro adhuc medicamentum nostrum, in continuis hoc scopo adhibitum fuit, jam analogicus ejus Usus, in variolis, ac dysenteriiis putridis, plurima ex hoc remedio expectanda esse, promittit: cl. Young, ac Withers, illud hoc in casu commendant, immo posterior, vino ubi ob stomachi debilitatem facile ad acorem vergit, opium anteponi deberi recte concludit. Parvae opii doses hic adhibendae, sicque cl. Fordyce, in ultimo febrium stadio, optimo cum effectū, Londini, in nosocomio St. Thomae eo utitur, necesse est tamen hic, ut supra dictum fuit, doses, non ex pondere, vel mensura, sed ex effectibus aestimare; et minutas vel largas pro re nata dare, cl. enim Bruno, Edinae, largiores, opii quantitates, in ultimo typhi stadio, optimo cum effectū, stimulandi causa praebuit. Mithridatis confectio- nem, cum sale neutro, Londini, saepe fausto cum eventu, in hisce casibus, propinatum vidi, quae certe ex opio, principalem suam habet virtutem.

Exposui strictim praecipuas animadversiones ad thema' quod mihi sumsi, illustrandum pertinentes; voluissem melius; debuisssem plenius; sed res meae nunc longiorem non concedunt moram: nec tamen stilum ponere mihi licet, quin, omnibus Viris, ex quorum vel lectionibus, vel conversatione, in variis locis utilitatis fructus cepi; praecipue etiam cl. professoribus hujus academiae, qui suis institutionibus summam urbanitatem erga peregrinos jungunt, gratias agam quam maximas, et Lectoribus benevolis judicium huic poetae sententiae respondens expetam:

*Blame where you must, be candid where you can,
And be each critic, a goodnatur'd man.*

VIII.

DR. GUILIELMI CHRISTIANI PHILIPPI
CRAMER

DISSERTATIO

DE

LICHENE ISLANDICO.

ERLANGAE.

1780.



P R O O E M I U M.

Mente consilioque divino omnia in hoc mundo ad salutem omnium conservationemque admirabiliter administrari, sicut omni undique ratione, sic ex ea naturae benignitate concluditur, qua non solum tam multa ad vescendum, tam varia, tamque jucunda gignit; sed etiam, ut recte PLINIUS *), nusquam non remedia disponit homini; ita, ut medicamentorum salutarium plenissimae sint terrae **), et unaquaeque ea largiatur, quae morbis endemiis sanandis convenient. Quid — ut exemplo rem declarem — quid in regionibus, quas mare alluit, inprimis septentrionalibus; et in ipso mari inter nautas, frequentius scorbuto? Nullibi autem in maritimis frustra quaeruntur vegetabilia antiscorbutica. In ultima enim Spizberga, Cochlearia groenlandica LINN. et danica; in Islandia, officinalis; in Groenlandia, groenlandica, anglica et forsitan etiam officinalis; in Labradoria, danica; in Norwegiae, Sueciae, Daniae oris maritimis officinalis et danica, in Scotiae Angliaeque litore, utraque cum anglica; in Germaniae, Belgii et Galliae tractibus mari finitimis, haec et officinalis, quam in ipsum Camtschatcae litus usque provenire, *Flora sibirica* testis est, copiose nascuntur. Quibus Brassicam et Cramben maritimas pluresque alias plantas, aequae salutares, in regionibus mari vicinis et ad ipsum mare passim crescentes addere possemus. Terra magellanica, aliaeque antarcticae, Cardamine antiscorbutica abundant et Apio antarctico BANKSII, HAWKSWORTHII descriptione notis, quae, sicut inter tropicos Cocos nucifera et plures palmae, cum fructibus, tum gemmis, et praeterea tot aliae plantae acidulae amarae et aromaticae ad hunc morbum sanandum quasi destinatae videntur. — Pari providentia Lichenes, quos in septentrione aliis plantis copiosiores esse voluit, usui hominum ibidem habitantium aptavit summus hujus universi Conditor. Mirum quidem hoc quibusdam videri poterit, qui muscos, in quorum numero lichenes quoque vulgo habentur, inutiles

*) PLIN. *b. n. l. XXIV.*

**) Cic. *de nat. d. l. II. c. 53.*

nec attentione humana fatis dignos judicant. At mirari definerent, si semet a Botanicis edoceri paterentur: Lichenem fuciformem L. una cum Lichene Roccella, tinctoribus pigmentum praebere nobilissimum, nomine Orseille notum; quale etsi longe inferius, e Lichene Parello paratur; alios quoque Lichenes, ut calcarium, tartareum, saxatilem, vulpinum, pustulatum, alios, lanæ sericoque colorandis infervire; Lichenes plicatum et calicarem ad pulverem cyprium praeparandum aliquando fuisse adhibitos; Lichenem, rangiferinum, Tarandorum escam gratissimam, in pabulum pecudum hiemale a rusticis Norvegis colligi; Russos quosdam Sibiriae incolas, cerevisiae L. pulmonarium humuli loco addere; Turcas in Aegypto panem triticeum sapore ipsis grato imbuere L. prunastri, et furfuraceo; ut alios Lichenum usus taceam *). In septentrionalibus terris, perenni fere gelu rigentibus, frumenti proventus paucissimus vel nullus, nec aliorum vegetabilium esculentorum multo uberior est. Haud raro itaque fame periclitarentur incolae, nisi annonae penuriam aut defectum supplerent Lichenes, qui una cum Fucis salubres ipsis praebent dapes **). At haec nondum sufficiunt. Vulgares ibidem existunt morbi pectoris, maxime haemoptysis, pleuritis, peripneumonia et ex his enata phthisis pulmonalis. Sicut itaque alibi Lichenes aliqui medicamenta praebent, uti caninus in rabie canina, aphthosus in aphthis vermibusque, pyxidatus in tussi ferina, pulmonarius in ictero variisque aliis morbis; ita Groenlandi, haemoptoe correpti, vescantur lichene groenlandico *Fl. dan. tabb. 466 ***)*: Islandi autem, morbis pectoris, potissimum phthisi, laborantes, ad alium confugiunt, quo etiam frequenter aluntur, et qui, sive ut alimentum sive ut medicamentum consideretur, omnibus reliquis palmam praeripit, LICHENEM scilicet ISLANDICUM. Haec utilissima plantula non septentrionalium tantum, sed aliorum

*) Conf. b. LINNEI *diff. de usu muscorum in amoen. acad. tom. VII. p. 370. sqq.*

**) Lichene esculento PALL. *it. 3. tab. 1. fig. 4.* in campis Russiae asiaticae australis crescente, populi vitam nomadicam ibidem agentes, urgente necessitate interdum satiantur.

***) Vid. *buj. op. fasc. VIII. p. 8.*

quoque Medicorum attentione dignissima est, siquidem in Europa media et forsitan etiam australiori, perinde ac in septentrione crescit, et medicamentis praestantissimis annumerari meretur. Virtutes ejus, quas partim in PRAECEPTORUM ad cineres usque maximopere suspiciendorum scholis, partim etiam, sub Eorum auspicio, propria qualicumque experientia cognovi, tanta mentem admiratione impleverunt, ut diligentius eas expendere, et specimine, fumorum in Medicina honorum obtinendorum causa edendo, constituerim. — Non quidem me praeterit, esse qui modicas saltem vires ipsi concedere, vel omnem efficaciam denegare non verentur, experimenta praetexentes, quae successu caruerint. Sed inquirent, quaeso, antequam usum ejus damnent — nisi odium quoddam quorumcunque novorum pharmacorum, quod Medicum rationalem dedecere mihi quidem videtur, altius animis haereat infixum — anne morbi ingenium, perversus medicamenti usus, lichenis adhibiti corruptela quaedam, senio, humore nimio vel aliunde contracta, vel alia quaedam causa prosperum impedierit eventum. Equidem de praestanti hujus lichenis virtute medica experientia edoctus et ratione convictus, nihil cupio ardentius, quam ut hoc schediasmate usus ejusdem, in multorum aegrorum emolumentum, quodammodo promoveatur. Placido autem illud Eruditorum examini etiam atque etiam commendo, Eosque, ut memores sint, juveniles esse conatus, quos offero, obnixè oro rogoque.

§. I.

D E S C R I P T I O.

Antequam ipsas lichenis islandici virtutes exponere aggrediar, formam externam hujus vegetabilis exacte describere convenit.

RADIX ipsi est nulla, nisi imam frondium extremitatem obtusam et rubello colore tinctam, ita appellare placeat, quibus terrae, lapidibus aliisque muscis inhaeret.

FRONDES trium vel quatuor digitorum transversorum altitudine, passim inter se coalitae, erectae vel adscendentes, lineares, sed latiusculae, pinnatifido laciniatae, integerrimae quidem, at margine setis seu spinulis rigidis parallelis obtusiusculis, modo densius, modo rarius ciliatae, utrinque glabrae, coloris e viridi pallido fuscescentis, subtus pallidioris, maculis serobiculisque quasi polliniferis conspersae, plerumque canaliculatae et saepe marginibus hinc inde connatae, siccae rigida et fragiles, madefactae molles et gelatinam referentes. *Latiniae* a se invicem remotae, breves, alternae, passim etiam oppositae, adscendentes, dichotomae: lacinulis divergentibus, obtusis.

SCUTELLA rarius frondibus latioribus minus divisus versus summum apicem innascuntur, ita ut apicem marginemve nulli attingant, magna, orbiculata, concava, glabra, margine elevato granuloso-crispo cincta, subtus rugulosa.

Differt itaque a reliquis Lichenibus *solo natali semper terrestri, frondibus erectis, basi rubris, laciniatis, margine spinulis ciliato*, ut recte exc. WEBERUS, Professor Kiloniensis celeberrimus, in *Spicil. Fl. Goett. p. 237.* pronunciat.

Variat hic lichen frondibus latioribus humilioribusque, modo augustioribus et plerumque procerioribus; colore in aliis magis pallido ad viridem inclinante, in aliis magis ad fuscum seu potius castaneum vergente. Illustris SCHREBERUS, praeceptor et factor summo pietatis studio colendus, ad thermas Carolinas Lichenem islandicum legit, pagina frondium superiore laete viridem, inferiore albidiorē; hic spinulis paucioribus ciliatus est, non tamen iis plane caret.

Aliam varietatem e Groenlandia allatam *Idem* mihi monstravit, quae frondibus differt latissimis, in lacinulas admodum parvas divisas, ita ut pene crispae appareant; margine fere toto calva, in quo hinc inde tantum una vel altera setula conspicitur. In Europa haec, quantum novi, extra Islandiam nondum lecta fuit.

Omnes istae varietates virtute non differunt, et perinde est, utram ad usus medicos adhibeas.

§. II.

SYNONYMA. ICONES.

Nomina quae Lichen islandicus a variis auctoribus accepit, sequentia sunt:

Muscus quidam crispae lactucae similis, minor et per ambitus leniter aculeatus, cespite latiusculo diffusus.
CORD. *silv. obs.* p. 221.

Pulmonariae alterum terrestre genus. CAM. *epit.* p. 783.
f. 2. bon. hist. l. 4. c. 57. *f. 2. b.*

Muscus catharticus. BORRICH. *act. hafn.* 1671 - 2. p. 126. *Descr. br. f. ic.* SIEB. *Scot. illustr.* p. 39. *descr. Borrich.*

Muscus pulmonarius terrestris sanguineus. BREYN. *eph. N. C. an.* 3. pag. 439. *descr. br. ic. bon.*

Muscus islandicus Bartholini. RAI. *hist.* I. p. 114. *descr. Borrich.*

Coralloides cornua damae referens. TOURN. *inst.* p. 565.
Muscus islandicus purgans Bartholin. RAI. *syn.* 2. *app.* p. 333. *hist.* 3. p. 30. *descr. breviss.*

Musco-fungus terrestris, superne cinereus, islandicus.
MORIS. *hist.* 3. p. 632. *descr. Borr.*

Lichen terrestris pinetorum rigidus, foliorum eryngii aemulus, basi purpurascente, substantia ad fuscum vergente. RUPP. *jen.* I. p. 349. 2. p. 297. 3. p. 375. *nom.*

Lichen terrestris foliis eryngii. BUXB. *cent.* 2. p. 11. *tab.* 6. *f. 1. descr. et ic. mal.*

Lichen — angustifolius, spinis tenuissimis ad margines ornatus — MICH. *gen.* p. 85. *tab.* 44. *f. 4. cum scutellis.* SEGV. *veron.* I. p. 58. n. 10.

Lichen foliis oblongis laciniatis, marginibus conniventibus ciliatis. LINN. *fl. lapp.* p. 339. n. 445. HALL. *enum.* p. 75.

Lichenoides rigidum, eryngii folia referens. RAI. *syn.* 3. p. 77. n. 90. DILL. *hist. musc.* p. 209. tab. 28. f. III.

Lichen (*islandicus*) foliaceus adscendens laciniatus, marginibus elevatis ciliatis. LINN. *fl. suec.* I. n. 959. 2. n. 1085. *mat. med.* I. n. 493. 3. n. 537. *sp. pl.* I. p. 1145. 2. p. 1611. LEYS. *fl. hal.* n. 207. GORT. *ingr.* p. 174. GERARD. *gallopr.* p. 29. HUDS. *angl.* I. p. 448. 2. p. 559. GUNNER *norv.* I. n. 425. POLLICH. *palat.* n. 1107. d. b.

Lichen fronde convexa ciliata pustulata obtuse ramosa utrinque levi, ramulis brevissime bicornibus. HALL. *hist.* 3. p. 82. n. 1978. *nomencl.* p. 180.

Lichen islandicus. OED. *fl. dan.* tab. 155. *egreg.* SCOP. *ann.* 2. p. 107. *carn.* 2. n. 1385. WEIS *goetting.* p. 68. BLACKW. *herb. Cent. VI.* tab. 599. f. I. 2. 3. WEBER. *goett.* p. 237. BERG. *mat. med.* n. 537. p. 855.

Lichen (*islandicus*) fronde erectiuscula laxa margine ciliata, scutellis subrotundis terminalibus planis. NECK. *meth. musc.* p. 109.

Nomen islandicum est *Fiallagraus*, danicum *Fiællgræs* i. e. planta rupestris. In Norvegia appellatur *Hedegræs*, *Hedemose*, sicut in Svecia *Hedemossa* i. e. muscus ericetorum. Germanico nomine proprio huc usque caruit; *isländischer Lichen*, *isländisches Moos* nuper appellari coepit.

Varietas frondibus angustioribus est

Lichenoides eryngii folia referens, tenuioribus et crispioribus foliis, Celsii. DILL. *hist. musc.* p. 212. tab. 28. fig. 112.

Haec apud Islandos nomen *Kloungur* fert.

Coralloides fruticuli specie fuscum spinosum DILL. *hist. musc.* p. 112. tab. 17. f. 31. quod b. a. LINNE varietatem lichenis islandici facit, distincta est species, nempe Lichen aculeatus SCHREB. *Spicil.* p. 125. WEBER. p. 207.

Icones lichenis islandici plures exstant, Camerariana, quam CONRADUS GESNERUS iam ligno incidi curaverat, Breyniana, Buxbaumiana, Micheliana, Dilleniana, Oede-

riana et quae in Blackwelliani herbarii appendice reperitur. Inter has duae ultimae praestantissimae sunt, tum Dillenii icon, in qua tamen scutella non satis bene repraesentantur. Figura Michellii operi inserta magis pulchra est quam accurata, Buxbaumiana omnino mala.

§. III.

PATRIA. TEMPUS COLLIGENDI.

Hunc lichenem in septentrionalibus orbis terrarum regionibus provenire, jam supra dictum est. In Islandia, quae insula nomen ipsi dedit, copiose provenit et ad usus infra enarrandos frequenter adhibetur. Abundat vero etiam in Spizberga, Groenlandia, Scotia, Anglia, Norvegia, Svecia, Finlandia, Russia, Sibiria. Germaniae non quidem omnes, variae tamen provinciae illum proferunt; circulus Franconicus eo non caret, in monte sic dicto pinifero enim copiose et circa Erlangam passim crescit. Notari meretur, primum cui innotuit, Botanicum, CORDUM *), inter Suetachium et Lauffam, adeoque in vicinia nostra illum reperisse. In his terris, solo sterili sabuloso et lapidoso, modo sub umbra filvarum acerosarum, modo sub dio, innascitur. In regionibus australioribus, nempe Austria, Tyroli, Helvetia, Gallia australi et Italia superiore montes incolit altiores ipsasque Alpes.

Quod ad *tempus*, quo colligi debet, attinet, toto quidem anno, sicut alii lichenes, quaerentibus obvius et ad usus tam medicos quam oeconomicos aptus est; commodius tamen post pluviam vel tempestate humida legitur, quam sicca, qua frondes arescunt, facile franguntur, et legentium manus laedunt, aegriusque a lichenibus adhaerentibus separantur. Apud Islandos aestivae noctes huic messi destinatae sunt. In eundem campum non nisi tertio anno elapso revertuntur, lichenem hunc intra triennium adulescere persuasi **). — Collectus ab adhaerentibus heterogeneis sordibusque purgari et statim leniter ficcari debet.

*) *Obs. sylv. p. 221.*

**) *Vid. des Vice-Lavmand EGGERT OLAFSENS und des Landphysici BJARNE FOVELSENS reise durch Island, Lips. 1774. part. I. p. 85.*

§. IV.

ODOR. SAVOR.

Equidem nullum in lichene islandico percipere possum odorem, nisi fungosum illum, quem cum reliquis lichenibus communem habet. Decoctum aquosum odore decoctum florum Acaciae fere refert; decoctum autem lacteum odorem minus fragrantem praebet.

Sapor lichenis islandici masticati praeter specificum lichenum saporem, amarus est. Amarities autem plurimae in decoctum aquosum transit: oleosae vero lactis particulae amaras lichenis magis involvunt; hinc decoctum lacteum, gustui minus ingratum est aquoso.

§. V.

DIACRISIS CHEMICA.

DECOCTUM. EXTRACTUM AQUOSUM PRIMUM; RESINOSUM SECUNDUM LICHENIS ISLANDICI.

Expositis, quae sensuum adminiculo in lichene islandico inveniuntur, ad mixtionem eius progredior, quam experimentis chemicis, quantum fieri potuit, accurate institutis, eruere annisus sum. Facta sunt in laboratorio CL. FRISCHMANNI, Pharmacopoei Erlangensis meritissimi, et ob insignem in Pharmaceuticis, chemicis et historia naturalis scientiam omni laude et honore dignissimi, cujus opem in hisce laboribus magnopere mihi profuisse grata mente profiteor.

Ante omnia experiri oportuit, numquid aqua communis frigida, et quidnam, e substantia lichenis educere valeat? an forte ejus ope substantiae amylaceae, aut glutinosae quidquam exinde elui possit? quae e farina variorum seminum lavando facile obtinentur *). Exigua quidem erat spes, fore ut hac ratione partes quaedam separentur; cum

*) Vid. praeter experimenta cl. BECCARII in *comm. Bonon. t. I. p. II. p. 122.* recensita, KESSELMAIERI *dissert. de quorund. veget. princip. nutriente*, in cl. WITTWERI *delect. diss. Argentorat. vol. I. p. 100.* cl. MALOVIN in *Schauplaz der Künste tom. VIII. p. 188.* cl. SAGE *analyse des blés, Parisiis 1776.*

aqua pura, licheni sicco adfusa, pelluciditatem non amittat. Hoc tamen non obstante, lichenis islandici, in subtilissimum pulverem redacti, unciam dimidiam aqua communi destillata frigida humectavimus, et aliquot horis elapsis in mortario puro diu et continuo trituvimus, aquae quantitatem per vices augendo usque dum octo unciarum pondus aequaret. Haec trituratione per aliquod tempus continuata, sensim turbulenta fiebat minusque fluida; tandem, lichenis reliquiis separatis seponebatur. Flocculi minutissimi, in hoc liquore suspensi, tardissime fundum petebant; quo facto sedimentum exsiccabatur, quod massam consistentiae fere corneae nigricantem, in superficie pulverulentam et cineream, fitebat, grana sex pendentem. Liquor percolatus evaporatione erogavit extracti mucilaginei fuscescentis, satis tenacis et subdulcis grana decem. Chartae ad colandum adhibitae pondus granis triginta et octo auctum deprehendebatur. — Lichen residuus, antea siccatus, aceto destillato nunc humectabatur *), tum, adfusa aqua, denuo trituvabatur, quae evaporatione similem supra descriptae massam reddebat, ponderis granorum septemdecim, acetum olentem. Lichenis quod supererat, pendebat drachmas duas cum scrupulis duobus granisque totidem. — Pulvis supra commemoratus, massae corneae adhaerens, nihil aliud esse videtur quam molecule lichenis trituratione abrasae; microscopio enim examinatus scobem lichenis subtilissimam omnino refert; nec ipsa haec massa alius indolis esse videtur. Amylaceae itaque partes nullae, nec glutinosae aliquae in lichene islandico detegi potuerunt. — Ad alia igitur experimenta transeo.

Lichenis islandici, ab omnibus sordibus purgati et concisi uncias quatuor in aquae destillatae simplicis libris circiter viginti quatuor, successive adfusus, per horas circiter sex coximus. Decoctum percolatum, et continuo evaporatum, usque dum duae circiter librae aquae superessent, deinde loco frigido sepositum, post refrigerium gelatinam, vel potius cruorem e vena missum et coagulatum referebat. Sapor ei erat amaricans et color e rubicundo cinereo-albicans.

*) Rationem hujus experimenti exhibet §. XII. dissertationis cl.

KESSELMAIERI, l. c. p. 110.

Sequenti die inspissatio continuabatur ignis gradu lenissimo, ut ne empyreumate liquor inquinaretur. Ad aquam omnem, quantum fieri posset, abigendam, ut partium extractivarum pondus eo accuratius determinari posset, plus quam pilularis massae consistentia requisivisset, crassamentum inspissabatur, tandemque in cribro super fornace adhuc magis exsiccabatur. Hoc modo extractum nanciscebamur e flavo-virescente fuscum, scammonio smyrnaeo simile, amaroris fere expers et pene insipidum, acredine tamen aliqua non plane carens, quod uncias duas et totidem scrupulos pendebat. Colatorium, quod purum drachmas novem aequaverat, facta percolatione exsiccatum easdem scrupulo superabat. Totius itaque extracti aquosi primi, e lichenis IV. unciis educti, pondus ad uncias II. et scrupulos III. facile adscendere colligitur.

Portioni lichenis ab extractione residuae, unciam unam cum drachmis sex pendenti, adfudimus spiritus vini rectificatissimi libram unam. Digestione et destillatione facta liquorem leni iterum igne inspissare coepimus, quo tempore gustatus peramarus erat, quem saporem evaporatione continuata, adhuc intensiorem fieri observabamus. Liquorem jam spissiusculum in patella murrhina lenissimo igne — ut ne empyreumaticus fieret — ad ficcitatem fere redeimus. Extractum resinofum secundum, ita collectum, colore cum aquoso primo fere conveniebat, nisi quod paullo magis fuscum esset, sapore amaricante, subadstringente, nauseoso, odore rancido. Pondus ejus erat granorum viginti et octo; grana octo circiter adhuc in patella haerebant, non facile abradenda. Colatorium drachmas novem, grana viginti et tria pendebat, quae superioribus addita, pondus totius hujus extracti dant unius circiter drachmae. Residuum ponderatum unciam unam cum drachmis quinque totidemque granis aequabat.

§. VI.

TINCTURA. EXTRACTUM RESINOSUM PRIMUM;
AQUOSUM SECUNDUM.

Ad haec rite paranda eandem lichenis islandici quantitatem recepimus, scilicet uncias quatuor, quibus spiritus

vini rectificatissimi uncias octodecim affudimus et e retorta destillavimus usque ad residuam quartam partem. Spiritus destillando abstractus plane nullam subierat mutationem. Color tincturae fuit olivaceus. Colaturam, affusis sedecim unciis aquae destillatae simplicis, leni igne evaporavimus, atque extracti drachmas duas et scrupulos duos obtinuimus. Colatorium ponderis fuit ante extractionem drachmarum novem; extractione autem facta, drachmarum decem. Residuum hujus extracti spirituosum pondus habuit unciarum trium cum dimidia et drachmae semis. Color similis ac in extracto resinoso secundo, odor idem, sed sapor minus amarus. Extractum spirituosum secundum itaque, si amarius medicamentum desideres, primo longe est praeferendum; utpote quod partes mucilaginosas multas continet, quibus inertius redditur, quas autem extractio, aquae ope instituta, plerasque aufert, et spiritui puriorem resinam relinquit solvendam. Partis remanentis unciae tres cum dimidia et drachma dimidia in aqua destillata recoctae colabantur, et colatura evaporatione eandem ob causam, quam §. V. commemoravi, ultra consistentiam massae pilularis inspissabatur. Extractum colore ab aquoso primo parum vel nihil discrepans, insipidum fere et inodorum, pondere unciam unam et drachmas quinque, colatorium autem drachmas novem et scrupulos duos aequabat. Totius itaque extracti aquosi secundi pondus unciarum duarum cum unico scrupulo fuit. Supererat, peracta hac extractione, recrementorum uncia una cum drachmis septem ac duobus scrupulis.

His observationibus confirmatur, quod experientiss. ZIEGLERUS in diss. *de digestore Papini* refert, lichenem islandicum tam aquosum, quam spirituosum extractum, aquosum autem spirituosum copiosius, erogare *).

§. VII.

EXPERIMENTA CUM LICHENE PULMONARIO FACTA.
DECOCTUM. EXTRACTUM AQUOSUM PRIMUM, RESINOSUM SECUNDUM.

Quamquam species ejusdem generis, indole quoque convenire soleant et facultatibus; tanta tamen nonnumquam

*) *Spec. phys. chem. de digestore Papin. Basil. 1779. p. 55.*

observatur differentia, ut promiscue sibi substitui nequeant. Differentia igitur illa diligentissime diquirenda est, ne imprudenti substitutione aegrotis plus noceamus quam profimus. Quoniam a longo tempore PULMONARIA ARBOREA, seu LICHEN PULMONARIUS LINN. in nostris officinis venalis prostat, et in quibusdam morbis eodem modo, quo islandicus, adhibetur; consilium cepi, experimenta quaedam chemica cum eo instituere, ut comparatione utriusque appareat, utrum promiscue adhiberi sibi que omnino substitui queant. Hac mente lichenis pulmonarii, ab adhaerentibus bryis hypnisque mundificati ac concisi, uncias quatuor in aqua destillata coximus, et accepimus extracti aquosi primi, fusci, salivam colore brunneo ad rubellum nonnihil inclinante tingentis, amariusculi parumque acris, drachmas sex cum scrupulis duobus. Colatorium ponderis fuit ante extractionem drachmarum novem cum dimidia, post autem drachmarum decem. Residuum pendit unciam unam et semis cum drachma dimidia; ex eo conficiebatur extracti resinosi secundi fusci, saporis amariantis et acriusculi, odoris nonnihil nauseosi, rancidi, drachma una, residuo postea unciam unam cum dimidia pendente. Huic licheni particulae mucilaginosae non tanta copia insunt quam licheni islandico. Utrumque igitur extractum sine metu ut ab igne odorem et saporem empyrevmaticum conciperet, ad consistentiam massae pilularum inspissare potuimus.

§. VIII.

LICHENIS PULMONARIJ TINCTURA. EXTRACTUM RESINOSUM PRIMUM; AQUOSUM SECUNDUM.

In his praeparandis eadem quantitas lichenis pulmonarii cum spiritu vini rectificatissimo digesta et destillata, extracti resinosi unciam dimidiam erogavit, quod colore, sapore et odore resinosum secundum imitabatur, nisi quod amarius esset. E parte residua, drachmas tredecim cum dimidia pendente, obtinuimus extracti aquosi secundi drachmam unam et scrupulum dimidium. Hoc colore ab aquoso primo parum discrepabat, nec fere plus sapore, nisi quod

minus amarum, sed potius fere acidulum esset. Deinde residui pondus fuit unciae unius et dimidia.

§. IX.

EXPERIMENTA CUM LICHENE RANGIFERINO INSTITUTA.

EXTRACTUM RESINOSUM ET AQUOSUM PRIMUM.

Absoluta Pulmonariae arboreae docimasia, animum subiit cupido experiundi, quaenam partes mixtionem notissimi illius LICHENIS RANGIFERINI LINN. ingrediantur, quo, ut supra retuli, tarandi vescuntur, qui hominibus etiam esculentus videtur, quemque Cl. FABRICIUS *) in mensis rusticorum Norvegorum, loco panis corticei apponi vult. Duplex a. b. LINNEO **) statuitur varietas: *alpestris*, quae Coralloides montanum, fruticuli specie, ubique candicans DILL. *hist. musc. p. 107. tab. 16. fig. 29.* rangiferorum potior esca; et *silvaticus*, Coralloides fruticuli specie candicans, corniculis rufescentibus DILL. *l. c. p. 110. tab. ead. f. 30.* quo apud nos cervi hientali tempore nutriri solent. Hujus, utpote cujus solius quantitatem ad experimenta sufficientem obtinere potuimus, uncias quatuor eadem methodo, qua extracta spirituosa supra commemorata parabantur, tractavimus, et nacti sumus extracti resinosi primi drachmas duas cum granis octo. Tinctura colorem referebat straminis immaturi, sapor autem erat debilis. Extractum fusco-virescens ab initio acidulum, post exiguam moram acredine linguam urebat nihilo fere minore, ac Polygonum Hydropiper LINN. Totidem unciae in aqua destillata coctae, colatae et inspissatae praebuerunt extracti aquosi primi fusci, aciduli et acriusculi, deinde adstringentis, drachmas tres.

§. X.

EFFECTUS SOLUTIONIS VITRIOLI FERRI INFUSIS HORUM LICHENUM INSTILLATI.

Oportuit quoque, lichenes haecenus dictos aqua infundere et quomodo infusum a solutione vitrioli ferrei instillata mutetur, explorare.

*) *Reise nach Norwegen p. 206.*

**) *Sp. pl. p. 1620. 1621.*

Infusum *lichenis islandici* aqua destillata calida paratum, addita solutione vitrioli ferri induebat colorem e rubro badiū, magis tamen rubrum quam badiū.

Infusum *lichenis pulmonarii* a vitriolo martis colorem badiū ad pallide lividum vergentem nanciscebatur. Diu dubius haesi, an hoc experimentum cum infuso lichenis pulmonarii instituerem, nec ne. Dubitari enim posse videbatur, utrum mutatio coloris a vitriolo ferreo inducta, licheni ipsi et soli tribuenda esset, anne ad eandem producendam quercuum succus aliquid conferret, quibus lichen pulmonarius saepissime innascitur, unde etiam is, qui in pharmacopoliis venit, plerumque collectus est.

Infusum *lichenis rangiferini silvatici*, additis aliquot guttis vitrioli martis aqua soluti, versicolor, mustum ex rubris et albis uvis confectum referebat.

Observavi tamen, omnia haec infusa cum vitriolo martis diversum exhibere colorem, pro diversa radiorum incidentium refractione.

§. XI.

LICHENIS ISLANDICI AQUA DESTILLATA; OLEUM EMPYREVMATICUM.

ZIEGLERUS, v. cl. supra §. VI. laudatus, lichenem islandicum inter ea vegetabilia refert, quorum partes quaedam destillatione in vas recipiens transeunt. Nec immerito. Libra enim dimidia ejus incisi, additis aquae destillatae libris duodecim, in vesica cuprea stanno obducta per viginti quatuor horas digerebatur, et deinde destillabantur aquae librae octo pond. civ. quae odore et sapore debilissime acidulo et acriusculo jusculum tenue refert, in quo Morchellae *) elixatae fuerunt.

Eadem quantitas lichenis islandici destillabatur e retorta terrea, igne aperto gradatim aucto, commissuris lutō probe obturatis. Quae in excipulum transierant, pondus habebant unciarum quinque drachmarum septem et scrupuli unius: carbonēs autem vel residuum destillationis un-

*) Elvela lamina gyrofa, sub inaequalis pileoli forma deorsum late et fimbriatim expansa. GIEDITSCH, *meth. fung.* p. 39. n. 2.

ciarum duarum et scrupuli unius. Postquam illud aliquantisper loco frigido steterat, ope infundibuli separavimus oleum a reliquo liquore, quod ponderis fuit drachmarum duarum et scrupuli unius, et odorem talem sparsit, qualent spiritus lignorum reddere solet.

§. XII.

SAL ALCALI FIXUM. TERRA.

Lichenis islandici a fordibus et arena purificati libra dimidia, in lamina ferrea pura accendebatur. Magnam edebat flammam cum crepitu, non aliter ac si nitro scateret. Cinerum collegimus drachmam unam et grana quinquaginta quinque. Horum quartam partem adhuc constituebant carbonēs: immittebantur itaque crucibulo, et in igne satis vehementi per duas continuas horas detinebantur. Sic carbonēs quidem, superficiei proximi, in cineres abibant; at in fundo crucibuli multi supererant incombusti, quos etiam in cineres convertere oportebat. Totam itaque cineris et carbonum miscelam in patella ustulatoria, sub furni docimastici fornice, igni violentiori exponebamus; quo facto intra spatium horae omnes carbonum reliquiae evanescebant. Cinis, nunc purus, pondere scrupulos quatuor et grana quinque aequans, in aqua destillata coquebatur et post filtrationem et evaporationem salis alcali impuri grana dabat duo. Perillustri DELIUS, fautor ac praeceptor aeternae venerandus idem sal e lichene nostro majori copia obtinuit *).

Terrae post elixiviatum sal alcali residuae, cujus colore carneo cinerascerebat, adfudimus aquae destillatae unciam unam et dimidiam, deinde acidum nitri instillavimus, quod terram cum effervescentia solvebat, et calcis nitratae seu phosphori sic dicti Balduini producebat drachmam dimidiam, coloris carnei ad cinereum declinantis. Acido vitriolico phosphoro isti Balduini, adhuc soluto, instillato statim precipitabatur omnis terra sub forma selenitis, manifesto indicio, eam vere calcariam fuisse.

Lixivio sanguinis eidem calcis nitratae solutioni instillato, color illico apparuit eleganter caeruleus. Terra,

*) Diss. de *Acetiope vegetabili*, p. XXI.

unde acidum nitri particulas calcarias extraxerat, finita earum solutione, ut partium solubilium nihil remaneret, in eodem acido cocta, in duas partes dividebatur, quarum alteri acidum vitrioli, alteri salis communis superfundebatur. His deinde lixivio sanguinis instillato, idem color caeruleus induebatur, et brevi tempore elapso, sicut in solutione supra dicta, caeruleum berolinense pulcherrimum in fundo collectum conspiciebatur. Hinc terram metallicam ferri in lichene islandico latere facile colligitur.

Omnibus quotquot solvi poterant particulis solutis, restabat terra insolubilis partim grossior, quae nihil aliud quam arena vulgaris erat, partim subtilior, filiceae indolis. Ambae ea proportionem sibi invicem permixtae deprehendebantur ut 6 ad 14.

Obtinentur itaque e libra lichenis islandici combustionem:

Salis alcali fixi	gr. 4.
Terrae calcariae circiter	112.
Arenae, fere	15.
Terrae insolubilis filiceae, fere	34.
et terrae metallicae ferri exigua portio.	

Dubitari potest, utrum terra martialis lichenis islandici mixtionem semper ingrediatur? an in eo tantum haereat, quem solum marte foetum (eisenschüßig) produxit et aqua martialibus particulis scatens subinde inundavit. Non dissiteor, lichenem quem ad experimenta supra recensita adhibui, in tractu, ubi ferro facile inquinari potuit, fuisse lectum. Nihilo tamen secius terra martialis elementum esse videtur, quo lichen islandicus numquam caret. In ea opinione confirmor experimento, in lichene rangiferino instituto. Hujus, in solo nec ochra ferri, quantum apparet, praegnante, nec aquis martialibus exposito collecti unciam cl. FRISCHMANNUS combussit et calcinavit, cinerisque obtinuit (carbones fere magis referentis) drachnam cum granis decem, qui acido nitri solutus, lixivio sanguinis affuso praecipitatum coeruleum pulchrum satique copiosum exhibuit. In hoc terra martialis, praecipitato manifestata, pro inq. elemento haberi posse, mihi quidem non videtur.

§. XIII.

CARNIS CUM LICHENE ISLANDICO SERA PUTREDO.

Residuum aquae destillatae lichenis islandici gelatinam referebat. Per tres menses apertum loco frigido repositum, nullam subiit mutationem; color semper idem, nec ullum odoris putredinosi vestigium observabatur. Hanc ob rationem arbitrabar, carnem lichene involutam ferius forte putredinem contracturam esse; quod quoque sequenti modo expertus sum.

Die secundo mensis Novembris hora decima matutina, uncias duodecim carnis bubulae bene mundatae et recentis in tres divisimus partes.

Una parte pyxidem terream impleximus eamque charta bibula teximus; in hac post quinquaginta et sex horas, odorem animadvertimus putredinosum.

Simili vasculo alteram partem cum pulveris lichenis islandici uncia una indidimus, et in hoc non prius quam post septuaginta horas cadaverosus sese ostendit odor.

In tertio denique vasculo terreo ultima pars carnis bubulae pulveris corticis peruviani uncia una conspersa et undique tecta odorem putredinosum, septuaginta et sex horis praeterlapsis spargere coepit.

Corii quoque caprini portionem, pulvere lichenis islandici undique circumdatam, et sufficienter humectatam, convenienti loco reposuimus, simulque aliam cortice peruviano pulverisato tectam.

Sex hebdomadibus elapsis frustum, in lichene islandico maceratum, non multo inferius deprehendebatur illo ad quod praeparandum cortex fuerat adhibitus. — Patet itaque, lichenem islandicum stypticis particulis non destitui; etsi ad coria perficienda illum adhibere, potior utilitas dissuadeat.

§. XIV.

PRAEPARATA PHARMACEVTICA.

PASTA LICHENIS ISLANDICI. SYRUPUS.

Residuum (§. XII.) occasionem praebuit disquirendi: anae aequae bene ac ex radice Althaeae, pasta inde confici

possit. Eadem methodo qua pasta Althaeae *) praeparatur, rem tentavimus, ita tamen ut nullum nostrae additum fuerit gummi arabicum. Sumebantur aequales portiones sacchari et lichenis islandici. Albedine quidem caret lichenis islandici pasta, qua pasta de Althaea placet, sapore autem pergrato se commendat.

Aliud medicamentum e lichene islandico a nobis praeparatum similitudinem quidem cum syrupis habet, sed tamen consistentia gelatinae, et quidem si rite despumetur, pellucidae ab ipsis differt. Recipiebantur lichenis islandici unciae duae. Coquebantur cum aq. commun. unc. viginti quatuor usque ad residuas unc. sex; addebatur sacchari libra una. M.

Utrumque, hoc praeparatum et pasta, de qua supra loquutus sum, pergrati sunt saporis, iisque in casibus exhiberi possunt, ubi aegroti nimis delicatuli amaritiem aspernantur et cupedia in deliciis habent. Sed progrediamur ad varias vires nostri lichenis determinandas.

§. XV.

LICHENIS ISLANDICI VIS NUTRIENS.

Homines, partim necessitate coacti, partim luxuria ducti, omnia fere quae regnum animale cum vegetabili subministrant, ad corpus alendum adhibent. Dura praesertim necessitas, miseros fame pressos materiam cibariam rebus augere coëgit in longe alios usus creatis, quae esculentae fieri posse vix videntur, et nutritionem cuius causa ingeruntur, potius impediunt, quam ei inserviunt. Exemplo cortex pini silvestris esse potest, adstringendi facultate notissimus, e quo in septentrionalibus regionibus frequenter panis praeparari solet **). Ejusdem farinae etiam lichen noster islandicus esse, iis videri posset, qui obiter tantum illum inspexerunt; cibus aridus, exsuccus, anceps et fere nauseosus, a quo alimenti parum vel nihil expectari possit. At vehementer fallerentur qui ita sentirent. Accuratori enim ejus examine instituto et re melius pensitata dubitari nequit,

*) *Pharmacopoea Württemberg. ed. an. 1771. p. 135.*

**) *LINN. amoen. acad. vol. V. p. 67.*

iis illum vegetabilibus adnumerari debere, quae vi nutriendi insigni pollent. In genere enim, ut verbis utar Ill. ISENFLAMMII, fautoris ac praeceptoris aeterno cultu prosequendi *), vegetabilia materiam alimentariam praebentia eo aptiora atque ad nutritionem eo magis adhibenda sunt, quo magis eorum particulae, materiae illi, qua corpus nutritur, quaeque ad solida apponitur, sunt analogae, quoque melius constitutioni respondent hominum individuali. Materia illa nutritia, quae e particulis, ex animali aut vegetabili nutrimento eductis, elaboratur et tandem, expulsa parte aquosa, solidi naturam induit, gelatinosae indolis est **). Gelatinam autem animalium jam facie externa lichen islandicus refert; neque haec convenientia tam superficialis esse videtur, ut non eum ab ipsa quasi natura gelatinae magis assimilatum, facilius cum humoribus corporis animalis misceri, subigi et in succum nutritioni aptum converti posse indicet, quam alia corpora fuccique mucilaginosae indolis. Mucilago omnis quidem, notante b. CARTHEVSERO ***)) a gelatina animali quoad indolem parum distincta est, praeterquam quod loco salis aciduli tenerrimum quoddam sal medium ammoniacale (a perill. DELIO ****)) egregie demonstratum) et major substantiae oleosae crassioris portio mixtionem ejus ingrediantur; unde facilis unius in alteram, intra corpus animale, peragenda mutatio perspicitur. Attamen id etiam certum est, quod idem CARTHEVSEUS, v. olim cl. monet †), quaedam mucilaginosa praeter reliquas virtutes corpori humano laudabile nutrimentum prae aliis largiri; in quorum censum v. c. radix Salab, Sago et cumprimis Lichen noster referri meretur. Hanc hujus virtutem nutrientem longa confirmat experientia, praesertim Islandorum. Cl. OLAVIUS ††) vim ejus bene et solide nutriendi praedicat, tantaque illum gaudere asserit, ut operarii, victum tenuem alias aspernantes, hoc satis sint contenti.

*) In diss. de glutinis animalis cum vegez. comp. resp. nutr. p. 20.

**) LUDW. inst. physiol. §. 255. seqq.

***)) Mat. med. tom. I. p. 165.

****)) in diss. de Sale feri Erlang. 1766.

†) l. c. p. 166.

††) OLAFSENS und FOVELSENS Reise durch Island, tom. I. p. 86.

Cl. HORREBOW testatur, se hunc lichenem non solum ut cibum salubrem, sed etiam sapidum, saepius et libenter comedisse. Idem quoque narrat, Islandos in iis insulae partibus, ubi copiose provenit, lubentius illo uti quam farina frumenti *). Ex OLAVII ante laudati sententia haec vis nutriens eo majorem meretur laudem, quo certius est, lichenem facilis esse digestionis, et ventriculum debilem non gravare; ut etiam apprime conveniat debili stomacho laborantibus phthisique correptis; atque ea propter frugum loco in communem et quotidianum abiisse victum **). Haec lichenis praestantia non alii quam roborandi virtuti debetur, de qua nunc nobis erit agendum.

§. XVI.

VIS ROBORANS.

Vim roborantem licheni islandico inesse experientia testatur. Haec ex ejus amaritie potissimum deduci et explicari debere videtur. Omnes plantae amarae, pro abundantia particularum terrestrium, salinis intimius junctarum, roborandi vi pollent ***); adeoque etiam noster lichen. Dissimulari tamen nequit, amaras particulas non adeo esse copiosas, ut solae omnem roborandi facultatem, quam exferit, ipsi impertire posse videantur. Si autem, quod mihi quidem vix dubium videtur, martiales particulae semper in hoc lichene resident, ejusque mixtionem ingrediuntur; vis robor solidorum augendi his absque dubio exaltatur atque augetur, etsi molecularum benefici hujus metalli quantitas exigua sit. Altius enim cum reliquis plantulae elementis ad sanguinem penetrant, lymphae admiscuntur et ad tenacem viscidamque corrigendam tantum, quantum portionis moles permittit, conferunt. Quinimmo in ipsis jam primis viis, ut dixi, robur fibris reddendo eximie prodest, eamque ob causam non solum ipse non facili negotio concoquitur, sed aliorum quoque ciborum digestionem quodammodo opitulatur. Hic tamen notari velim, in quibusdam aegris

*) BERG. *mar. med.* p. 857.**) BERG. *l. c.* p. 856.***) LUDW. *inst. iher. gen.* §. 174.

appetitum usu lichenis esse imminutum. Hujus causam fortasse cruditates primarum viarum nondum eductae fiunt. Aegrotis qui de imminutione appetitus conquerebantur, laxans propinavi, et deinde usum lichenis continuare jussi; quo facto appetitum non imminutum, sed potius majorem exstitisse retulerunt.

§. XVII.

VIS ECCOPROTICA.

De vi lichenis islandici leniter aluum solvendi, auctorum sententiae diversae sunt. A BORRICHIO enim ob vim illam dicitur *Muscus catharticus* et, „eo insulae, inquit, „coloni primo vere ad expurgandos corporis humores noxios „utuntur, reliquo aestatis siccitatem comminuunt, et pulmentariis admiscunt, expirante demum vi purgatrice et „succedente alimentaria *).“ Cl. SCHOENHEYDER in aegrotis quibusdam, quibus lichenem islandicum propinavit, ab initio diarrhoeam inde oriri observavit, quam usu emulsionis gummi arabici sedavit **). Contrariam autem fovere sententiam Cl. OLAVIUS vel potius Cl. PAULLI, Medicus Islandus videtur, et contendit, illum non esse catharticum, sed tantum alvum mollem et apertam servare ***). Hoc probare studet partim ex quotidiana experientia Islandorum, partim quod femina quaedam ad diarrhoeam pertinacem per aliquod tempus cohibendam lichene islandico feliciter usa fuerit. Sed neutrum cl. viri argumentum hanc efficaciam medicamento nostri dubiam reddere mihi quidem videtur. Quod enim ad primum attinet, neminem fugit, homines alimento vel medicamento cuidam adsuetos, effectu carere, quem alii iisdem nunquam usi experiuntur. Novi aliquos, qui, vitio diaetae commissio et cruditatibus inde ortis, statim pulverem radicis rhei ingerere assueverunt; frequenti hoc usu actio medicamento in intestina sensim ita imminuitur, ut effectus sequatur longe minor, quam in

*) *Acta havn.* 1671. p. 126.

**) *Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauch praktischer Aerzte.* Tom. III. p. 403.

***) *Vid. OLAFSENS und POVELSENS Reise durch Island tom. I. p. 86. et 87. et ill. BERGII mat. med. tom. 2. p. 856.*

aliis, qui raro vel nunquam antea rhabarbarum adhibuerunt, et triplum devorare debeant ad obtinendum effectum voto respondentem. Quod ad alterum attinet, perinde unicuique notum est, corticem peruvianum alvum iusto laxiorem cohibere. Idem vero, quod ipse expertus sum, hominibus laxitate intestinorum laborantibus, eandem plus minusve subducit. Pari ratione lichen islandicus, quem vi roborente corticem supra dictum imitari superiore paragrapho exposui, et alvi fluxum sistere aliquando potuit, et eundem in alio subjecto movere. — Si rarius vis lichenis eccoprotica in Islandia sentitur, id etiam exinde forsitan explicari potest, quod, teste cl. POLAVIO, diutius illum aqua maccare solent, antequam coquatur; qua partes multae activae eluuntur et efficacia insigniter minuitur. — Ipse testari possum, plures aegrotos, quibus lichenem islandicum praescripsi, mihi retulisse, se ab initio per aliquot septimanas alvum sensitisse aliquanto laxiorem, quam antea. Non tamen etiam dissimulandum est, esse qui lichene islandico nullatenus moventur, etiamsi illum in aqua leniter coctum, sufficienti alias copia comedant.

§. XVIII.

VIS ANTHELMINTHICA, DIAPHORETICA, DIVRETICA
ANTISEPTICA.

Cum lichen islandicus alvum laxet, quaeri etiam posset: anne virtus anthelmintica ipsi queat tribui? Medicamenta, quibus vermes oppugnantur, partim eos debilitare et necare, partim e canali intestinorum expellere debent. Illorum plura amara sunt; et forte amarities una cum acredine, quae licheni islandico insunt, efficerent, ut illi anthelminticorum classi adnumerari possit, si experimenta eo scopo instituerentur. Ad expellendos vermes autem nimis videtur debilis.

Firmiori talo stat virtus diaphoretica, de qua b. URBANUS HIAERNE annotavit, se in se ipso periculum fecisse, et expertum fuisse, quod praeter vim eccoproticam, transpirationem quoque insensibilem promoveat *). Haec vis

*) *Abhandlungen der Schwedischen Acad. sechster Band. p. 165.*

absque dubio particulis subtilibus acribus tribuenda est, quae ut e §. §. V. et XI. constat, lichenis islandici mixtionem ingrediuntur, stimulisque lenibus non solum diaphoresin, sed etiam, circumstantiis mutatis, excretionem vicariam urinae copiosiore[m] promovere possunt.

Ex observationibus §. XIII. in medium prolatis facile colligitur, lichenem islandicum vi putredinem avertendi non plane destitui, quam tamen ea inferiorem esse quae chinchinae cortex adeo insignis est, agnoscimus et libenter largimur.

§. XIX.

USUS LICHENIS ISLANDICI IN TUSSE.

Observatio I. Vir quadraginta et quatuor annorum, habitus succulentioris et robustioris, vitae generi adjuetus modice laborioso, qui plures iam morbos, praecipue in juventute febrem inflammatoriam et febrem putridam perpeffus erat, tussi hoc tempore per totum fere annum laboravit, quae eum praesertim tempore valde vexavit nocturno. Hanc ob rationem ad eum vocatus, praescripsi ei lichenem islandicum et quidem sequenti modo:

R. Lichen. island. unc. jv.

Concis. D. Sign. Sumantur duo cochlearia, coquantur per dimidiam horam in libra aquae et lactis dimidia.

Coletur per pannum et sumatur.

Hoc usus est ter per diem tempore matutino, post prandium et antequam lectum petiit. Nunc eo jam utitur per tres septimanas et a tussi fere plane liberatus est. Usus lichenis in principio appetitum ejus ingenti modo auxit, urinam majori quantitate civit atque somnum et gratiorem et placidiorem ei conciliavit.

Observatio II. Alutarius quidam quinquaginta annos natus, habitus ficcioris sed robustioris, multis jam morbis, praecipue semestri praeterlapso aestivo cephalaea gravi per quatuor septimanas vexatus et ab hac sanatus, febre tertiana per tres septimanas laboravit. Tunc temporis cura ejus in collegio clinico ab Illustri WENDT, viro in praxi medica experientissimo, felicissimoque, ob insignia sua in me

merita maxime semper devenerando mihi tradebatur. A febre tertiana adhibitis convenientibus remediis liberatus, cum a frequenti refrigeratione sibi non caveret, fructusque horaeos viliores copiosius ingurgitaret, in tussim incidit adeo vehementem, ut ne noctu quidem somno indulgere posset. Praemisi tunc per aliquot dies usum potionis asthmaticae Brunneri, hac vero sine ullo levamine assumpta, praescripsi ei lichenem islandicum, quo per tres utebatur hebdomades cum insigni mutatione status. Appetitus enim redibat, somno reficiebatur, omnesque functiones cum facilitate et oblectamento fiebant. Tussicula tantum parvi momenti remansit. Tam subito convalescens non amplius lichenem adhibere necessarium putavit. Postquam autem per sedecim dies ejus usum omisisset, omnia in pejus iterum inclinarunt. Lichenis itaque decoctum repetere coactus bis quotidie illud hausit, quo per tres septimanas facto nunc quidem sanatus est, usum tamen adhuc continuat.

Observatio III. Vir quinquagesimum agens annum, corporis robusti, semper vitam ducens mobilem, tussi per quatuor hebdomades laborabat; initio tussis non erat vehemens, et ceteroquin negotia sua consueta peragere poterat; remediis itaque utebatur nullis. Vehementia autem tussis de die in diem aucta, ita, ut nocturno tempore somnum capere non posset, et semper sedendo tussire cogeretur, accedente etiam dolore ardente intolerabili in thorace, usum quotidianum unciae unius lichenis in decocto ipsi commendavi, quo intra octiduum perfecte restitutus est.

Cl. SCOPOLI de concionatore Capucino refert, eum macilentum per duos annos tussisse, post usum lichenis pinguiorem factum et sanitate perfecta gavisum esse. *Idem* de femina quadam debili, tussiculosa et infirma narrat, eam solo usu lichenis convaluisset *).

Ego ipse, tussi cum excreatione muci tenacis laborans, quotidie tempore matutino decoctum lacteum lichenis octodecim diebus assumsi. Rarissime nunc tussio, excreatio fit facilius nec adeo frequens est. Saepius tussis adeo vehemens fuit, ut vomitum produceret. Quod ad

*) *Annus historico-natural. II. p. 117.*

reliquos attinet effectus, quos in me observavi, primis diebus alvum quam lenissime solvit, et usque ad prandii tempus omni carere potui alimento.

§. XX.

USUS IN HAEMOPTYSI.

Praeclarum edere effectum lichenem in haemoptysi, Cl. ZÜCKERT annotavit *) URBANUS HIAERNE magnam quoque laudem ei tribuit in hoc morbo **).

Observatio IV. Musicus quidam annorum triginta et quatuor, facie pallida flavescente, qui tibiae gingrinae genere, *Fagot* dicto, inflatu difficili modulari solet; in tenera juventute haemorrhagias narium largas atque vigesimo aetatis suae anno febrem, excandescencia animi praegressa, expertus est. Medicus eo tempore accersitus, ut vena bis intra triduum ei secaretur, iussit. Ex eo tempore phlebotomiam quolibet anno instituere consuevit continuavitque usque ad trigessimum secundum annum, per quod temporis spatium nullum sensit incommodum. Trigesimo autem quarto anno frequenter tussire coepit, doloremque prementem ingratum in utroque latere thoracis sensit. Negotia consueta peragere, praecipue instrumentum musicum inflare, non amplius potuit. Tandem in haemoptysia incidit, contra quam Illustris WENDT auxilium imploravit. Is, praemissa venaesectione, lichenem ei praescripsit, et pediluviorum usum imperavit. Quibus adhibitis omnia symptomata leniebantur, et post quinque septimanas penitus evanuerunt. Lichenem quotidie mane assumebat in lacte coctum. Tantum exiguo temporis spatio virium recuperavit robur, ut solus symphoniam totam tibia modulari posset, cum antea ne exiguae parti par esset. Continuavit usum per dimidium annum. Observavit enim, seposito lichene, pristina redire symptomata; continuato autem cessare.

Observatio V. Vir triginta et duorum annorum, vitae generis inter sedentarium et mobile modii, qui venae-sectiones interdum instituit sed nunquam scarificationes, in

*) *Mat. aliment. p. 169.*

**) *Abb. der Schwed. Acad. VI. B. p. 166.*

juventute dysenteria et febre intermittente laboravit, alias semper sanitate perfectissima gavisus, ante octo annos tussire coepit et tussi per annum vexatus est cum dyspnoea, prostratione appetitus et virium atque agrypnia. Multis frustra adhibitis remediis aliud adhuc accedebat malum; subinde enim sanguinem floridum spumescens exspuebat. Hic, omnibus aliis remediis spretis ad lichenem islandicum, tamquam sacram anchoram, confugit. Antequam autem ad ejus usum accederet, curavit ut vena sibi feceretur; deinde in decocto saturatissimo eo usus est ter per diem. Praeterlapsis duabus septimanis sensim excretio sanguinis imminuebatur, tandemque penitus cessabat. Tussis antea vehementer, mitior nunc nec adeo frequens erat. Dyspnoea in eupnoeam mutabatur, appetitus et somnus redibant. Semper diactae convenienti operam dabat, si excipias, quod aliquando die quodam praecalido itinere pedestri unius circiter milliaris ad pagum quemdam instituto cerevisiae meracioris aliquot pocula hauserit; quo facto statim iterum sanguis prodire coepit. Hoc ille perterritus, lichenem iterum in auxilium vocavit, et intra trium hebdomadum spatium plenarie restitutus est, nec ullum amplius ejicit sanguinem, sed nunc integra fruitur sanitate.

§. XXI.

USUS IN PHTHISI.

Quamquam haud ignoro, phthisin non semper tolli lichene islandico, nisi sit incipiens, in qua illum quoque laudavit ZÜCKERT *); nullum tamen praeclarius remedium mihi notum est. Eadem est sententia Cl. EEBELING in dissertatione de hoc lichene, Glasgovii habita, ex recensione in novis litterariis Goettingensibus tantum mihi nota **), qui palmam ei dat prae omnibus aliis remediis antiphtisicis cum syrupo citri conjuncto.

Addam historiam morbi ab amicissimo HASPELIO, Medicinae Candidato dignissimo, commilitone per triennium suavissimo, mecum communicatam:

*) l. c. p. 196.

**) Göttingische Anzeigen p. 1212.

Observatio VI. Juvenis octodecim annorum, habitus corporis sicci, macilenti, vitae modice laboriosae adfuetus, per novem menses tussis vexabatur cum copiosa sputorum excreatione. Contra eam varia adhibebat medicamenta, sed incassum. Tussis enim quotidie fiebat vehementior, ita, ut sub finem Octobris aliquot uncias sanguinis floridi purique ejiceret; quo facto ill. WENDT accedebat, eius auxilium sibi expetiturus. Aderant sudores nocturni et febris; appetitus prostratus corporisque vires fractae, lingua valde impura erat. Remedium ipsi praescribatur quod sequitur:

R. Gumm. ammoniac. depurat. unc. semis.

Solv. in acet. scillit. unc. duabus Adde

Aq. veron. vinos. unc. quatuor.

Ol. tart. p. deliqu. gtt. triginta.

Syr. diacod.

Syr. Althaeae singul. unc. semis,

Nicotian. drach. duas.

M. d. in vitr. sign. Quater per diem sumatur cochlear unicum.

tam felici effectu ut tussis et sputa quoque, quae tenacia fuerant, coctiora facilius redderentur. Elapsis vero aliquot diebus vehementius iterum increbuit tussis cum larga sputorum ejectione. Rebus igitur sic frantibus, lichenem islandicum optime hic convenire judicabatur, et quidem hoc modo:

R. Extr. lichen. island. aquos.

taraxac. singulor. drach. duas.

Aq. ejusdem unc. quatuor.

Syr. pilosellae q. s. ad gratum saporem.

M. d. in vitr. sign. Quater per diem sumatur cochlear unicum.

Hoc consumto extractum spirituosum copiose ipsi propinabatur, absque aliis adhibitis medicamentis, eo effectu, ut notabiliter febris levior fieret. Post hujus usum aliquamdiu continuatum reficiebantur vires, ut aeger solitos rursus labores domesticos, suscipere et aëri sese exponere posset, sine subsequenti frequentiori tussendi conatu. Melius quoque succedebat expectoratio, redibat appetitus alvus-

que naturalis. Subito autem aegrotus ob vitia diaetae atque regiminis commissa, diarrhoea corripiebatur enormi, qua glomeratim pus cruentum excernebat, tussi penitus cessante, tanta vero cum prostratione virium, ut negotia sua rite obire non amplius posset. Ita propter exhibebantur remedia, alvum cohibentia, viresque corporis reficientia, praesertim pulveres cort. peruviani et cascarillae, quibus diarrhoea paululum compescebatur, prorsus tamen tolli nondum potuit, nec vires refici, ita, ut lecto etiamnum adfixus sit aegrotus.

Observatio VII. Vir quidam habitus siccioris et robustioris, ante decennium, quum annum ageret sexagesimum quartum, tussi corripiebatur vehementi, prostratione plenaria appetitus, agrypnia, dyspnoea et lassitudine insigni stipata. Medicamentis uti diu recusavit, dubitans dari, quae sibi iam seni levamen adferre possent. Tandem ab amico exoratus, lichenem islandicum sibi, non sine molestia, ipse collegit, quo vix per tres septimanas adhibito, lassitudo et dyspnoea disparuerunt, appetitus rediit auctior, somnus tranquillior magisque reficiens exstitit. Tussi non quidem plane liberatus, sed adeo tamen levatus est, ut molestia ipsi esse desierit. Magna saepe cum admiratione hunc senem, septuagenario nunc majorem, hilarem et alacrem vidi. Semper tempore vernali utitur lichene islandico, eo scopo, quo alii adhibent plantas recentes pro curatione vernali, et non sine insigni effectu.

§. XXII.

USUS IN PHTHISI ULCEROSA PULMONALI.

Observatio VIII. Molitor quidam triginta et octo annorum, habitus laxioris, nunc per decem annos vitam agens sedentariam, ab undecimo anno, ob narium haemorrhagias, quas frequentes a prima juventute passus erat, venae-sectionibus bis per annum institui solitis assuetus, ceterum sanitate semper gavisus secunda, cujus pater per multos annos asthma laboraverat et denique tabe emaciatus vita excesserat, medio mensis Iulii anni praeterlapsi ab Illustri ISENFLAMMIO curae meae committebatur. Quem cum

inviserem, sputa purulenta cum striis sanguineis mixta eicientem et asthma adeo laborantem inveni, ut in lecto manere non posset. Tumor pedum insignis aderat, appetitus prostratus, somnus ob asthma et tussim, quae praecipue noctu eum cruciavit, fere nullus. Multa jam antea adhibuerat remedia, quae ei parum vel nihil levaminis attulerant. Cortice peruviano quoque usus erat, ob paupertatem et curtam supellectilem tandem ab eo abstinere coactus. Hunc aegrotum lichene islandico levare, non sanari posse ratus, decoctum saturatum trium drachmarum quotidie sumendum ipsi praescribo. Ab initio, ut fieri solet, appetentiam ciborum augebat et hucusque etiam conservavit. Alvum lenissime solvit. Nunc medicamento per dimidium annum adhibito, tantopere vires recuperavit, ut laborem consuetum iterum sustinere possit. Tumor pedum quodammodo imminutus, excreatio sputorum liberior, nec amplius striis sanguineis tincta, tussi adeo levatus, ut somnum capere possit, asthma vero nondum liberatus est, nec unquam liberabitur, propterea, ut opinor, quod cum phthisi ulcerosa pulmonali quoque conjunctus est hydrops pectoris.

*Observatio IX. *)*. Femina quadraginta et quinque annos nata, perfecta semper fruens sanitate, neque medicamentis neque venaesectionibus allueta, durante matrimonio undecim annorum septem feliciter partus enixa: anno quadagesimo praeterlapso, interdum sudoribus nocturnis vexabatur, qui tempore diluculi provenire solebant et acalidiori conclavi, quam cui antea assueta fuerat, ortum traxisse videntur, nullo tamen modo eam debilitabant, ad sanitatem conservandam potius proficui. Hi sudores ineunte anno millesimo septuagesimo septimo imminui videbantur, quod illa somno minus quieto tribuebat, vera autem causa erat tussis sicca quae eo tempore ipsam invadebat somnosque interrompebat. Eo tempore proprio ausu infuso sequentium simplicium:

R. Herb. meliss.

hyssop. sing. unc. unam.

*) Hanc et sequentes Illustri WANDT debeo, qui eas mecum benevole communicavit.

Rafur. lign. fassafras unc. duas.

— sanct. unc. unam et dimid.

Rad. chin. unc. unam.

Sem. anisi drach. duas.

coriandr. drach. unam.

Cort. citr. drach. duas.

Cinamom. acut drach. unam.

M. f. sp.

utebatur, sed sine ullo levamine, et quamquam paullo longiore in cubili mora, haustoque infuso memorato calido sudorem restituere tentaret, eventus tamen spei non respondebat, sed potius tussis eadem erat vehementia. Mense Aprili anni supra dicti materiam albam tenacemque ejicere incipiebat, sed tanta cum difficultate, ut interdum vomitus simul cieretur. His permota aegra, etsi medicamenta averfaretur, medico se committendi consilium capiebat, qui sequens ipsi per XIV. dies propinabat remedium:

R. Gumm. galban.

ammoniac. depurat. sing. unc. semis.

M. solv. in acet. scillit. unc. duabus.

Insp. ad consistent. massae pilul. add.

Sulph. aurat. antimon. tert. praec. drach. unam.

M. f. l. a. Pilul. pond. gr. unius. d. f.

Sumantur num. X. pro dosi sing. vesp.

eo cum effectū, ut tenacitas materiae imminueretur, et vomitus cessarent. Tussis autem semper erat eadem. Odoris pilularum gravis pertaesa, nunc aliam desiderabat medicinam, quapropter medicus ei uncias duas succi expressi herbarum sequentium hauriendas dabat:

R. Succi express. herb. nasturt. aquat.

veronic.

heder. terrestr.

betonic.

taraxac.

fanicul. ana q. s.

D. quotidie.

cibosque tantum chylum viscidum generaturos severius interdicebat. Ceterum enim aegrota a teneris diaetae exactis-

finiae fuerat adfuerat. Animo quoque erat tranquillo et moderato, ita ut medicus in universum, praecipue ratione rerum sex quae non naturales appellantur, pauca monenda haberet. Nihilo tamen secius herbarum praedictarum usu nihil proficiebatur; aegra potius iterum omnia efculenta et potulenta quae sumebat vomitu reddere coepit, unde vires quotidie magis frangebantur adeo, ut vix pedibus insistere posset. Iam diu usus feri lactis caprini dulcis ipsi fuerat commendatus, quod in vicinis montibus recens paratur et ab aegris e planitie eo proficiscentibus felici successu acidularum loco ingeritur. Quia autem nix ibidem ante finem mensis Maji liquefcere non solet, aegra ante medium Iunii illo uti non poterat. Efficacia hujus medicinae plerumque ab aegris dijudicatur secundum efficaciam in organa consueta excretoria, interdum admodum validam quidem, nunquam tamen debilitantem; quinimmo tum demum aegri utilitatem ab usu feri caprini sibi promittunt, si frequenter alvum deponere coguntur. Quamquam in hac aegra serum non alvum, sed urinam tantum ciceret, usus illius tamen non fuit irritus. Tussis enim reddebatur mitior, excreatio sputorum faciliior, appetitus auctior, vomitus plane cessabat et vires augebantur; adipectu aegrota quoque saniori gaudebat. Quatuor praeterlapsis septimanis, finitoque hujus medicinae usu, domum revertebatur, ubi ultra mensem mediocri fruebatur sanitate. Brevi autem tempore post tussis vehementior illam invadebat, cui praecipue tempore vespertino et matutino obnoxia erat. At die decimo nono mensis Augusti aegrota fere per dimidiam horam cum tussi perpetua sanguinem eiciebat floridum. Deficiente medico chirurgus advocabatur, qui ei per quatuor aut quinque dies potionem temperantem, deinde potionem laxantem ex manna et tamarindis, tum per quatuor septimanas extractum cort. chinchinae propinabat. Restaurabant haec remedia quidem vires, tussim autem nullo modo imminuebant, quae eadem semper vehementia saeviebat, sicut etiam visciditas ejectae materiae flavae manebat. Menstrua hucusque rite fluxerant et tempore consueto sufficienti quantitate prodierant; et quamvis unica vice mense Majo per octiduum tardarent, durante usu feri tamen in ordinem

redibant; et procul dubio fluxui menstruo, paullo post haemoptysin iusto tempore prorumpenti tribuendum erat, quod aegrota tam cito ab ea fuerit liberata. Mense Octobri autem menstrua emanabant, et neque haec neque sudores nocturni denuo apparuerunt. Omnia remedia, quae aegrota postea ab aliis medicis accipiebat, irrita erant. Quae e pulmonibus ejiciebantur, magis magisque purulenta, in aqua fundum petebant et prunis injecta odorem a BOERHAAVIO *) descriptum referebant. Cum quotidiana diminutione virium magis magisque manifestabantur signa praesentis exulcerationis pulmonum. Tandem ad Ill. WENDT confugiebat, qui ei suasor exstitit ut pulte e lichene islandico cocto uteretur. Eo quidem induci non poterat, ut lichenem lacti incoctum comederet; lac tamen cum eo decoctum optimo successu fumebat. Tussis enim et sputa imminuebantur quotidie et vires sensim sensimque recuperabantur. Cum autem lichenem in vicinia non crescentem e longinquo semper petere oporteret, usus illius saepius interrompebatur. Praeterea medicus ceterum non iners, qui paullo ante ibidem domicilium fixerat, lichenem islandicum in morbis pulmonum aliquid efficere posse negans, ejus loco infusum seminis lini suadebat, quo autem dyspnoea et sputa tantopere augebantur, ut aegra proprio motu ad usum lichenis recurreret, quo morbi symptomata denuo insigniter leniebantur. — Intra octodecim menses deinde praeterlapsos, aegrota usu hujus medicamenti repetito saepe malum regerminans leniit, nunquam tamen eum sine interruptione continuavit; imo tandem innatum omnium medicamentorum fastidium recrudescentis ut ab eo plane abstineret, eam impulit; quapropter aegra nunc morbo longe gravius adficitur et sine dubio brevi succumbet.

Observatio X. Vir quinquagesimum sextum agens annum, praegressis doloribus prementibus pectoris, difficili respiratione, motibus febrilibus, tussi et rejectione pituitae consistentis albae cum intermixtis striis sanguineis laborabat. Ad hoc malum tollendum instituebantur ve-

*) *Aphorism.* 1206.

naefectiones, lenia exhibebantur laxantia et species pectorales, quorum compositionem Ill. WENDT non rescivit. Cum autem haec remedia nullum afferrent levamen, sed respiratio anhelans, febrisque vehementior fieret et materia viridi-flava foetida frequentius rejiceretur; medicus aegro praescripsit lichenem cum lacte coctum. Hoc per aliquot septimanas adsumto, aeger ab omnibus malis liberabatur et per biennium pristinum vitae genus continuare, labores suscipere et cibis consuetis vesci poterat: pergebat etiam venaefectiones consuetas bis quotannis, tempore scilicet vernali et auctumnali, instituere. Unicum tantum symptoma restabat, nempe calor ardens, quem prandio assumto in palmis plantisque sentiebat, siti et sudoribus nocturnis defatigantibus stipatus, ad quae tollenda Medicus ei electuarium compositum e cort. peruv. conserva rosarum et syrupo pilosellae bono cum effectu exhibebat. Sub finem secundi anni vero sputa, eadem qualitate ut antea, copiosius ejiciebantur, viresque adeo deficiebant, ut aegrotus lectum relinquere non posset. Hoc ille, electuarium fastidians, hujus usui tribuebat, eamque ob causam, repudiato quo eousque usus fuerat, Medicamento, Ill. WENDT consulerebat. Hic, rebus omnibus rite examinatis non potuit quidem facere, quin aegro, corticem peruvianum abhorrenti cederet, hujus autem loco usum lichenis redauspicari serio suadebat; quo aegrotus omnibus symptomatibus mirifice levatus, extra urbem iterum exipatiari potuit. Infelici autem casu aegrotus noctu, cum sudore maderet, perterritus lecto surgere cogebatur; quod refrigerium tristissimi consequerentur eventus, nulla arte leniendi.

Observatio XI. Vir quadraginta et octo annos natus, ebriosus, qui vitae immoderatae noxas venaefectione saepius repetita et scarificationibus, sudando et alvum laxando avertere annitebatur et per sat longum tempus feliciter evitaverat, praecipue cum commercium pecuarium, cui operam dabat, frequentem ipsi corpus in aëre libero movendi praeberet occasionem, tandem rixa forte oborta, vehementes in pectus accepit ictus, a quo tempore vehemens dolor premens in latere dextro thoracis mansit, quocum postea tussis,

rejectio materiae falsae in dies copiosior, motus febriles, appetitus prostratus, sudores nocturni, diarrhoeae saepius redeuntes, subitanea macies et enervatio corporis tam insignis conjungebantur, ut ne mille quidem passus sine ingenti lassitudine ambulare posset. Accedebat materiae tussi expulsaе, ratione odoris et gustus, quem aeger inde percipiebat, quotidie major depravatio. Rebus sic stantibus auxilium efflagitabat aestate anni millesimi septingentesimi septuagesimi octavi. Praemisso leni remedio laxante, post dies aliquot vena ei secabatur. Sanguis celerrime in serum decolor abibat, et coagulum exiguum in eo natans magis pus quam cruor esse videbatur. Deinde potio asthmatica Brunneri ei propinabatur, quae id efficiebat, ut facilius sputa redderentur; reliqua autem symptomata eadem manebant. Tum ei dabatur lichen islandicus in lacte coctus, cujus usu per aliquot menses continuato aegrotus ita levabatur, ut exeunte Octobri jam per miliaris spatium ambulare pectusque pugno fortissime percutere posset, et se inde dolore affici negaret. Ex eo tempore consuetis negotiis operam dat, quamquam pristinas consuetudines malas nondum plane deseruerit.

Observatio XII. Tibialium textor, viginti septem annorum, macer et pallidus, in iuventute variis morbis decubuit, praecipue variolis et decimo aetatis anno febre tertiana, a qua medicamentis domesticis liberatus est. Ab anno vigesimo aetatis quotannis circa festum Paschatis venae sectionem instituere consuevit. Anno millesimo septingentesimo septuagesimo octavo aliquot dies post venae sectionem febre iterum corripiebatur tertiana. Varia iterum adhibebat remedia domestica, sed frustra. Post decem septimanas tandem medicastrum ejusdam curae se committebat, brevique a febre liberabatur. Iam antea per sex annos tussi, et interdum dolore pungente in pectore, scilicet si vel corpus vehementer moveret, vel nicotianae fumum sugeret, vexabatur. Nunc febre suppressa, ita augebatur tussis vehementia, ut ei semper dolorem excitaret et noctu vix per horam dormire posset. Tandem accedebat ejectio materiae purulentae, dormienti copia interdum adeo

molestae, ut suffocationis metu saepius cum expergefaceret. Appetitus plane erat prostratus, ventriculusque tam debilis, ut vix levissimos cibos perferre posset; quibus assumtis statim de dolore prementi in sinistro hypochondrio conquerebatur. Praecipuum autem incommodum fuit lassitudo adeo ingens ut vix conclave transire posset. Ill. WENDT, quem consulebat, sequens ei praescribebat remedium:

R. Gumm. ammoniac. depurat. unc. semis
solv. in

Acet. scillit. unc. una et dimidia, add.

Aq. flor. sambuc.

hyssop. sing. unc. duas cum dimid.

Syr. de erysimo Lobel. unc. unam.

M. d. in vitr. sign. Omni trihorio cochlear fumentum.

Hoc medicamento assumpto dimidiaque ejus portione repetita, nullam sentiebat mutationem. Deinde Vir ill. eum decoctum lichenis aquosum cum saccharo et lacte bibere iussit, quo per decem dies adhibito appetitus rediit et interjecto aliquo tempore tantum augebatur, ut cibo vix satiari posset. Tussis una cum rejectione materiae purulentae cessabant post usum lichenis per sex septimanas continuatum, somnus et vires restaurabantur et nunc per biennium sanitate fruitur illaesa. Dolorem in pectore sentit nullum, laboresque opificii satis duros, praesertim pectore laborantibus, absque incommodo subit.

§. XXIII.

USUS IN ANAPHRODISIA.

Observatio XIII. Vir triginta et quatuor annorum, corporis obesi, in juventute veneri nimium deditus, tandem uxore ducta se viribus ad liberos gignendos exhaustum sensit. Illustris RUDOLPH, quem Praeceptorem et Fautorem ad cineres usque veneror colloque, ei suavitatem usum lichenis, quo per duos menses continuato voti compos tres ex uxore suscepit liberos.

Observatio XIV. Chirurgus quidam in India orientali Illustri RUDOLPH se sibi tori adjunxisse sociam, sed mariti officio rarissime satisfacere posse questus est. Vir ill. ipsi quatuor libras lichenis islandici misit. Duobus annis praeterlapsis nunciavit ei, uxorem suam filium enixam esse, seque optare, ut sibi eandem quantitatem lichenis denuo mitteret.

IDEM VIR illustris tribus aliis viris non sine insigni effectu lichenem quoque propinavit.

§. XXIV.

USUS IN DYSENTERIA.

In dysenteria ad materiam acrem involvendam et intestina roboranda, lichen islandicus ob partes mucilaginosas et roborantes utilissimus esse potest. Cl. OLAVIUS *) eum remedium securum antidyntericum appellat, et a Cl. TROMSDORFF in *dissertatione de lichene islandico* gummi arabico praefertur. Dysenteria 1775 epidemice grassante experientiss. D. SAUER vocabatur ad puellam quatuordecim annorum dysenteria laborantem. Ob horrorem decocti lichenis propinabatur ei mucilago gummi arabici. Durante cura tres ejus sorores natu majores dysenteria quoque invadebat; hae decocto lichenaceo utebantur et brevi tempore restituebantur, cum natu minima adhuc aegrotaret; quae tandem in diarrhoeam habitualement incidit, cortice tollendam **).

§. XXV.

USUS DIAETETICUS.

Colligitur ut supra §. III. jam dixi, lichen noster ab Islandis tempestate humida in campis saxosis nullo gramine vestitis, ad quos deni aut viginti simul, equis, tentoriis cibisque necessariis instructi, aestate iter faciunt, et quatuordecim diebus circiter elapsis cum sarcinis lichenis, equis impositis, revertuntur. Siccatus et comminutus lichen

*) De KERGOELEN TREMAREC *Beschreibung seiner Reise nach der Nordsee* Leipz. 1772. p. 69.

**) TROMSDORFF *diff. cit.* p. 17.

doliis immittitur, et tunc merx fit vendibilis, sed vili pretio, quandoquidem tonna i. e. 728 librae danicae, ad summum uno imperiali, monetae danicae, veneant. Comedunt eum plerumque in pultem *) coctum, quam duplici modo praeparant: vel enim aqua frigida eum per diem macerant, amaritudinis extrahendae causa, deinde concisum coquunt, donec gelatinae consistentiam nanciscatur; vel maceratum radiis solis igneque torrefaciunt, sacco inclusum tundendo comminuunt, et deinde elixant. Coquitur vel in aqua, vel fero lactis, vel lacte ipso; pulti cum sola aqua paratae addito lacte maiorem gratiam nonnunquam conciliare student **). In *Actis Acad. Reg. Scientiar. Holmienfis* ***) relatum legitur, panem ex hoc lichene in Islandia fieri. Cl. OLAVIUS nullibi quidem hoc observavit; posse autem ex eo farina addita panem coqui, se ipsum expertum esse testatur ****). Talem panem ego quoque parari curavi. Unciae itaque tres lichenis islandici mundificati, concisi et in pulverem redacti, cum massa e farina frumenti et fermento constante, subigebatur et finita fermentatione panis in furno rite coquebatur. Verum is non solum valde niger, sed etiam ob nimiam amaritiem ingrati saporis erat. Alio itaque modo experimentum repetii tam cum lichene per aliquot horas in aqua calida macerato, quam crudo. Miscebatur tum hujus tum illius in pulverem redacti, uncia cum farinae et fermenti quantitate sufficienti. Utraque miscela seorsim cum aqua subacta, praevia fermentatione, qua satis bene levabantur, massae in furno decenter coquebantur. Illa e lichene antea macerato facta pondus habuit unciarum septem, altera unciarum octo. Panis e lichene crudo confectus iterum amarulentus, e macerato longe minus ingrati saporis erat. Sincere tamen profiteor, me hunc usum diaeteticum lichenis libenter Islandis cedere, et pulte, vel decocto cum aqua aut lacte

*) ZÜCKERT, *mat. aliment.* p. 196.

**) OLAFSENS *Reise tom. I. p. 85. et seqq. tom. II. p. 106.* KERGUÉLEN TREMAREC *Reise nach der Nordsee p. 69. v. TROILS Briefe über Island. p. 76.*

***) *an 1744. p. 170. 1739. p. 9.*

****) *tom. I. p. 86.*

parato, vel etiam decocto aquoso cui sub finem coctionis pauxillum chocolatae comminutae additum fuit, uti malle.

§. XXVI.

USUS PABULARIS.

Quemadmodum hominibus; ita bestiis quoque alimentum praebere potest lichen islandicus egregie nutriens. Cl. SCOPOLI narrat, rusticos in Comitatu Tolminensi Carnioliae, equos fame et macie confectos in ea loca, ubi lichen abundanter provenit, mittere, hosque intra quatuor septimanas, pingues viribusque restauratis redire. Porro refert, in Carniolia solo lichene islandico fues intra breve tempus faginari *).

§. XXVII.

USUS VETERINARIUS INTERNUS.

Equus quinque annorum in stabulo academico Erlangensi, cum virium prostratione emaciatus, et dyspnoicus tussi vehementi rejiciebat materiam purulentam foetidam, sed nondum striis sanguineis mixtam. Excrementa erant arida et badia. Huic, quandoquidem multis remediis adhibitis et cum motu placido conjunctis, nihil proficiebatur, ad necem jamjam damnato Cl. MAKELDEY, nunc magister equorum Serenissimi Principis FERDINANDI Brunovicensium et Luneburgensium Ducis rel. consentiente patre, tunc temporis stabuli Academici magistro, bis per diem duas circiter libras lichenis cum furfuribus, sale et aqua mistas exhibuit; quas equus semper avidissime devoravit. Elapsis aliquot diebus melius se habere coepit animal miserum, ita ut vires sensim redirent pristinumque robur, tussis autem et rejectio materiae purulentae evanescerent. Lichene sic per tres septimanas adhibito plane restitutus est, ita ut equas, quas antea nunquam tetigerat, inire valeret, et sanus adhuc Onoldi vivit.

*) *Ann. hist. nat.*, II, l. c.

§. XXVIII.

USUS EXTERNUS.

Ufus externus magni aestimandus non est, quamquam BREYNIUS refert, ruricolos prope Gedanum, cum notitiam lichenis acquirere cuperet, sibi narrasse, praeclarum illum esse vulnerarium, praecipue si recens et humidus cum optima cerevisia Gedanensi in mortario marmoreo contritus, admisso pulvere radicis consolidae majoris, ad fracturas ossium adhibeatur. Equum fracto crure, brevi tempore, scilicet sedecim diebus eo curatum esse affirmarunt *).

§. XXIX.

USUS TINCTORIUS.

Islandi, cum primis Borgarfjordenfes, cl. Clavio **) teste, lichene islandico lanas colore luteo inficiunt. Conspergunt pannos aliasque telas laneas undique hujus lichenis fragmentis, quae spinulis marginalibus iisdem facile adhaerent. Tum pannus tingendus convolvitur circa baculum, cortinae ferreae immittitur et adfusa aqua coquitur per sex horas, unde colorem saturate luteum, firmum nec aëri cedentem acquirit.

Mihi basin lichenis fere coccineam chartamque in quo lichen Islandicus diu fuerat asservatus, colore rubello tinctam saepius intuenti, in mentem venit tentare anne similis tinctura ex hoc, quam e lichene Roccella vel Parello obtineri possit? Sumimus itaque lichenis islandici uncias octo, calcis vivae uncias duas, salis alcali unciam dimidiam: haec mista odorem sparserunt ut spiritus salis ammoniaci cum calce viva paratus et post aliquot dies ut muria halecina. Deinde addidimus aquam calcis et lotii quantitatem aequalem sufficientem. Stetit hoc per tres menses nec se tantillum mutavit. Hoc tempore praeterlapso id colavimus et lenissimo igne evaporavimus. Evaporatum aqua destillata iterum solvimus, sed nec oleo tartari per deliqu. colorem coeruleum, nec cum acido colorem rubrum induit.

*) *Act. nat. curios. Obs.* 289. p. 510.

**) OLAFSENS *Reise 10m.* I. p. 37.

Hoc modo cum nihil profecissemus, aliam viam ingressi sumus, eam scilicet, quam HELLOTUS v. cl. ad manifestandum principium tingens, quod lichenibus inest, monstravit. Eo igitur auctore unciae duae lichenis vitro parvo injiciendae spirituique salis ammoniaci volatili et simul aequali portione aquae calcis vivae conspergendae sunt; additis deinde duobus pugillis salis ammoniaci vitrum religandum est vesica humida. Iam si lichen rubrum colorem producere valeat, fluidum e vase, etsi parva quantitate effundi potest, obscure rutilum est; eundemque colorem lichen ipse fluido evaporato accipit. Talem, si nec fluidum, nec planta ipsa induit, tincturam rubram ab ea non esse expectandam *). Ad hanc amissam nos quoque laboravimus sed frustra nec ullum utrobique observavimus ruborem. Alia itaque ratione evolutio particularum rubrum colorem praebentium tentanda est, quod autem nunc aliis relinquere cogimur.

Extractum aquosum lichenis islandici sicut etiam pulmonarii et rangiferini a pictoribus inter pigmenta brunnea adhiberi posse, picturae non inelegantes fidem faciunt, quas alicubi vidi. Impedit enim tenacitas mucilaginis, quo minus e penicillo non facile effluant; nec desunt pigmenta ejusdem fere coloris. Ad picturas tamen rudiores chartamve colorandam forte adhiberi possent.

§. XXX.

S U C C E D A N E A.

Cum lichen islandicus non ubique proveniat, quaeri potest an alii lichenes inveniantur, qui ipsi pro usu medico substitui queant. Pulmonarius prae reliquis hic in censum venit, quippe qui in pharmacopiis jamdudum civitatem consequutus est, et communi scriptorum materiae medicae consensu ad tabem, pulmonum ulcera, sputa cruenta, spirandi difficultatem, tussim siccam aliaque pulmonum vitia **) laudatur et a rusticis Suecis ad tussim pecu-

*) HELLOT *Faerbekunst übersetzt von KÄSTNER p. 300.*

**) MATTHIOL. *comm. in Diosc. Vener. 1565. p. 1039. CAESALP. de pl. p. 602.*

dum vehementiorem non sine successu adhibetur *). Verum enim vero experimenta supra §. VII. VIII. enarrata ostendunt, eum minus mucilaginosarum quam amararum et terrearum particularum continere; unde facile colligitur, eum magis ubi tonus restituendus vel robur solidorum augendum, quam ubi nutrimentum abundans et digestu facile requiritur, exhiberi posse. Lichen rangiferinus, quo tarandi tantopere delectantur et saginantur ad minimum nutriendi facultate islandico par, et hanc ob causam substituendus esse videtur; ast e §. IX. apparet, illum huic eo respectu vero cedere, contra autem vi mixtionis in aliis affectibus medicinam praeberere posse non contemnendam. Utriusque vires experimentis provide institutis curatius definire non abs re erit. Pro usu diætetico ab Islandicis sequentes lichenes islandico substituuntur.

1. *varietas* angustior et humilior, cujus supra §. II. mentionem feci, Isl. *Kloungur*, sed minus gratum habet saporem **).
2. *Lichen aculeatus* (vid. supra §. XI.) Islandis *Kräda*, in borealibus Islandiae copiose et fere lichene Islandico frequentius estur, quo sapore longe inferior et minoris venit ***).
3. *Lichen nivalis* LINN. Isl. *Mariugraus*, *Mundagraus*, islandico fere sapidior, dulcis cum grata amaritudine. Puls violacea. Parcius reperitur islandico †). Apud nos non crescit.
4. *Lichen proboscideus* LINN. Isl. *Geitnaskof*. Non nisi necessitatis casu estur; ut plurimum tantum usui tinctorio inservit.

§. XXXI.

EPILOGUS.

Hic pedem figo, meaeque dissertationi finem impono, qua insignem lichenis islandici efficaciam usumque multipli-

*) LINN. *amoen. acad.* t. VII. p. 383.

**) OLAFSENS *Reise rom.* I. p. 87.

***) *ibid.* et p. 230.

†) *ibid.* et *rom.* II. p. 106.

cem novis experimentis adstruere laudesque quam post b. OLAVIUM ipsi ill. a MYGIND, SCOPOLI, SCHOENHEYDER, TROMSDORF alique tribuerunt, confirmare annisum. Pluribus id observationibus, tam ab aliis fautoribus amicisque, quam me ipso factis, fieri potuisset; at, ne speciminis academici limites transgrederer, potiores tantum in medium protuli. Eadem causa quo minus cum aliis lichenibus experimenta instituerem eosque ratione indolis, mixtionis viriumque cum islandico conferrem, quod mihi proposueram, impedivit. Hunc itaque laborem in futurum tempus differre aliisve relinquere cogor. Ceterum quae in his pagellis minus plene minusque concinne prolata inveniet lector, ut aequi bonique consulat, etiam atque etiam rogo. Hanc veniam me ab aequis rerum arbitris facile impetraturum esse confido, quandoquidem secundum tritum illud, in magnis voluisse sat est.

IX.

DR. IOAN. BAPTIST. IOSEPHI DILLENII

DISSERTATIO

DE

LICHENE PYXIDATO.

M O G U N T I A E,

1 7 8 5.

P R A E F A T I O.

Quantum indefessum Materiae medicae studium ad felicem morborum curationem conferat, Medici practici saepius indies experiuntur. Licet Medicus omnium causarum morbos creantium notitia probe sit imbutus, si ad lectum aegrorum nullo contra morbum apto remedio armatus pervenerit, nullus plane erit practicus. Officinas ingenti medicamentorum farragine premi verum quidem est; non pauci tamen morborum, praecipue chronicorum, adhibitis etiam omnibus remediis, aut insanabiles manent, aut pertinaciter ac diutissime resistunt.

Itaque summa certe laude illorum virorum industria coronari meretur, qui in id omnes intendunt nervos, ut nobis medicamenta contra morbos hucusque vel insanabiles, vel adversus consucta remedia rebelles efficacia, in experimentis, quae in aegris instituerunt, fundata et certa, praesertim indigena innotescant. Exotica siquidem saepius tanti sunt pretii, ut ab illis, quibus curta est supellex, vix coëmi possint. Sic Celeberrimus D. Consiliarius aulicus CAROLUS STRACK, meus ad cineres usque venerandus Praeceptor, cui maximas pro suis in me beneficiis debeo grates, ubi medico contra morbum adversus quaevis remedia hucusque rebellem, qui singulis annis tot millia infantum occidit, tamque varias larvas induit, certum, ac tutum, in agro moguntinensi passim sponte nascens remedium, Jaceam nempe officinalem, quae viola tricolor Linnaei est, detexit atque communicavit.

Hujus acutissimi atque sagacissimi aetatis nostrae observatoris egregio exemplo incitatus mihi pro dissertationis themate selégi remedium ab antiquissimis temporibus contra tussim convulsivam celebratum, sed jam pridem non amplius usitatum, scilicet lichenem pyxidatum, eum in finem, ut tam efficax in tussi convulsiva aliisque pectoris morbis remedium in usum pristinum revocetur.

Dubia a Medicis circa lichenis pyxidati efficaciam mota me quidem non fugiunt; sed idem fatum permulta alia medicamenta saluberrima virtute praedita fuerunt perpessa. Clarum nobis exemplum praebet ipse cortex peruvianus. Verum sceptici ejusmodi Medici remediis recte uti ignorant. Nam Hippocrates *) dixit: *quae profuerunt, ob rectum usum profuerunt, quae autem nocuerunt, ob id nocuerunt, quod non recte adhibita fuerunt.*

Quamvis experientia medicamenti cujusdam vires optime demonstrat: tamen analysin chemicam non supervacaneam esse duxi, ut nimirum particulae lichenis nostri constitutivae, modusque operandi magis elucescant. In hoc labore versatissimus in re chemica D. Schlippe pharmacopoeus in hujate officina ab Aethiope dicta mihi summa dexteritate assistebat.

Lichen pyxidatus Botanicis quidem satis notus, et a celeberrimo quoque Dillenio ad vivum descriptus nulla egeret icone: sed libri hujus in manibus paucorum versantis, et in amplioribus bibliothecis vix obvii raritas, ad quem lector cognoscendae hujus plantae cupidus frustra remitteretur, me impulit ad, subjiciendam oculis accuratam lichenum, et pyxidati, et fimbriati, et cocciferi effigiem, quae omni descriptione prolixiori est potior.

Siquid utilitatis ex meo labore in aegros redundet, laetabor. Remedium commendo, quod multos sumtus non exigit, et in silvis prope Moguntiam laete abundat.

*) Hippocrates de arte.



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Thunberg sc.

DISSERTATIO

DE

LICHENE PYXIDATO.

Medici veteres quamdam pustularum rubicundarum diversis in locis, praeprimis vero in membris externis existentium speciem vocarunt lichenes seu impetigines, (germanice Flechten) et hanc morbi cutanei speciem curare studebant plantis quibusdam, quibus verosimiliter ob signaturam nomen lichenis imposuerunt, quia quidam eorum adspersiones ac tumores repraelentabant. Sic Dioscorides *): *λειχην* quae petris innascitur, et aliqui *βερον* appellant, ceu muscus roscidus petris inhaerens. Et Plinius **): *Lichen* vero herba omnibus his (remediis lichenis) praefertur, inde nomine invento. Nascitur in saxosis folio uno ad radicem lato, caule uno parvo, longis foliis dependentibus. Est aliud genus lichenis, petris tantum inhaerens, ut muscus, qui et ipse illinitur. Pyxidatus vero dicitur, quia infundibulum seu capsulam characeam refert, germanice *Düttchensmoos*, *Becherflechte*, *büchsenförmiges Erdenmoos*.

Tradita lichenis etymologia superest, ut recepto inter Botanicos systemati pressius insistens ea, quae circa lichenem ex botanica observanda veniunt, exactius determinem. *Lichen*, de quo scribo, quoad classem ad cryptogamicas, quoad ordinem ad algas, quoad genus ad lichenes, quoad divisionem ad scyphiferos est referendus. Haller corniculatis, Michelius corniculatis et pyxidatis, Dillenius coralloideis accenset.

Lichen pyxidatus, scyphifer, calyce integerrimo. Vid. Hagen histor. lichen. pag. 113. et figuram primam in tabula dissertationi annexa.

Lichen scypho infundibuliformi simplici. Haller *Histor. Helv. III. pag. 72. num. 1912.*

*) De materia medica Lib. IV. Cap. 53.

**) Historiae naturalis edit. in usum Delphini Tom. IV. Lib. XXVI. Cap. 3. pag. 447.

Lichen squamosus scypho integerrimo. Scopoli *Car-niol. II. pag. 370. num. 6.* Lichen pyxidatus simplex. Weis *Cryptogam. pag. 84.*

Lichen pyxidatus scyphifer simplex crenulatus tuberculis fuscis. Linn. *Spec. plant. pag. 1619. num. 60.*

Quamvis hic lichen pyxidatus a Linnaeo descriptus aequalibus cum pyxidato Hagenii viribus polleat, tamen praelucentibus Hagen, Scopoli, et Weis in denominatione botanica separandus est a pyxidato simplici, characteres enim Linnaeani in simplicem pyxidatum non quadrant, qui nullis tuberculis fuscis gaudet, sed caule simplici cylindrico in infundibulum integerrimum terminatur, totus polline adpersus adparet, lichen Linnaeanus vero referendus est ad tuberculatos Hagenii. Vid. Hagen *Hist. lich. pag. 117.*

Varietates respectu magnitudinis autem sunt.

α) *minor*, cauliculis brevissimis, scypho minori. Coralloides scyphis humilibus intus fuscis. Dillenius *Musc. pag. 86. Tab. XIV. fig. 11.*

Lichen pyxidatus minor. Vaillant *Bot. Paris. pag. 115. Tab. XXI. fig. 6.* Muscus pyxioides saxatilis. Loesel *Bor. pag. 50.*

β) *major* scypho insigni.

Lichen pyxidatus major. Vaillant *Lib. cit. f. 8.*

Muscus pyxioides terrestris. Loesel *l. c.*

Lichenem fimbriatum huc quoque referendum esse censeo pluribus commotus rationibus, quarum prima est par cum lichene pyxidato vis. Clarissimus enim Ioh. Phil. Vogler *) ait: Licheni coccifero, pyxidato, speciatim vero fimbriato adscribitur virtus specifica in tussi convulsiva, ferina dicta, si infantibus decoctum ejus, seu pulvis in zythogalo, vulgo cerevisia secundaria, (Nachbier) aliove conveniente vehiculo per aliquot dies porrigitur. Altera ratio petitur ex analogia; lichen fimbriatus enim a pyxidato differt solo margine denticulato seu ferrato. Dein notavit Buxbaum **), scyphiferorum ordini subordinatos lichenes videri meras varietates, cui consensum haud denegarunt

*) Dissert. inaugur. de muscis et algis notioribus valetudini servientibus.

**) Plantarum minus cognitarum Cent. II. pag. 12. Tab. VII. f. 1.

Haller *), Linnaeus **), et alii rei herbariae scriptores. Quarto Cl. Hagen ***) circa fimbriatum ipsum observavit, proles ex uno eodemque scypho fimbriato prodeuntes, pyxidatas, fimbriatas, crenatas, tuberculatas, et cocciferas fuisse, itaque totam fere scyphiferorum familiam in uno caule vidit habitantem.

Lichen *fimbriatus* scyphifer simplex denticulatus stipite cylindrico. Linn. Spec. plant. pag. 1619. n. 61. Vid. Fig. II. dissertationi annexa.

Lichen scyphiger infundibulis ferratis. Haller Hist. plant. Helv. III. pag. 72. n. 1615. 1917.

Lichen squamosus scypho ferrulato. Scopoli Carniol. II. pag. 370. Var. 7. Lichen pyxidatus fimbriatus. Weis Cryptogam. pag. 88. Var. e.

Fimbriato subordinatae varietates, quas annotarunt auctores, sunt sequentes:

α) margine prolifero.

Lichen squamosus scypho prolifero. Scopoli Lib. c. pag. 372, Var. II.

Lichen pyxidatus margine prolifero scabro. Vaillant Bot. Paris. Tab. XXI. f. 9.

β) centro prolifero.

Lichen infundibulis ferratis proliferis. Haller Lib. c. pag. 73. n. 1924.

Lichen pyxidatus prolifer. Hellwing Suppl. bor. pag. 42. n. 242.

γ) triplicato prolifero.

Lichen pyxidatus ramosus acetabulorum oris fimbriatis. Hellwing Lib. c. n. 244.

δ) prolibus pluribus ex caule scyphi prodeuntibus.

Lichen pyxidatus damae cornu divisura acetabulorum oris crispis. Hellwing Lib. c. n. 243.

Cum Linnaeus ****) Vogel †) Dale ††) et alii eandem

*) Hist. plant. Helveticar. III. pag. 70.

**) Critica botanica pag. 246.

***) Hist. lich. pag. 115.

****) Mater. med. pag. 229. n. 541.

†) Hist. Mater. med. pag. 110.

††) Pharmacol. supplem. pag. 44.

vim licheni coccifero adscribant, quae pyxidato adscribitur, et ratione figurae tantum per tubercula rubra, quae mihi et aliis videntur partes fructificationis, a pyxidato sese distinguat, hic eodem jure ac finibriatus locum occupat.

Lichen *cocciferus* scyphifer simplex integerrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis. Linn. Spec. plant. pag. 1618. n. 58. Vid. Fig. III. Dissertationi annexa.

Lichen scyphiger, infundibulorum fungulis coccineis. Haller Hist. plantarum Helvet. III. pag. 73. n. 1918.

Coralloides scyphiforme tuberculis coccineis. Dillenius Musc. pag. 82. Tab. XIV. fig. 7.

Lichen pyxidatus cocciferus. Weis Cryptogam. pag. 90. Var. f.

Lichen squamosus scyphifer, scypho coccineo. Scopoli Carniol. II. pag. 372. Var. 10.

Constat ex pyxide seu scypho cinereo albicante glabro, plerumque vero squamoso, stipitato, cujus margines gerunt fungulos, seu tubercula eleganter coccinea, praecipue sequentes observavit Hagen varietates.

α) tuberculis sessilibus.

Musculus multiformiter pyxidatus, apicibus coccineis. Hellwing quasimodog. pag. 36. n. 152.

β) tuberculis stipitatis.

Lichen pyxidatus acetabulorum oris coccineis et tumulentibus. Vaillant Bot. Par. pag. 115. Tab. XXI. f. 4.

γ) una parte marginibus tuberculosa.

δ) tuberculis totum discum replentibus. Schreb. Spic. Halense pag. 120. n. 1110. Var. 2.

Lichen squamosus acetabulis dense aggestis. Vaillant Lib. c. f. 10. Hujus tubercula confluere videntur.

ε) centro prolifero.

Lichen infundibulis proliferis, fungulis coccineis. Haller Histor. plant. Helvet. III. pag. 74. n. 1927.

Loca natalia, quae lichenes solent inhabitare, plerumque sunt talia, in quibus non multa alia reperiuntur vegetabilia. In saxis durissimis, in locis arenosis, in ericetis, in pinorum truncis, atque prope eorum radicem florent. Sic in monte vulgo Altsönig, in pinetis prope oppidum Mombach et Gonsenheim maximam lichenum istorum

copiam inveni. Lichenem pyxidatum mali trunco aliquando adnatum in Rauenthal videre mihi contigit.

Aestate, qua plantae reliquae vigent et florent, omnes lichenes luctuosi, omni fere vi vitae privati, perquam friabilesprehenduntur. Autumno autem ingruente frequentesque pluvias adferente, calore solis magis magisque aufugiente vigent atque crescunt, dum reliquae pereunt plantae. Adeoque tempore autumnali, praecipue pluvioso colligendus lichen pyxidatus ac debite prius ab adhaerentibus heterogeneis purgatus leniter statim siccandus est.

Progredior nunc ad chemicam lichenis pyxidati analysisin.

Experimentum I. Lichenis pyxidati a quisquiliis probe liberati, sicci, pulverisati uncias quatuor affudi aquae simplicis destillatae libras tres, atque in retorta, cui vas excipiens applicatum fuit, commissuris optime clausis, in balneo arenae leni igne destillationem institui, donec media pars aquae in excipulum transgressa esset. Aqua destillata odoris ingrati licheni analogi, atque saporis amaricantis erat. Illi, quod in retorta remanserat, aquae simplicis destillatae libram unam et semissem additi, ac in vase terreo ad consumptionem mediae partis aquae decoxi, et expressum in vase vitreo ad consumptionem dimidii evaporatum in cella per viginti quatuor horas posui. Perquirens nihil salis inveni, sed fundo vasis particulae quaedam mucilaginosae, saporis amarescentis affixae erant, filtratum atque expressum secunda vice per viginti quatuor horas in cella asservavi, sed nullas inveni crystallos.

Experimentum II. Lichenis pyxidati, puri, siccati, atque pulverisati uncias quatuor in retorta vitrea, commissuris undique probe clausis, primum leniori igni in balneo arenae, sensim vero majori et aperto usque ad summum ejus gradum, et retortae excandescentiam exposui. Hac ratione primo ignis gradu in excipulum quid aquosi laticis transiit, in secundo ejus autem gradu adparuit fumus densus, quocum adscendebat latex luteo colore tinctus, et mox disparuit fumus. Sed adaucto ad summum ignis gradu novus densior fumus una cum oleo empyreumatico rediit.

Cuncta transgressi laticis copia uncias duas et drachmam dimidiam ponderabat. Separato per separatorium hoc liquido olei empyreumatici unciam mediam, atque spiritus empyreumatici acidi unciam unam et dimidiam, mediumque scrupulum obtinui. Spiritus iste acidus empyreumaticus cum lixivio salis alcalini effervescebat. Finita hac effervescencia superficiei hujus spiritus innatarunt aliquot guttae olei empyreumatici. Guttae triginta hujus spiritus acidi empyreumatici saturabantur septem guttis olei tartari per deliquium. Diffraeta retorta ejus collo et ventris lateribus adhuc adhaerentis plane spissi olei empyreumatici quidquam deprehendi.

Experimentum III. Extractum aquosum primum, spirituosum secundum.

Lichenis pyxidati mundati, ficcati, et pulverisati uncias quatuor cum aquae destillatae simplicis libris tribus in vase terreo ad consumptionem medietatis coxi, decoctum colavi, et leni ignis gradu in vase stanno bene obducto inspissavi, in consistentiam extracti drachmas tres ponderantis.

Residuam istam lichenis portionem bene exsiccatam cum alcoholis vini uncis duodecim per viginti quatuor horas calore leniore balnei arenae in vase vitreo digessi, digestum post refrigerationem exprimendo colavi, et essentiam probe coloratam, sapore fortem, non multum a corticis peruviani essentia diversam, sed amaritiae majorem post affusas aliquot aquae guttas lactescentem obtinui. Alcohol superfluum destillando abstraxi, quod, si spirituosum excipias, nullius neque odoris neque saporis erat. Residua post destillationem massa resinosa erat, quae leni evaporatione in extracti ficcioris consistentiam abiit. Inde accepi extracti resinosi puri drachmam unam, quod saporis perquam amari erat expers odoris.

Experimentum IV. Extractum spirituosum primum, aquosum secundum. Cum alcoholis vini uncis sexdecim ejusdem lichenis ab omnibus antea sordibus bene purgati, ficcati, et pulverisati uncias quatuor per viginti quatuor horas digessi, et digestum exprimendo colavi, accepi probe coloratam, perquam amaram, priori non dissimilem essentiam. Partem spirituosam hujus essentiae in balneo arenae

abstraxi, id vero, quod in retorta remanserat, resinofum leni calore in consistentiam ficcā inspissavi, qua opera accepi extracti resinosi primi drachmam unam.

Residuum expressi cum aquae destillatae simplicis libris tribus ad medietatem usque decoxi, et expressi, expressum hoc per subsidentiam a quisquiliis purgatum ad humiditatis consumptionem usque inspissavi, qua ratione extracti gummosi drachmas tres accepi.

Experimentum V. Lichenis pyxidati puri ficci unciae quatuor in crucibulo operculo clauso validiore igne comburentur, quae reddebant cineris subtilissimi unciam dimidiam et duas drachmas. Cineres hi cum aqua destillata simplici elixabantur. Filtratum hoc lixivium in vase e terra porcellana facto supra ignem ad ficcitatem usque evaporatum salis alcalini fixi grana aliquot praebuit, quae affusis aliquot acidi vitriolici diluti guttis valde effervescebant. Operculi superficiei internae magna liquidi acidi, et olei empyreumatici copia adhaerebat, quod in destillatione sicca simul observavi.

Experimentum VI. circa lichenem cocciferum. Cuticulas coccineas in tuberculis hujus lichenis praeienses summo studio cultro separatas ponderis granorum viginti in mortario marmoreo in pulverem subtilissimum redegī, tanta olei tartari per deliquium quantitate humectavi, ut fieret magma. Per viginti quatuor horas quiescens aquae simplicis uncias tribus inde dilutum in loco tepido posui, qua opera liquidum laete rubrum accepi. Huic liquido gossypium aqua elutum indidi, visurus, an gossypium indelebili colore purpureo, ut dicitur, tingeretur: sed perpallido colore rubro tinctum inveni, etsi verum esset, colorem purpureum ex coccifero elici posse, tamen iste color non sine maximis sumtibus praepararetur, cum ingens lichenis cocciferi quantitas ad ejus praeparationem requireretur.

Experimentum VII. Ut de gradu adstringentiae lichenis pyxidati, quem cum nonnullis aliis plantis adstringendi vi praeditis comparatus obtinet, certior fierem, drachmas duas concisi corticis salicis, radicis gei urbani, quam nunc novi post antiquos ad fugandas febres intermittentes adhibent, theae boheae, foliorum rolarum rubrarum, lichenis

islandici, et pyxidati sex aquae calidae unciiis infudi, post viginti quatuor horas infusum rosarum rubrarum, filtro trajectum colorem profunde rubrum, theae boheae luteum, corticis falicis luridum, radicis gei urbani fuscum, lichenis islandici minus flavescentem quam pyxidati colorem ostendit. Unicuique istius infusi unciae solutionis vitrioli Martis drachmae duae, quae ex vitrioli Martis drachmis tribus, et aquae simplicis uncia una et dimidia facta erat, affusae infuso rosae atramentarium, radicis gei urbani violaceum, corticis falicis subnigrum, lichenis islandici minus fuscum quam pyxidati colorem dabant.

Duabus reliquis cujusvis infusi unciiis una carnis bubulae drachma immittebatur. Post quadraginta octo horas caro ex infuso theae boheae primum, ex lichenis pyxidati secundum, ex corticis falicis tertium, ex radicis gei urbani quartum, ex lichenis islandici quintum, ex rosarum rubrarum infuso denique ultimum constrictionis gradum ostendit. Eamdem igitur adstringentiae rationem cum carne non observarunt, quam quoad nigrum colorem cum solutione vitrioli exseruerunt. Ex hoc elucet, unam hanc alteramve vim adstringentem dijudicandi methodum in magno adhuc discrimine versari.

Experimenta jamjam relata licheni pyxidato *primo* quid specifici, *secundo* maximam mucilaginis copiam, *tertio* principium amarum resinosum inesse ostendunt. Si nunc observationes inferius adferendas et chemicam disquisitionem considero, atque naturam morborum, quibus mederi experientia docet, comparo, facile vires hujus lichenis polychrestas possum perspicere. Nam

1) lichen pyxidatus propter mucilaginis copiam uti lichen islandicus *) nutrit, acrimoniam quamcumque obtundit, temperat, partes solidas erosas demulcet, inspissata et indurata emollit ac solvit.

2) principium vero amarum tonicam roborantem vim exercet. Adeoque in morbis, qui ab acri rodente et commovente solida proveniunt, praestantissimum est auxilium.

*) In Islandia, ubi *Fiaellagrasis* vocatur lichen Islandicus, jam diu alimentum existit.

Specificum vero et usu tantum probatum in tussi convulsiva optimum est adhuc cognitum remedium.

Videamus nunc, an lichen pyxidatus vim illam specificam contra tussim convulsivam possideat, quam illi tum antiqui tum recentiores tribuunt auctores. In plurimis aliis morbis a miasmate ortis habentur specifica, uti contra miasma febris intermittens cortex peruvianus, contra crustae lacteae miasma jacea, contra syphilitidem mercurius. Cumque tussis convulsiva a suo miasmate producitur, suum quoque habebit specificum. Sic Celeberrimus D. P. STRACK *) jam dixit: Credibile est, esse quodpiam medicamentum specificum, etiam quod crudum istius morbi (tussis convulsivae) miasma citius sive alterare, sive expellere queat. Verum de eo etsi quidem rationalem suspensionem habeamus, nihilominus perfecta adhuc experientia caremus.

Optimum remedii specifici criterium est, si adhibitum similes aemulatur crises, quas natura in morbo sibi relicto facit. Scimus tussis convulsivae crisin muci cocti excretionem per os esse; jam vero observationes circa lichenem institutae ostendunt, quod in variis aliis pectoris morbis hoc remedium pituitam et mucum coquat ac expellat. Nonne ergo credere fas est, idem in tussi convulsiva facere lichenem pyxidatum?

Vetustissimi jam Medici algas e. g. Jungermanniam (epiphyllam) Marchantiam (polymorpham) Marchantiam conicam, lichenem islandicum, lichenem pulmonarium, lichenem plicatum, byssum jolithum **) ob suam pectoris morbos curandi virtutem commendarunt: longe igitur potiori jure licheni pyxidato locum inter efficacia ad levandos pectoris morbos remedia vindicare fas erit. Siquidem non veteres tantum, sed et recentiores lichenis pyxidati efficaciam in tussi convulsiva, aliisque speciebus praedictarunt atque institutis experimentis comprobarunt.

Willis ***) tantam in hoc remedio contra tussim con-

*) Dissert. de tussi convulsiv. p. 19.

**) Vogler Diss. de mulcis et algis notioribus sanitati servientibus p. 17. et seq.

***) De operatione medicamentorum p. 120.

vulsum jam posuit fiduciam, ut de eo sequentia diceret: Inter multa hujus generis remedia duo haec sequentia quibusque aliis praeferruntur et in primis usurpari solent. Viz ut mulcus pyxidatus ejusque varia praeparata et compositiones intus sumantur, atque si ulteriori medela opus fuerit, ut terriculamento quodam adhibito, puer laborans in subitum timorem conjiciatur, quodsi hujusmodi administrationibus successus optatus defuerit, ptisanæ, syrupi, julapia aut decocta, aliaque pectoralia rejiciuntur, et non raro a medicamentis quibusque aliis desistitur, expectando, donec morbus vel demum sponte terminetur, vel propter succedentem anni τροπήν sanetur.

At periculosum et inane est consilium, dum Willis timorem pueris tussi convulsiva vexatis incutiendum suadet. Per illum enim non destruitur miasma tussis convulsivæ, sed potius impeditur crisis, atque etiam si fortiore per timorem excitato spasmo alter solveretur spasmus, cura tamen haec, si ita nominari meretur, modo esset momentanea, et ipsa tussi convulsiva peiores morbos posset producere.

C. Bauhinus et Rajus *) primi fuerunt, qui lichenem pyxidatum in cerevisia coctum contra atrocem hunc morbum tussim convulsivam adhibuerunt, ejus usum vero in tussi convulsiva Dillenius **) qui in describendis plantis cryptogamicis omnes antecellit, Linnaeus ***), qui licheni coccifero quidem hanc vim tribuit, sed ex antecedentibus patet, lichenem cocciferum a pyxidato non differre, Huxham ****) Forbes †) Cullen ††), qui simul observavit lichenis pyxidati decoctum palato infantum quam maxime accommodatum esse, Dale †††), Vogel ††††), Schulzius *)

*) Hist. plantar. universalis.

**) Hist. mulcor. in praefatione.

***) Mater. med. p. 229. n. 541.

****) Volum. I. pag. 99.

†) De tussi pag. 82.

††) Recensetur in Cl. Zode medicinischirurgischer Bibliothek II. Th. S. 113.

†††) Pharmacolog. Supplem. p. 44.

††††) Histor. Mater. med. pag. 110.

*) Mater. med. pag. 396.

Home *) Loefseke **) et plurimi alii auctores magis comprobant.

Inter recentiores van Woensel ***) tussim convulsivam Petropoli epidemice grassantem hoc remedio feliciter curavit. Quadraginta pueri, quinque et septem annorum nobiles militiae tirones, quorum sanitati van Woensel praeest, hac tussi epidemica cum periculosissimis symptomatibus conjuncta infestabantur. Paroxyimi ipsius tussis irregulares, et perquam frequentes, sputa saepius sanguine mista, saepius sincera sanguinea erant, aegri delirabant, et omnia symptomata tam periculosa erant, ut vel apoplexia lethalis, vel haemorrhagia larga, vel tabes esset metuenda. Omnia contra tussim convulsivam decantata remedia incassum adhibebantur, et quamvis van Woensel omnes alias consuetas tentaret methodos, tamen id tantum effecit, ut vehementiam symptomatum mitigaret, et quam maxime timendum erat, ne ante veris reditum media aegrorum pars diem obiret extremum. Fortuna bona contigit D. van Woensel, ut lichenem pyxidatum contra tussim convulsivam a Linnaeo commendatum legeret, hoc momento lichenis pyxidati uncias duas in aquae fontanae libra una decoxit et colaturae syrupum menthae addidit. Aegrorum unicuique sub vespere uncias duas hujus decocti praebeuit, quo insequente nocte tussis et caetera symptomata mitigabantur, continuato autem hujus decocti usu intra octo dierum spatium tres aegrorum partes sanitati pristinae restituebantur, sed isti, qui pessime se habuerunt, primo intra dies quatuordecim convaluerunt, unus tantum (forsan ad tabem jam dispositus) elapsis aliquot mensibus tabe fuit extinctus. Haec experientia cum veterum observationibus juncta clare docet, lichenem pyxidatum specificum contra tussim convulsivam remedium, et in ea adhibendum esse.

*) Princip. Medicin. pag. 122.

**) 1a Edit. noviss. Mater. med. pag. 504.

***) Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche praktischer Aerzte, VI B. I St. 186. S.

Ipie adeo naturalis animalium instinctus et sequentes a me institutae observationes docent, lichenem pyxidatum in aliis quoque pectoris humani morbis, ubi spasmus simul adest, egregii usus esse.

Casus I. Femina septuaginta annorum, decem retro annis phthifica, denuo haemoptoe vexatur, post suppressum sanguinis sputum tussis antiqua multum exacerbat, irrita, nihil cum euphoria educens; exhibita medicamenta, quae sputum liberaliter educerent, nihil profecere, febris exasperatur, sudor nocturnus et alvus liquida vires destruunt. Exhibetur nunc decoctum lichenis pyxidati, quod sputum haecenus suppressum facile eduxit, respiratio fit liberior, diarrhoea filet, et vires redeunt. Phthisis quidem corpus consumere pergit, verum cum incommodis multum imminutis mortem omnium aerumnarum finem tranquille expectat.

Casus II. Mulier 35 annorum summopere hysterica tussi sicca per quatuor septimanas vexatur. Medicamenta, ut vocant, expectorantia nil profunt. Ad spasmos in corpore hoc consuetos leniendos antihysterica et laudanum Sydenhami propinantur, quae aliquod licet leve lenimen praestant. Exhibito autem decocto lichenis pyxidati sputum coquitur, sine magno molimine educitur, nox fit quietata, et sine medicamentis antispasmodicis tussis, quam nervosam vocant, sanata est.

Casus III. Sartor 28 annorum pallidus, macilenti corporis, festo paschatis anni 1784 saltu et potu spirituofo exaestuans, haemoptysi vexatur, una venaesectione et quiete sedata haec est. Ast septimo die Iunii a 1785 ardore, pectoris oppressione, et anxietate corripitur, tussiendo sputa strigis sanguineis mista primo, dein sincerum quoque sanguinem ejicit, octavo autem morbi die absque remediis sputa sanguinea quidem non amplius adparent, tussis tamen sicca et oppressio pectoris manent. Dedi lichenis pyxidati decoctum, sputum coquitur et expellitur, op-

pressio et tussis filet, ac continuato hujus decocti usu fit torolus.

Casus IV. Infans quatuordecim hebdomadum dira tussi ad suffocationem usque vexatus toto corpore ob perpetuos pulmonum concussus calens raro cruda tussiendo expellit sputa. Inter respirationem stridor a muco in arteria aspera accumulato auditur. Nares siccae obstructae, alvus frequens, sincera, viridis, corpus pallidum viribus fractum. Dedi linctum emollientem, clysmata emollientia cum vitello ovi. Post haec alvum viridem mucosam sequitur flava pultacea, usu hujus linctus mobilis facta pituita per alvum et os secedit, liberior fit respiratio, at continuatur tussis sicca. Dedi decoctum lichenis pyxidati, sputa prodeunt cocta, tussis fit rara, et nunc filet. Infans viribus fractus, emaciatus evadit robustus et pinguis.

Possem hic plures in praxi observatos casus adferre, sed experimenta a Celeberrimo et Expertissimo D. Professore STRACK longe perspicaciori observandi ratione in tussi, in phthisi, aliisque corporis consumptionum speciebus circa lichenem pyxidatum instituta ejus efficaciam clarius et certius comprobant.

Cum instinctus animalibus a natura datus homines ad cognitionem virium plantarum saepius induxerit, mihi quoque ex arte veterinaria non incognitum fuerit, oves tussi saepius infestari, ad opiliones, qui oviariae per multos annos operam navarunt, accessi, sciscitaturus, num quem in ovibus suis tussi vexatis ad quasdam herbas, et ad quas instinctum observassent, quibus tussim levare solerent. Quidam ejusmodi opilionum, qui septuagenario major erat, ovesque a pueritia et ultra quinquaginta jam annos paverat, respondit, se observasse, oves tussi laborantes, ubi per silvas agerentur, algas albescentes (*weisse Moos*) avidis dentibus carpisse, quarum frequentiore post esum tussis sensim levata penitusque sedata fuisset. In illa vero vicinia silvarum per quas hic senex pastor oves suas agere consueverat, cum crescentem copiose lichenem pyxidatum deprehenderim,

quem specifico nomine suo quidem homo rei herbariae rudis appellare nesciit, facilis mihi conjectura fuit, oves illas lichenem pyxidatum tam avide carpisse, illiusque virtute convaluisse.

Si celeberrimi ac Expertissimi D. Professoris STRACK observationes circa lichenem in phthisi institutas, et feminae phthificae casum antea positum confidero, lichen pyxidatus contra phthisin omni jure est praedicandus. Quamvis dirum hunc morbum ôpe illius e radice nequeam tollere, mihi tamen hoc remedium haud omni laude videtur carere, si in morbo tanti discriminis aliquod saltem levamen afferat. Omnibus contra phthisin remediis antepondere audeo: balsama enim stimulando et calorem inducendo in hoc morbi genere nocent, oleosa, uti sperma ceti, et alia, quae adhiberi olim solebant, ventriculum adgravant, et debilitant; lichen vero pyxidatus horum omnium vitiorum expers blande nutrit, amaritiae, lenique sua vi antiseptica humores condit, sputa emollit, et promovet, in diarrhoea, quae sub finem phthiseos accedere solet, mucilagines et antiseptica laudantur. Quis ergo remedium velut inutile poterit improbare, quod utramque virtutem possidet, quae de lichene pyxidato constat. In phthisi nondum inveterata, praesertim quando puris excretio minus succedit, decoctum lichenis cum melle, quod simul vi detergente, ut ajunt, gaudet, egregii usus est. Non minus in catarrho fauces et laryngem a muco acri optime tuetur, et muci excretionem promovet.

Frequens lichenis pyxidati contra febres intermittentes usus in Thuringia celebratur *), quod mihi etiam non absque omni ratione fieri videtur, cum resinosum lichenis hujus extractum maximam cum extracto corticis peruviani similitudinem habeat, et Huxham **) de pertussi puero-
rum dicat: *Lichen pyxidatus si quid valeat, propter vim adstringentem, et ad naturam corticis peruviani aliquanto acce-*

*) Bruckmann Epist. itiner. Cent. I. epist. 57.

**) Volum. I. pag. 100.

dentem valet. Mihi quidem experientia propria circa hoc deest, ast oblata occasione in stadio cruditatis febris intermittens, ne salutare, quas natura facit, crises licheni meo temere tribuam, experimenta instituiam.

Plurimas plantas ab insectis et vermibus depasci deprehenditur; sed lichen pyxidatus, aliaeque plantae cryptogamicae ab his immunes sunt, atque intactae relinquuntur. Quo jure ergo lichen pyxidatus, praecipue ob amaritiam vermibus inimicam anthelminticis accensendus sit, iudicio lectoris relinquo.

Willis *) sequentes contra tussim convulsivam praescripsit formulas, quae in morbis quoque aliis, circumstantiis mutatis, praescribi possunt.

℞. Musci pyxidat. pulverifat. drachm. duas.
Sacchari candid. scrupul. un.
Mis. divide in 3 vel 4 part. aequal.
Sumatur dosi vespere et mane cum vehiculo apto.

℞. Musci pyxidat. drachm. duas
Lact. sulph. scrupul. duos
Pulv. femin. anis. scrupul. unum.
divide in 6 pulv.
Sumatur dosi vespere et mane cum vehiculo idoneo.

℞. Musci pyxidat. drachm. un. *
Coque in lact. s. q. pro una dosi.
Sumatur vespere et mane.

* Van Woenfel praescripsit duas uncias.

Quibus lac non congruit, aut minime prodest, paratur ejus decoctum cum aqua fontana aut hyssopi, aut alia pectorali, et detur ad uncias duas vel tres bis (saepius in die) et dulcorando cum saccharo aut syrupo idoneo.

℞. Musci pyxidat. unci. unam, coque in aquae cujusdam pectoralis libris duabus ad medietatem. Colaturae adde

*) Libr. cit. pag. 121.

Sacchari candid. libram unam, et evaporet leni calore ad consistentiam fyrupi.

Cum hoc remedium nullo modo sit periculosum, dosis ejus augeri, et formulæ v. g. in electuarium cum conservis convenientibus v. g. hyssopi, salviae, pro aegri circumstantiis, possunt mutari. Haec mihi sufficient. Habent Practici multiplicem intelligendi occasionem, numqua salus exinde sit expectanda, et quo in morborum genere possit ulterius cito, tuto, atque jucunde proficere.

X.

DE

V I T R I O L O A L B O

EIUSQUE

USU MEDICO ET CHIRURGICO.

DISSERTATIO INAUGURALIS,


QUAM

IN ACADEMIA GEORGIA AUGUSTA ANTE QUINQUEN-
NIUM DEFENDIT, NUNC PASSIM CORREXIT AC
RECENTIORUM OBSERVATIS AUXIT

DR. CAROLUS HENRICUS STOLTE

MEDICUS APUD LONGOSALISSENSIS.

I 7 9 2.



S E C T I O P R I O R.

H I S T O R I C O - C H E M I C A.

§. 1.

Vitriolum dicitur sal medium metallicum, ex connubio acidi vitriolici cum calce metallica natum.

§. 2.

Cum omnibus quidem metallis et semimetallis acidum vitriolicum conjungitur, licet id in nonnullis difficilius impetretur; omnium vero maxime affine est Zinco *), quocum Vitriolum constituit, in cujus indolem et virtutes, quantum vires et otium permittunt, nunc inquirere tentabo.

§. 3.

Vitriolum album, seu *Zinci*, purum, crystallos praebet perlucas, prismata referentes quadrangularia, quorum duo latera opposita sunt latiora. Pyramis terminalis similiter quadrilatera. Plerumque tamen in prismatis duobus angulis oppositis levis observatur defectus, unde scilicet oritur hexangula **).

§. 4.

Saporem linguae imprimit adstringentem, quem mox subdulcis, at nauseosus, excipit.

§. 5.

Aëri per aliquod tempus expositum libero multum aquae suae indeque pelluciditatem et figuram perdit, ac tandem, salua tamen albedine, fatiscit.

§. 6.

In 50 caloris gradu secundum scalam Fahrenheit. SPIELMANN ***) in unc. I. aquae destillatae grana 210,

*) BERGMAN, Nov. Act. Upsal. Vol. II. p. 159. fqq.

**) BERGMAN, Opusc. phys. et chem. Vol. II. de miner. Zinc.

§. 5.

***) Institut. chem. p. 53.

cl. WENZEL *) in 10° thermometri Reaumuriani unciam hujus Vitrioli crySTALLISATI soluit. Observante vero BERGMANO **), 100 partes ejusdem, ut solvantur, aquae destillatae mediae temperaturae 228 postulant; ferventis autem multo minor quantitas requiritur.

§. 7.

Flammae expositum facillime liquefit, spumat et valde intumescit, ac tandem massam relinquit refractariam, quae non, uti flores zinci, phosphorescit, cum sale microcosmico et boracis facile et cum effervescencia sese conjungit, cum alcali minerali primis momentis vehementer effervescens coit, dein vero quoad parvam modo partem huic jungitur ***).

§. 8.

Destillationi subjectum, praemisso phlegmate et tenui acido sulphureo, valde concentratum acidum vitriolicum exhibuit †).

§. 9.

Ex BERGMANI ††) experimentis 100 partes continent zinci calcinati 20, acidi vitriolici 40 et aquae crySTALLISATIONIS etiam 40. Nam leni calcinatione centenarius 40 circiter aquae libras amiserat, et post trium horarum candescentiam non nisi 20 calcis zinceae restabant, libris 17 zinci metallici aequiparandae.

§. 10.

Si solutioni 100 partium Vitrioli zinci instillatur alcali phlogisticatum, mox secernuntur moleculee albae, quae post completam praecipitationem collectae, lotae et exsiccatae pulveris exhibent e flavo albi partes 83. Iam cum zinci metallici partes 100 cum alcali phlogistico porrigant

*) von der Verwandtsch. der Koerper, p. 441.

**) §. cit.

***) BERGMAN, l. c. §. 2.

†) HELLOT analys. chem. du Zinc; in Memoir. de l'Acad. des Sc. à Paris 1735. p. 28.

††) l. c. §. 5.

495, et sic zinci pars una fere 5 praecipitati exhibeat: vel inde apparet, in 100 partibus Vitrioli zinci circiter 17 metalli contentas esse *).

§. 11.

Acido salis solvitur quidem Vitriolum zinci, sed affuso spiritu vini e solutione plane non mutatum praecipitatur. Unde tam major zinci cum acido vitriolico affinitas, quam simul Vitrioli zinci in spiritu vini indissolubilitas elucescit **).

§. 12.

Ab acido sacchari ***), ut terris et salibus alcalinis, nec non alcali volatili caustico †) Vitriolum zinci certe, fortassis etiam acido acetosellae ††) decomponitur.

§. 13.

Vitriolum album vel natura, vel arte paratum occurrit. *Nativum*, rarius quidem, plerumque stalacticum, e pseudogalena fatiscente ortum, in fodinis Goslarieusibus (ubi *Ioekel* vocatur †††)) aliisque zinci mineris divitibus *) reperitur. Tum vero etiam forma plumosa e parietibus fodinarum efflorescere, nec non instar crustarum varii ambitus illis adhaerere dicitur **). Vix unquam purum est, sed vitriolo vel ferri, vel cupri, vel utroque simul contaminatum.

§. 14.

Arte paratur triplici modo.

I. Purissimum obtinetur, dum zincum indicum in acido vitrioli diluto solvitur. Plerumque partes tres acidi

*) BERGMAN, §. cit.

**) BERGMAN, Vol. III. de attract. electiv. §. 67.

***) Id. Vol. I. de acido sacch. §. 22. et de attr. elect. §. 67.

†) Id. de attr. elect. §. 12.

††) ibid. §. 67.

†††) SCHLÜTER, gründlicher Unterricht von Hüttenwerken, p. 471. 476.

*) NEUMANN praelect. chem. ed. ZIMMERMANN, p. 1823. HILL. hist. of the Mat. med. p. 136. WALLERIUS syst. mineral. Vol. II. p. 24.

**) HILL, l. c. LEWIS, hist. of the Mat. med. Ed. 2. p. 597.

concentrati anatica portione aquae diluti zinci unam, sub leni calore facile *) ac sine ulla resistantia suscipiunt. Sic HELLOT **) unciis tribus olei vitrioli cum aequali aquae quantitate diluti zinci drachmas sex et scrupulum soluit. CL. WENZEL ***), ut grana 206 solvantur, modo unciam dimidiam requiri dicit. Observante BERGMANO autem haec olei vitrioli quantitas tantum drachmas duas suscepit. Solvitur zincum magna cum effervescencia, qua durante vapores inflammabiles, allium redolentes, attolluntur, qui, admota candela, cum explosione inflammantur. Solutio dein ad pelliculam evaporata et in loco frigido posita crystallos exhibet §. 3. descriptas. Fere idem evenit, si loco metalli calx, seu flores zinci in acido vitriolico soluuntur.

§. 15.

2. Raro ab aquis in fodinis, in quibus pyrites et minerae zinci hospitant, obviis per cocturam, seu inspissationem, filtrationem et crystallisationem hocce Vitriolum, plus minus purum, conficitur. Sic ab aquis in fodina magni Cuprimontii, seu Fahlunensi, tres varietates Vitrioli albi separari posse, colore aliquantisper discrepantes, refert WALLERIUS †).

§. 16.

3. Tertius idemque usitatissimus Vitriolum album parandi modus fit per ustulationem et sequentem elixationem minerarum pyritosarum zinco diuturnum. Maxima conficitur hac methodo quantitas e minera montis Rammelsberg, Goslariae vicini, quae vulgo *Rammelsbergisches Bleierz* audit, et praeter plumbum copiosum, etiam zincum, ferrum,

*) Paullo difficiliorem hujus Vitrioli factitii praeparationem esse dicit WALLERIUS l. c. cum in gelatinam solutio abire soleat, vel zincum sub evaporatione praecipitari. Cui vero alii refragantur, ut cel. GMELIN Einl. in d. Chem. §. 162. et 555. cel. WIEGLEB Handb. der Chem 2. B. p. 181 ERKLEBEN Chem. §. 766. Nec mihi ejusmodi gelatinosum coagulum vel praecipitationem observare licuit.

**) l. c.

***) l. c. p. 72.

†) l. c.

cuprum et argentum fovet. Omne Vitriolum album venale et in nostris officinis obvium hujus est profapiae.

Detectum fuit ibidem anno 1570 a Duce IULIO, qui illi tum temporis nomen *Erzalaun* imposuit *). Vera ejus compositio usque ad annum 1735 latuit **). Tum vero BRANDT ***) duas evulgavit observationes ejusdem naturam denudantes. Expertus scilicet est, hunc salem calcinatum et dein cum pulvere carbonum et cupro tractatum orichalcum efficere; deinde zincum acido vitriolico solutum salem ejusdem indolis, ac illud vitriolum album, gignere. Eodem anno HELLÖT †) probavit experimentis, Vitriolum album enixum esse zinco et acido vitrioli.

Modum, quo Goslariae paratur, fuse descripsit SCHLÜTER ††). E minera nempe illa, ut paucis hic referam, prius ustulata extrahitur cum aqua quidpiam vitriolici, quod extractum alii minerae adhuc calidae adfunditur et sic tertia vice iteratur, ut justam acquirat saturationem. Postmodum hoc lixivium vitriolo dives a minera separatum in aheni quiete relinquitur, ut subsideant impuritates. Tunc in cacabis plumbeis ad pelliculam evaporatum decantatur in alios, ut inde crystalli formentur. Hae crystalli in aheni cupreo liquantur, iterumque solutio ab heterogeneis innatantibus despumando liberata ad nonae partis jacturam inspissatur. Quo facto in arcis ligneis spathulis agitur, usque dum debitum consistentiae gradum acquirat Vitriolum. Tandem doliis immittitur, ibique mora instar sacchari albi indurescit.

§. 17.

Hoc modo autem paratum Vitriolum album non pu-

*) SCHLÜTER, op. cit. p. 597.

**) Mirum sane, veram ejus naturam tam diu in Germania latuisse, cum jam ante annum 1330 in fodinis Carinthiis quotannis octo millia centenariorum sub nomine Vitrioli zinci parata fuerint. vid. Bergbaukunde, 1 B. 1789. S. 152.

***) Abhandl. von den Halbmetallen; in Act. Upsal. T. IV. vid. ill. CRELL neues chem. Archiv, 2 B. p. 307.

†) l. c.

††) l. c.

rum *), sed aliis metallis, seu vitriolis magis minusve inquinatum esse, omnes chemici asserunt. Sic, ut aliquos modo memorem, BAUMÉ **) contaminatum vitriolo ferri esse dicit. Cel. WIEGLEB ***) saepius adhuc ferrum et cuprum illi inesse contendit; et NEUMANN †), WALLERIUS ††), SPIELMANN †††. HAGEN *) MACQUER **) hisce addunt etiam plumbum.

§: 18.

Ac ferri quidem praesentiam, sicuti etiam cupri, vel utriusque simul, interdum color prodit, nec minus, quamvis inquinamentum quartam non superet partem, figura spathacea ***). — Solutio hujus Vitrioli, affuso decocto adstringente e. g. gallarum, nigrescit. — Pars ochrae flavae, vel sponte praecipitatae, si solutio per aliquot tempus in leni digestionem quiete steterit, vel adjecto zinco copiosius extricatae, post exsiccationem, magneti obsequiofam sese praestat. — Alkali phlogisticatum prodit ferrum coeruleis moleculis, quae sub prima instillatione distinctae apparent albidis immixtae, si nimirum liquor nullo modo quatitur †).

*) Contendit equidem BRANDT l. c. hoc Vitriolum album nihil ferri sibi admixtum habere, quia hoc a zinco arctiori affinitatis vinculo acido vitriolico juncto e connubio cum acido vitrioli inito praeceptum datum fuisset. — Quod quidem omnino etiam tum eveniret, si zincum tanta copia mineris inesset, quanta ad omne istud ustulatione a phlogisto liberatum acidum suscipiendum requiritur. Cum vero zinci quantitas huic acido saturando sola non sufficiat: non potest non reliqua acidi pars, salvis affinitatis legibus, etiam cum ferro aliisque sibi obviis metallis coire et sic varia constituere vitriola, quae nostro ex modo memorata ejus confectione ex parte admixta manent.

**) Erläuterte Experimentalchemie, übers. v. GEHLER 3 Th. p. 489.

***) l. c.

†) l. c. p. 1835.

††) l. c.

†††) l. c.

*) Lehrb. der Apothekerk. 1786. p. 686.

**) Chymisches Wörterbuch, von LEONHARDI übers. 2 Aufl. 3 Th. p. 226.

***) BERGMAN, de min. zinc. §. 5.

†) ibid.

§. 19.

Cupreum inquinamentum interdum, praeter colorem, prodit sapor nauseosus. — Ferrum politum huic Vitriolo affricatum, vel ejusdem solutioni immissum mox cupro obducitur. — Praecipitatum mediante zinco factum et edulcoratum spiritum alcalinum adfulum coeruleo tingit colore. — Alkali phlogisticatum fulco rufis prodit moleculis.

§. 20.

Plumbum vero huic Vitriolo inesse, jure a pluribus in dubium vocatur. Licet enim negari non possit, acidum vitriolicum etiam plumbum, minerae Goslariensi uberius admixtum, aggredi; vix tamen probabile videtur, inde enatum vitriolum saturninum nostro junctum manere cum illud, teste cel. HACEN *), difficillime, vel plane non aqua suscipi queat. Ideoque propius a vero abesse videtur, illud jam in vasis elixationi minerarum destinatis sedimento mixtum relinqui. — Aliud plumbeae indolis signum, quod KAUTMANN **) a sapore subdulci desumfit, per se nihil probat, cum etiam Vitriolum album factitium hunc saporem linguae imprimat.

§. 21.

Ante vero, quam in usum medicum vocatur, ab istis peregrinis metallis liberatum sit, plerumque requiritur. Atque hoc impetratur, si solutio Vitrioli Goslariensis zinco, vel raso, vel granulato, vel in frustula dissecto adfunditur, et post digestionem et filtrationem, loco frigido crystallifatur. Ad depurandas Vitrioli albi ℥vj aquae ℔j solutas additamentum ℥℔ zinci rasi praescribit Pharmacop. Edinb. Certius autem et melius id impetratur, si major zinci quantitas additur et solutio usque eo fervida servatur, donec nullo amplius praecipitato ochreo obscuratur, perlucida manet et praecipitatum ab alcali fixo productum candidissimum adparet. Sic, mediante zinco, acido vitriolico prae reliquis metallis affini, omne inhabitans et cuprum, et ferrum, praecipitatur, et *Vitriolum album exit depuratum*.

*) Experimentalchemie; affix. Tab. IV.

**) l. c. p. 1836.

§. 22.

Perperam igitur illud Vitriolum album vocant depuratum, quod solutione, filtratione et crySTALLIFICATIONE, seu inspillatione, licet pluries repetita, solummodo a sordibus immixtis et pauxillo ochrae ferreae sponte praecipitatae liberatum fuit. Tale Vitriolum album purificatum est veterum *) et recentiorum *Gilla* (*Gilla vitrioli*, *f. Theophrasti*, *f. Paracelsi*, *f. Sal vitrioli* etc.) quam vero nonnulli **) etiam e Vitriolo, modo coeruleo, modo albo, rarius viridi, plus minus calcinato, mediante solutione et crySTALLIFICATIONE, pararunt. Iam cum Vitriolum mixtum tam solvendo, quam calcinando, licet saepius iteretur utrumque, a metallis inquilinis omnino liberari nequeat; cogitur, Gillam a vitriolo, ex quo confecta fuit, vix, vel parum fuisse diversam semperque plus minus labe venerea, vel martiali laborasse, quamvis cl. HURLEBUSCH ***) illam calcinatione paratam, non obstante vi, quam exseruit, emetica, pro Vitriolo zinci puro venditare studeat. Plura de his nosse cuius interest, adeat ipsos auctores citatos, nec non IUNGKENIUM †).

§. 23.

Varias etiam Vitriolum album intrat formulas et compositiones officinales, quarum nonnullae in recentioribus quoque Pharmacopoeis magis vel minus mutatae et emendatae occurrunt.

Sic praecipuum ingrediens est *Lapidis medicamentosi Crollii* ††). Fluribus inest *Collyriis* s. aquis ophthalmicis;

*) PENOT, Theophrast. Vademec. *Magdeb.* 1607. p. 118. BEGUIN. Tyrocin. chym. *Colon.* 1615. p. 158. M. HOFMANN, *Prolus. de remed. delect.* p. 125. MANGET, *Bibl. pharmaceut.* T. II. LEMERY, *Pharmac. univers.* p. 230. Ej. *Cours de chym.* p. 472. ERNSTING, *Nucl. totius medic.* p. 386.

**) ANGELUS SALA, *Op. med. chym. Frst* 1647. p. 498. CHARAS, *Pharm. reg.* p. 263. POTERIUS *Op. o. cum annot.* Fr. HOFFMANNI, *Frst. ad Moen.* 1698. p. 540. SCHULZE, *Nat. med.* p. 39.

***). *Diff. Zincum med. inquirens; Helmst.* 1776. p. 12.

†) *Corpus pharmac. chym. med. univers.* p. 954.

††) V. SCHROEDERI *Pharm. med. chym. Lib. II.* p. 231. brevior et concinnior ejus compositionem in *Ph. Lond.* p. 49. et in *Ph. Wirr.* 1786. p. 93.

nec minus *Aquae aluminosae Bateanae* *). Intrat porro *Unguentum ad scabiem Timaei* **), huicque simile notissimum *Iasseri* ***), nec non *Unguentum psoricum Vogleri* †). Alias denique, quas ingreditur, compositiones, ut pulveres et liquores errhinos, injectiones, collutoria, unguenta, emplastra etc. quaeras sub his titulis, si lubet, in IUNGKENIO aliisque.

SECTIO POSTERIOR.

MEDICO - ET CHIRURGICO - PRACTICA.

§. 24.

Iam a longo retro tempore Vitriolum album in usum medicum vocatum fuit. Praecipue vero PARACELSI temporibus viguit, optimoque cum successu pluribus morbis fuit oppositum. Laudant illud inter veteres praesertim HELMONT, PENOT, CROLL, QUERCETANUS, ANGELUS SALA, BEGUIN, LE FEBURE, RIVERIUS, ZWOELFFER, BONET, CHARAS, W. WEDEL, MORTON, FR. HOFFMANN aliique, quorum, uti recentiorum, in recensu morborum, quibus id opposuerunt, fiet mentio. Recentiori vero aevo parcius in usum vocari coepit. Et quidni Vitriolum album eidem fato obnoxium fieret, cui plura alia medicamenta, vel praestantissima, ut nempe laudetur ab his, culpetur ab illis, utque tam nova detecta illud ex usu detruderent, quam incautus usus, ut suspectum, infamaret, cum tamen infelix effectus non remedio, sed sinistro usui tribuendum esset. Lubens quidem fateor, ejus usum, praesertim internum, difficultatibus haud carere maximamque medentis cautionem vel ideo poscere, quod plerumque in pharmacopoliis non depuratum occurrat. Licet enim vitriolum martis huic admixtum ipsum egregium sit reme-

*) *The Edinb. new Dispensatory* 1786. sic habet: R. Alum. Vitriol. alb. aa. $\frac{3}{3}$. Aquae pint. jj.

**) IUNGKEN, p. 1202 Est, quod sequitur: R. Cort. laur. Sulph. citrin. ana $\frac{3}{4}$. Enul. $\frac{3}{4}$. Vitriol. alb. $\frac{3}{4}$. Styr. liqu. q. i. F. Ungt.

***) SCHMUCKER, verm. chir. Schr. 3 B.

†) *Pharmaca selecta*. Ed. 2. Wetzlar. 1788. p. 122.

dium et interdum Vitriolo zinci aequiparandum, imo anteponendum; in quibusdam tamen calibus statui morbi minus congruum esse, in aliis effectum remedii subdubium reddere potest. Magis vero cupreum ipsi inhabitans timendum est, cum nonnunquam vi sua emetica effectui intentato obesse eumque frustrare possit; quamvis etiam e contrario in iis casibus, ubi vomitum ciere propositum est, exigua illa vitrioli coerulei immixti quantitas requiratur.

Plura quidem detexit serior aetas medicamenta, in nonnullis morbis, quibus olim Vitriolo albo obuiam itum fuit, huic omnino praeferenda. Ab his vero si recesseris, plures adhuc relinquuntur morbi, in quibus sanandis eius utilitas hodiernum confirmatur. Ac recentiora cum illo etiam in quibusdam aliis morbis facta experimenta satis probant, contemptum, quo passim laborat, non mereri, sed dignum esse, praecipue purum illud factitium, cuius plura pericula caute capiantur.

§. 25.

Haud parum saepe negotii facessit virium remedii determinatio ex effectu, quem in hoc illoue morbo praestitisse fertur, cum non semper de fide et observandi dote auctoris constet; cum saepius remedii virtus inter plura alia, vel antea, vel simul in auxilium tracta, diuisa maneat, imo his solis effectus salutare nonnunquam adscribendi videantur; cum non raro observatores nec indolem remedii adhibiti modumue eius praeparationis, nec causam, speciem, naturamque mali, quod illius ope sanasse perhibent, simul tradiderint, ut multa alia taceam momenta, quae frequentius in descriptis morborum historiis neglecta effectum remedio cuidam tributum dubium suspectumque reddunt. Varia id genus dubia movent et laudes Vitriolo albo in hoc illoue malo tributae. Sic, ut vnum modo hic adducam, non parum interest nosse, num Vitriolum album, praesertim interne adhibitum, depuratum, sive factitium fuerit, an non depuratum, cum, si hoc fuerit, in nonnullis casibus tam ferrum, quam cuprum, licet parcius admixta sint, etiam sibi aliquam curationis partem vindicare possint, et sic, quid huic alteriuetribuendum, non semper erui

queat. Quod quidem de Vitrioli albi puritate dubium modo ex quibusdam nostri aevi observationibus creatur, quippe cum depuratio, ante hoc ignota, in quibusdam Dispensatoriis quidem iniuncta sit, ideo vero non semper instituitur, id quod emelis, quam interdum Vitriolum album excitauit, nobis persuadet.

§. 26.

Vires autem Vitrioli albi factitii, seu depurati ad sequentia capita reduci posse videntur.

Inter reliquas praecipue eminet, tanquam primaria, vis *adstringens*, quae iam ex sapore, leni dentium stupore, labiorum et linguae quadam corrugatione et exsiccatione percipitur, sed magis adhuc ex effectu, quem in morbis exserit, apparet.

Dum adstringit, cohaesionem, firmitatem et elasticitatem fibrarum auget atque *roborat*.

Quod autem tonum solidorum roborat, id eorum actionem in contenta fluida auget, horum mixtionem alterat, et sic sanguinem cogit, spissat, eiusque dissolutionem impedit, vel iam factam imminuit et *putredinem arcet*.

Vim *antispasmodicam*, quam interdum edidit, partim fibram laxam roborando, et irritabilitatem nimiam saepius cum hac coniunctam minuendo, partim, vt flores zinci, lenem diaphoresin excitando, exserere videtur.

Vires autem, quae minori gradu in illo conspiciuntur, vt *resoluens*, *diaphoretica*, *diuretica*, *laxans*, *anthelmintica* et *errhina*, nunc a vi irritante, nunc a roborante repetendae esse videntur.

Vim denique *emeticam* quod spectat, qua Vitriolum album, Gilla et Sal vitrioli apud veteres quam maxime celebrata fuere, vix quidem dubium creare poterat, hancce non factitio illi competere, sed particulis cupreis non depurati, quod etiam TRILLER *) WEDEL **) LOESEKE ***) et MOENCH ****) contendunt, adscribendam esse, cum ve-

*) Dispensator. pharmac. vniuers. T. I. p. 11.

**) Amoenitat. mat. med. Jen. 1704. p. 296.

***) Mat. med. 5 Aufl. von Gmelin p. 88.

****) Systemat. Lehre von den gebräuchlichsten einfachen und zusammenges. Arzneyen. 2 Aufl. Marburg. 1792. S. 411.

terum purificatio non vera ejus depuratio fuerit. Nec minus in iis casibus, ubi recentiores vomitum experti sunt, cupreum illud inquinamentum in causa fuisse, verosimile erat. Attamen cum etiam Vitriolum album depuratum passim in officinis venale proffet, nec tamen unquam Vitrioli albi usurpati indolis mentio facta fuerit; cumque non semel a floribus zinci ipsis vomitum excitatum fuisse, ex pluribus observationibus a cl. HART *) et cl. MARTINI **) evulgatis constet: subdubium saltem esse videbatur, num vis emetica semper cupro admixto sit tribuenda, an vero Vitriolum zinci purum etiam, uti flores, hunc effectum interdum exserere possit. De quo ut certior fierem, data fuit copia in Nosocomio sub Ill. Virorum, RICHTERI et STROMEYERI auspiciis hic florente. Binis aegris, in quibus plura signa fordium fursum turgescientium aderant, propinare Vitriolum, quod solutione zinci Indici in acido vitriolico paraveram, mihi licuit. Alter vero, postquam grana 24 aqua soluta sensim intra horae spatium sumferat, praeter aliquot ructus, nihil inde sensit; et alteri, in qua per idem temporis spatium ad grana 45 ascenderam, ne hoc quidem evenit ***). In utrisque dein vomitus intentatus, parva tartari emetici et ipecacuanhae dosi sumta, ciebatur.

Nunc praecipui illi casus constituendi sunt, in quibus Vitriolum album particulis cupreis inquinatum reliquis emeticis minus efficacibus praeferendum. Vel maxime autem emeticum, quod validius nervos ventriculi irritare, fibram muscularem ad efficaciorum constrictionem excitare atque ita certum citumque vomitum ciere valet, praesertim tunc desideratur, ubi venenum, praecipue narcoticum, degluti-

*) Diff. de zinco ejusque florum usu med. L. B. 1772.

**) Diff. de zinco medico recentius observata sistens, praef. CRELL Helmst. 1780.

***) Mire a meis discrepant observationes censoris in Allgem. deutsch. Bibl. 96. B. S. 399. qui Vitriolo zinci arte parato pluries vomitum destinatum, quin saepe vehementem, excitasse adserit; id quod hic loci referre fas est. Iam vero, num Vitriolo zinci etiam puro vis vere emetica insit, an potius sapor ejus nauseosus cum vomituritione vel idiosyncrasia agroti conjunctim haud raro vomitum ciere valeat, ulteriora, at circumspicte repetita, pericula discernent.

tum, vel pituita glutinosa, tenax et acris, vel ingluvies etc. citissime per vomitum reiicienda sunt, nec minus etiam, ubi metus est, ne vis alius emetici versus inferiora determinetur. Tale autem non semel hoc Vitriolum album sese praestitisse aegrumque morti, alias apoplexiae, suffocationis, convulsionum etc. pedissequae eripuisse, testantur auctores infra citandi. Datum fuit in his casibus a $\mathfrak{D}\beta$ ad $\mathfrak{Z}\beta$, imo si periculum in mora, ad $\mathfrak{Z}j$. Praeterea etiam in laxitate ventriculi aliis emeticis anteponendum suadet WEDEL *), quia, effectu edito, simul tonum ventriculi augeret. Non obstante autem vi magis irritante et celeri operationis modo, a plerisque, ut lene, blandum et securum vomitorium depraedicatur.

§. 27.

Iam, praemissa virium Vitrioli albi determinatione generaliori, ad recensendos morbos, in quibus praecipue laudatum fuit, progredior, initium de externis factururus, ad quos sanandos vero purum non depurato semper est praefendum.

CAPUT I.

U S U S E X T E R N U S .

§. 28.

Magnopere celebratum remedium nunquam non fuit Vitriolum album in *Ophthalmia*. Ut plurimum in hoc morbo, sublata causa interna et mitigato prius venaesefione, vel hirudinibus aliisque remediis antiphlogisticis nimio inflammationis aestu, adstringentia emollientibus sunt anteponenda et praecipue tum necessario requiruntur, si tonus vasorum nimio sanguinis affluxu debilitatus inflammationem fovet. Inter primaria huic flatui opponenda remedia militat Vitriolum album; nec parum ad ejus commendationem facit, quod famam, qua priscis temporibus inclaruit, et hodiernis tuetur. Aptissima, qua oculis applicatur, forma est illa collyrii. Pulvis enim, licet subtilissimus, seu in-

*) l. c. p. 300.

fietur, seu penicillo applicetur, fricando malum potius augebit. Etiam unguenta, cum plerumque rancore et acrimonia peccent, emolliendo vim remedii debilitent, et transpirationem, tam bulbi ipsius, quam partium adiacentium, cohibeant, dissuadenda iunt; nisi interdum, at recens parata, ad acrimoniam humoris effluentis obvolvendam, ut in ophthalmia catarrhali, adhibere velis. Linteolum vero collyrio imbutum atque palpebris impositum plus nocet, quam iuvat. Sic enim remedium ad locum affectum pertingere nequit, calore relaxat et effluxum lachrymarum cohibet. Multo efficacius aqua ophthalmica vim suam exserit, si repetitis per diem vicibus aegroto supino aliquot guttulae cantho oculi interno instillantur. Media vero proportio, quae quidem respectu aetatis, sensibilitatis oculi et gradus morbi augeri vel minui potest, haec est, ut Vitrioli albi gr. j-jj in aquae destillatae, e. lg. rosarum, plantaginis, ℥j solvantur.

PARACELsus *) jam laudat in hoc malo Vitriolum album. CROLLIUS **) de suo Lapide medicamentoso gloriatur: oculorum lachrymas restinguit, rubedinem, dolores et caliginem tollit, si pluma ejus solutione madefacta anguli oculorum externi irrorentur. BONETUS ***) nobilissimum in ophthalmia remedium vocat. RIVERIUS ****): in vulgari usu habetur collyrium ex Vitriolo albo in aqua rosarum aut plantaginis dissoluto, quod inflammationem temperat, discutit et fluxionem arcet. Eorum proportio talis est: R. Vitriol. alb. ℥j, Aqu. ros. ℥iv. Vitriolum album pulverisatum in aqua ad ignem dissolvatur, coletur per linteum et in oculos instilletur. Si acrimonia sua nimium eos vellicet, additione aquae ad libitum temperetur. IUNCKER †): omnium, ait, consultissimum est et efficacissimum adstringentia cum formulis humidis moderate miscere, ubi vitriolum album facile omnium est coryphaeus; modo observetur,

*) Oper. Basil 1599. T. VI.

**) Basilic. chym. p. 271.

***) Thesaur. med. pract. P. II. p. 981. 944.

****) Op. o. Frft. 1674. p. 252.

†) Conspect. therap. gener. Halae, 1725. p. 219. et Consp. therap. spec. ib. 1750. p. 208.

ut ante illius applicationem aestus inflammationis prius temperetur et saccharum saturni aqua rosarum solutum mox subjungatur. In eundem usum per albumen ovi deliquio solvitur et aqua ros. s. plantag. temperatur. SCHULZE *): in inflammationibus oculorum et lippitudine optime se gerit pulvis vitrioli albi subtilissimus, butyro insulso permixtus et oculis inditus; quod remedium a *Rinningero* commendatum saepius cum fructu expectato adhibui. Praestare haec forma collyriis videtur. HEISTER **)) post alia remedia adhibita pulverem ex sacch. alb. 3jβ. Off. sep. 3jj et Vitri. alb. gr. jj. compositum oculis inperfit. In pforophthalmia collyrium ex Aqu. ros. rubr. Plantag. ana 3jj. Lapid. calam. praepar. 3j. Vitriol. alb. 3β laudat. ZIMMERMANN ***)) optima collyria intrare asserit. FR. HOFFMANN †): oculos si infestat salia et calida defluxio, cui rubedo juncta, in sic dicta epiphora, et si noctu praesertim palpebrae a viscoso humore conglutinantur, pauxillum, vel unum granum Vitrioli albi cum butyro recenti subactum et orbitae oculi majori inditum, admirabilem fert opem et prompte vitium abigit. LEWIS ††) solutionem 3j Vitriol. alb. in pinta aquae (Aqua vitriol. Ph. Edinb.) egregium collyrium in lippitudine et levioribus ophthalmiis et, praegressa venaectione et purgantibus, etiam in vehementioribus esse dicit. MALOVIN †††) laudat sequens: R. Vitriol. alb. 3β. pulv. ir. flor. 3j. Aqu. ros. plantag. ana 3vjjj. diger. per 24 hor. et filtra. Laudant in hoc morbo praeter ALSTON *), HILL **), DALE ***), LOESEKE †), CRANZ ††),

*) Mat. med. Hal. 1746. p. 35.

**) Wahrnehmungen, 1 B. p. 355. 2 B. p. 70. 486. 595.

***)) Theoret. pract. Chym. 1567.

†) Op. omn. T. I. p. 453.

††) Experimental history of the Mat. med. Ed. 2. p. 597.

†††) Chymie medicinale, T. II. p. 396.

*) Lectures on the Mat. med. Vol. I. p. 207.

**) l. c. p. 137.

***)) Pharmacologia, Brem. 1690. p. 64.

†) l. c. p. 433.

††) Mat. med. et chirurg. T. II. p. 42.

VOGEL *), SPIELMANN **), PLENCK ***), BUCHAN †), multi alii, quorum vero paucos adhuc nominasse sufficiat, qui ejus efficaciam ipsi frequentius sunt experti. DE HAEN ††): Centies, ait, curavi lippitudinem hoc remedio: R. Aqu. pluv. \mathfrak{Z} v. Vitriol. alb. Sal. marin. ana gr. v. LUDWIG †††): si laxitas vasorum corrigenda et roborantibus opus est, conducit Vitriolum album. Ill. RICHTER et cel. STROMEYER, Praeceptores mei summe venerandi, sub eadem conditione et in leviori mali gradu commendant. ARMSTRONG *) in remanente laxitate vasorum conjunctivae indeque orto lachrymarum effluxu valde laudat. BATTIE **): non sine fructu frequentius usus sum unguento ex butyro infulso, saccharo Saturni et Vitriolo albo debita proportionem composito, quod ad magnitudinem pisi cantho oculi majori inditum efficaciter, si prius internis rite fuerit prospectum, huic malo medetur, discutiente simulque roborante, qua pollet, virtute. PRINGLE ***) etiam in vehementioribus ophthalmiis adhibuit. Cel. SELLE †) in epiphora et lippitudine a relaxatione vasorum orta aquam suam ophthalmicam confortantem valde laudat: R. Aqu. chamom. f. v. \mathfrak{Z} vjjj. Extr. Saturn. Spir. vin. camphorat. ana \mathfrak{Z} jj. Vitriol. alb. \mathfrak{Z} j. M. Male autem Vitriolum in connubio extracti saturni datur, quoniam sic, ex affinitatis legibus, utrumque remedium necessario decomponitur. — Novissime etiam in ophthalmia chronica, quae interdum variolas insequitur, nec minus in aliis ejusdem speciebus chronicis, albumine ovi hebetatum et marginibus palpebrarum interioribus illitum quam maxime laudatur a cel. HUFELAND ††).

*) Hist. mat. med. p. 388.

**) Instit. mat. med. vers. germ. p. 535.

***) Pharmac. chirurg. p. 101.

†) Domestic. medic. Lond. 72.

††) Praelect. in Boerhaav. instit. patholog. T. III. p. 393.

†††) Instit. medic. clin. §. 717.

*) An account of the diseases most incident to children, p. 108.

**) Aphorism. de cogn. et cur. morb. p. 71.

***) Beobacht. über die Krankh. der Arme, p. 160.

†) Medic. clin. Ed. 3. p. 436. 578.

††) Bemerkungen über die natürl. und künstl. Blattern zu Weimar im J. 1788. p. 159.

§. 29.

Interdum chemosin, vel remediis majorem, vel perperam tractatam, suppuration conjunctivae excipit. In hac *Hypopyi* specie medici est inflammationem adhuc residuam resolvere, suppurationem coërcere et dein corneae pelluciditatem reddere. Ad hunc scopum impetrandum ill. RICHTER in praelectionibus suis *) Vitriolum album hac forma adhibitum commendat: R. Vitriol. alb. gr. xv. - xxx. Album ov. no. j. ter in vas. stann. ad consist. Linimenti, 3-6ies in die, ope penicilli, corneae illiniendi.

§. 30.

Ad resolvendos et discutiendos humores intra lamellas corneae, vel potius intra hanc et tunicam adnatam extravasatos, seu in vasis dilatatis stagnantes plures usi sunt Vitriolo albo. HEISTER **) unguentum rosatum cum Vitriolo albo et viride aeris mixtum cum successu adhibuit. Nec minus pulverem tenuissimum e Vitriol. alb. alum. ust. et sacch. alb. compositum *Maculae* caute inspergendum commendat. DE HAEN ***) Lapid. medicam. Croll. gr. xij. aqu. fl. keyri \mathfrak{z} v. solut. laudat. Ill. RICHTER †) collyrio ex Vitriol. alb. gr. j. et aqu. dest. \mathfrak{z} j corneam, quae post vehementem inflammationem nebulosa et quasi fumo obducta videbatur, reddidit pellucidam. In graviore autem mali gradu solutionem fortiolem, e. g. Vitrioli albi \mathfrak{z} j ad aquae \mathfrak{z} ijj - iv, suadet ††). Cel. THEDEN †††) et cel. FELL *) quoque in maculis corneae laudat.

§. 31.

Haud raro molestat pruritus quidam et ardor palpebrarum, licet in his vix rubor et inflammatio observari possint. Vexat hoc vitium alios interdum, alios praecipue tem-

*) vid. etiam Anfangsgr. der W. A. 3 B. p. 85.

**) l. c. T. I. p. 1100. *Ej.* Instit. chir. T. I. p. 619.

***) l. c.

†) l. c. p. 39. 128.

††) ibid. p. 146.

†††) Unterr. für Unterwundaerzte.

*) Lehrbegriff der Wundarzneyk. 3 Th. p. 241. 242.

pore vespertino, vel post nimium iusto oculorum exercitium. Plerumque, sublata prius, si qua adsit, causa interna, solutio Vitrioli albi modo laudata citum levamen adfert, si palpebrarum margines illa saepius humectantur *).

§. 31 a).

In *Amblyopia* ab imminuta vueae sensibilitate profecta, roborandi scopo, collyrium ex aqua rosarum stillati-
tia et Vitriolo albo paratum commendat VOGEL **).

§. 32.

Laudatur etiam Vitriolum album a nonnullis in illa *Fistulae lachrymalis* specie, quae a metastasi materiae mor-
bosae haud satis cognitae orta aliis remediis obscure indica-
tis non cedit, et ubi, praeter alia, repellentibus et roboran-
tibus acquiescere oportet ***).

§. 33.

In lapsu palpebrae superioris, seu *Ptoſi*, quae a causa
mechanica externa extendente, seu relaxante ortum habet,
collyrium e Vitriolo albo cum pulvere mastichis intra or-
bitam oculi mane et vespere palpebrae debili applicatum
laudat cel. OETTINGER †). In *Entropio* senum a relaxa-
tione cutis cel. BELL ††).

§. 34.

Valde efficax quoque sese praestitit Vitriolum album in
Aphthis. Conducit autem praecipue in illis, quibus infan-
tes neonati obnoxii sunt, quae plerumque nulla febre sti-
patae a munditie oris neglecta, lacte nutricis pingui, acri,
vel alia labe peccante, et tum praesertim oriri solent, quan-
do infans sugendo mammis obdormiscit et sic lac diutius ore
retentum acorem contrahit. In hac aphtharum specie, re-
mota causa interna, leniter adstringentia non sine fructu

*) RICHTER, Anfangsgr. der Wundarzn. 2 B. §. 564.

**) Praelect. de cogn. et cur. praecip. c. h. affect. p. 474.

***) RICHTER Anfangsgr d. W. A. 2 B. §. 535.

†) Diss. de lapsu palpebrae superioris; resp. KÜRNER Tubing.

1771

††) l. c. p. 193.

adhibentur. ROSENSTEIN *) tepidam aliquot granorum solutionem locis aphthosis linteolo applicandam suadet. UNZER **) ejus solutionem cum melle rosarum commendat. ARMSTRONG ***) optimum huic malo opponendum vocat remedium. Vitriol. alb. $\mathfrak{z}\beta$ aquae $\mathfrak{z}\text{vj}$ soluit et linteolo hac solutione madefacto internas oris partes aliquoties in die abstergendas curat, ac simul, ad ventriculum et intestina purganda, interdum pauxillum solutionis deglutendum praebet. Praesentissimum vero ab illo auxilium expertus est cel. HERZ †) in puero trienni, atrophia consumto. Totum ejus os aphthis erat oblitum et quaquaversum, vel ad levissimum attactum, sanguinem fundebat; lingua insuper, omni licet studio a sordibus liberata, membrana lardosa videbatur obducta. Remediis congruis atrophia sublata, aphthae adhuc restabant, quibus tandem, postquam omnia alia in hoc morbo celebrata remedia per sex hebdomades incassum tentaverat, Vitriolum album, suadente ARMSTRONG, opposuit, sic, ut $\mathfrak{z}\beta$ in aqu. $\mathfrak{z}\text{vj}$ solveretur, additaque mellis rosacei $\mathfrak{z}\text{j}$, os linteo hac mixtura imbuto, quarta quavis hora elueretur et aphthitis profundius sitis syringis ope aliquoties applicaretur. Quo facto, post quatuor dies elapsos ne vestigium quidem mali restabat. Mel rosarum nullam curationis partem sibi vindicare posse, cel. HERZ sibi persuadet, cum jam antea, tam solum, quam aliis remediis nuptum copiose, at sine fructu, esset usurpatum. Cel. FRITZE ††) cum succo plantaginis et melle rosarum aphthis illitum infallibile vocat remedium. Simili modo experientia ducti studiose commendant cl. SELLE †††) et cel. ARNEMAN *).

§. 35.

In aliis quoque oris interni affectibus utile se praestitit

*) von den Kinderkrankh. 5 Aufl. p. 61.

**) STARK, Abh. von den Schwämmchen p. 209.

***) l. c. p. 25.

†) SELLE, neue Beytraege etc. I Th. p. 134.

††) Medic. Annalen, I St. p. 255.

†††) l. c. p. 134.

*) Commentatio de aphthis. Gött. 1789.

remedium nostrum. ARMSTRONG *) collutorio suo in puero quinquenni intra paucorum dierum spatium *Ulceras oris* interni pessima sanavit. Lingua ejus alba crusta, aphtharum instar, obiecta, gingivae et palatum foedis pustulis oblita parvisque excrefcentiis fungosis, verrucas mentientibus, aspera conspiciebantur, saliva, quasi mercurio prolicita, copiosa effluebat et deglutitio aegerrima gravabat. WEDDEL **), *Lap. medic. Croll.* in ulceribus faucium laudat, et DE HAEN ***), desperatissima ulcera dyssepulotica illo sanata vidit. Ab aliis Vitriolum album in connubio tincturae laccae aquosae, vel aliorum remediorum, ad gingivarum laxitatem corrigendam, ulcera oris scorbutica detergenda, dentes vacillantes confirmandos et mundificandos varia sub forma fuit adhibitum.

§. 36.

Quod si *Angina* inflammatoria relaxationem partium affectarum post se relinquit, vel si ipsa mitioris indolis est, ut illa, quam catarrhalem, s. ferosam, s. tonsillarem vocant; tum non raro collutoria leniter adstringentia conducunt. Cel. HERZ †) modo memorata solutione in angina serosa fere semper optato cum effectu utitur. Et de hac anginae specie intelligendum est, quod VAN SWIETEN ††) de rusticis quibusdam in Zeelandia anginarum cura famosis (quibus inde nomen *Keelboeren* impositum est) refert, qui pulvisculo ex Vitriolo albo, sale ammoniaco et alumine crudo, fauces inflammatas, et quidem repetitis vicibus tangunt, quandoque cum insigni levamine.

§. 37.

Ex iis, quae de viribus Vitrioli albi praemissa sunt, luculenter apparet ejus usus in *Haemorrhagiis externis*. Adstringente enim sua virtute orificium vasis disrupti crispat, angustat, dumque simul sanguinem adfluentem cogit,

*) l. c.

**) Exercitat. pathol. therapeut. p. 118.

***) l. c. not.

†) l. c.

††) Comment. in Boerhaav. Aphor. T. II. p. 677.

thrombum efficit lumen vasis obturantem. Ejusmodi styptica imprimis in iis locis requiruntur, ubi vasa sanguinem fundunt, quibus nec ligatura circumdari potest, nec sola compressio, ut claudantur, sufficit, ut illa oris interni, narium, uteri etc. Ut plurimum solutio ex Vitriol. alb. $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ in aqu. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ facta et mediante turunda vel compressorio, *Tampon* vocato, loco sanguinem fundenti applicata, vel syringis ope injecta, scopo respondet. RIVERIUS *): haemorrhagiam potenter cohibet orificia venarum constringendo, si narium cum turunda ex gossypio confecta immittitur. Cel. VOGEL **) ad cohibendam enormem narium haemorrhagiam a dissolutione humorum in febribus putridis ortam, non neglectis antisepticiis internis, solutionem ex Vitri. albi $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{z}$ et aquae $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{z}$ suadet. SCHULZE ***) in haemorrhagiis externis laudat. CRANZ †): ad compescendas vulnerum haemorrhagias utile, vel in globulos, qui vulnere intrudantur, fingitur, vel meraca solutione applicatur. Ill. RICHTER ††) ad sistendam haemorrhagiam evulsum polypum narium in sequentem adhibet solutionem ejus saturatam. LEAKE †††) in haemorrhagia uteri et fluxu mensium nimio injectionem aquae aluminosae Bateanae commendat, si omnia alia non iuvant et mora periculo stipatur. Celeb. STROMEYER pessarium solutione Vitrioli albi imbutum in haemorrhagia abortum minitante eo cum effectu adhibuit, ut sanguinis profluvium cohibitum et abortus evitatus fuerit, aut, si quandoque non evitandus esset, haemorrhagia saltem cessarit.

§. 38.

In ipso *Gonorrhoeae* stadio inflammatorio injectiones adstringentes e saccharo saturni, Vitriolo albo etc. a. CRIBB *)

*) l. c. p. 278.

**) Handb. der prakt. A. W. I Th. p. 413.

***) Mat. med.

†) l. c. T. II p. 42.

††) l. c. I B. §. 583.

†††) Practical observat. on the childbed fever and the acute diseases most fatal to women, Vol. II. p. 286.

*) Considerations on the use of injections in the gonorrhoea, 1773. vid. RICHTER chir. Bibl. 3 B. p. 604.

valde laudatae sunt, utpote quae inflammationem resolverent et simul leniter vasa resorbentia constringendo veneni per illa in sanguinem ingressum impedirent. Sed merito haec medendi methodus damnatur. Adstringentia enim non possunt non hic nocere, cum inflammationem et dyfuriam potius augeant, effluxum materiae gonorrhoeicae cohibeant et sic veneni resorptionem potius maturent, id quod plures etiam observationes testantur.

Meliori jure ab eodem ad tollendam *Gonorrhoeam secundariam*, quam Angli *Gleet* vocant, commendantur, quam ex sola glandularum mucosarum laxitate promanare novimus. Soluit in hunc finem Vitrioli alb. gr. j. in aqu. ℥j, aut, si fortior reddendus erat liquor injiciendus, sequenti modo adhibuit: R. Camphor. c. paux. Spir. vin. rectific. trit. gr. jj. affund. Aqu. font. ℥vj. add. Sal. saturn. Vitriol. alb. ana gr. jv. Colet. per chart. Plerumque vero profluvium, solo Vitriolo albo injecto, intra paucos dies cessavit. HILL *) efficax in hoc malo remedium vocat. LEWIS **) aquam alum. Batean. in gonorrhoeis non virulentis utilem esse dicit. Nuper adhuc cel. GIRTANNER ***) et cel. HECKER †) in Blennorrhoea idiopathica et asthenica injectiones commendarunt e Vitriolo albo, cujus ille quidem gr. jjj. in aquae ℥vj. hic vero $\Theta\beta$ in ℥vj solvendum praescripsit.

Simili ratione etiam in *Fluore albo* a topica partium laxitate orto injectiones adstringentes cum fructu adhibentur. CRIEB ††) quoque in hoc laudat solutionem Vitrioli albi; LEWIS †††) aqu. alum. Bat.

LEAKE *) ad tonum vaginae relaxatae restituendum et futurum uteri repositi descensum praecavendum injectiones ex Vitriol. alb. et Alum. ana ℥j in aqu. ℥jj dissolut. adhibendas suadet.

*) l. c.

**) l. c.

***) Abhandl. über die venerische Krankh. Gött. 1788. p. 170.

†) Deutliche Anweisung die venerischen Krankheiten genau zu erkennen und richtig zu behandeln. Erfurt, 1791.

††) l. c.

†††) l. c.

*) l. c.

§. 39.

In *morbis cutis chronicis* frequentius usi sunt veteres Vitriolo albo, praecipue vero Lapide medicament. Croll. qui, uti Aqu. alum. Bat. et hodiernum a nonnullis indiscriminatum laudatur. Sed caute in his morbis adstringentia sunt adhibenda, imo potius plane rejicienda, cum facile acrimoniam hac via ejiciendam retineant, vel retropellant. Sic ad tollendas *Ephelides* *) non nisi circumspecte illud adhibendum est. In recenti autem *scabie vera* ad necandos acaros, quos nuper cel. WICHMANN **) in pristinam dignitatem restituit, Vitriolum album conferre et partem curationis sibi tribuere posse videtur, quam unguentum lasseri, cui inest, fere semper abiolvit.

§. 40.

Profuisse quoque Vitriolum album in *Ulceribus* cutis impuris, scorbuticis purificandis et corrigendis, plures testantur. WEDEL ***) in ulceribus penis laudat, et GORDON †) saepe ulcera venerea pertinacissima, *Shankers* dicta, sequentis remedii applicatione sanasse gloriatur: R. Vitriol. alb. calcinat. Roman. calcinat. Alum. ust. ana $\mathfrak{z}\beta$. Camphor. ol. amygdal. trit. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\beta$. Bol. armen. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{j}$. M. F. P. cujus $\mathfrak{z}\beta$. aqu. bull. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\beta$. solvenda.

§. 41.

In quibusdam tandem morbis a congestione serosa, seu pituitosa versus caput ortis errhina conducunt, quae irritando nimium mucum attrahunt ejusque effluxum per nares promovent. Plura huic scopo idonea applicari solent remedia, e quorum numero quoque est Vitriolum album. NENTER ††) ad muci narium incrassati solutionem commendat. IUNCKER †††): errhina virtute catarrhos muci-

*) STOLL prael. in divers. morbos chron. ed. EYEREL. T. I. p. 286.

**) Aetiologie der Krätze, Hannov. 1786.

***) l. c.

†) Medic. observ. and inquir. Vol. II. p. 82.

††) Fundam. medicin. P. III. p. 138.

†††) Conspect. therap. gener. p. 219.

dos, coryzam etc. sublevat, si aqua majoranae solutum iusto tempore adhibetur. FR. HOFFMANN *) lenioribus errhinis adnumerat. WEDEL **) solutionem ejus penna naribus applicat, ut liqueat catarrhos; et in infantibus recens natis, qui propter narium obstructionem vix lac sugere valebant, felici cum successu adhibuit. In eadem causa a ROSENSTEINIO ***) solutio ex aqua majoranae $\frac{3}{\beta}$. Vitriol. alb. et Elater. alb. ana gr. j-jj. parata laudatur, ut linteolum hac imbutum naribus immittatur. Cel. MEL-LIN ope solutionis e Vitrioli albi $\frac{3}{j}$ cum aquae majoranae $\frac{3}{j}$ paratae, olim ab HOFFMANNO ad solvendam coryzam usurpatae, vehementem in sinibus frontalibus dolorem suffulit †).

§. 41 a).

In *Odontalgia* a carie globulum inde formatum denti intrudere suavit cel. WEICKARD ††).

C A P U T II.

U S U S I N T E R N U S.

§. 42.

Rarius quidem morbi interni Vitriolo albo oppugnati sunt: attamen non parum sibi in nonnullis acquisivit fa-
mae, quam etiam recentiora pericula ipsi servarunt, immo nonnumquam auxerunt. Non autem perinde est, num purum, an impurum adhibeas; sed in illis morbis, in quibus emesis cienda, Vitriolum album particulis cupreis comixtum sumendum est, dum in reliquis factitium, s. depuratum huicce praestare videtur. Praeeant nunc illi, in quibus citum certumque vomitum desideras, quem etiam pluries optato cum successu excitavit.

*) l. c. p. 442.

**) Miscell. curios. An. III. p. 215.

***) l. c. p. 40.

†) vid. ARNEMANN Entw. einer prakt. Arzneymittellehre, 2 Th., p. 205.

††) ibid. p. 194.

§. 43.

Horrendum est symptomatum agmen, quibus *venena* quaedam *deglutita* stipantur, quaeque non raro, nisi promptissimam opem tuleris, ocyus seriusve morte finiuntur. Varia habentur pro varia veneni indole antidota, quibus illius vim enervare, ac periculo instanti obviam ire licet. In quibusdam vero, praesertim narcoticis, praesentissimum affert auxilium vomitus, quem, nisi jam omnis sensibilitas et irritabilitas fere exstincta, seu venenum jam altius delatum fuerit, citissime ciet emeticum, quale est Vitriolum Goslariense. BOERHAAVE *) in tali casu Vitrioli albi 3℔. deglutiendam, vel, si iam deglutitionis difficultas adesset, ope canalis flexilis injiciendam suadet. Vidit idem **), octo pueros cicutam devorasse; angebantur, delirabant, vomituriebant, convellebantur omnes. Propinavit Vitriolum album, et servati sunt, qui vomuerunt, omnes. VAN SWIETEN ***), Vitrioli albi 3℔ in aquae 3ij dilutam ad venenum adhuc in ventriculo haerens, et alibi †) ad ingluviem celerrime excutiendam commendat. Et cel. WITHERING ††) vitio dare videtur WHATELEYO, quod aegro suo, qui, ingenti opii copia deglutita, mortuo similis jacebat, non illico ipecac. ʒj. una cum Vitriolo albo ingesserat, quod multo citius reliquis emeticis vomitum excitasset. In simili casu commendant SEV. HEE †††), GREGORY *), CRANZ **), SCHERF ***), alii.

*) Praelect. academ. in propr. institut. ed. HALLER. T. VI. §. 1136.

**) l. c. §. 1138.

***) Comment. in Boerhaav. Aphor. T. III. §. 1035.

†) ib. T. II. §. 605. n. 10.

††) Med. obs. and. inqu. Vol. VI. p. 331.

†††) Act. N. C. Vol. X. p. 334.

*) Ueberlicht der theoret. Arzneyw. 2 Th. §. 1374.

**) l. c. T. II. p. 42.

***) Anzeige der Rettungsmittel bey Leblosen etc. Altona, 1780. p. 196. 204.

§. 44.

Haud parum frequens *Apoplexiae* caussa occasionalis est colluvies primarum viarum et nimia ventriculi debilitatis a cibis repletio. Omnem hic curationis partem absolunt evacuantia, et ex his praecipue emetica, quae, praemissa, si opus est, sanguinis missione et clysinatibus, citissime causam plerumque adhuc in ventriculo stabulantem exterminant, nec raro fatum avertunt, quod, his neglectis, largiores venaesectiones properassent. Magni faciunt in hoc casu, ob citum, quem edit effectum, Vitriolum album QUERCETANUS *), SCHULZE **), GRASSIUS ***), DE MOOR †), FR. HOFFMANN ††), IUNCKER †††), PLATNER *); nec minus cl. FOTHERGILL **) in apoplexia, quae, ut plerumque, epulas excipit, largas Vitrioli albi doses, a $\Theta j - \bar{3}\beta$ tuto exhibendas suadet, usque dum vomitus sufficiens excitatus fuerit. Eodem in casu magnopere commendavit heu! praemature fato ereptus STOLL ***).

§. 45 a).

In *morte submersorum ancipiti* nuper modo a cel. KITE †), praeter alia irritantia topica, etiam vomitoria commendantur, quippe quae, remota prius versus caput congestione, stimulo, quo ventriculum, omnis consensus centrum, afficiunt, quam maximae ad resuscitandam vim vitalem sopitam atque sufflaminatam valerent. Vitriolum album, sive coeruleum, huic scopo prae aliis emeticis idoneum censet, quia utrumque sine praevia nausea effectum ederet.

*) Tetrad. capit. affect. p. 153.

**) Praelect. in Dispens. Brandenb. p. 169.

***) Ephem. N. C. An. IX.

†) Patholog. cerebri, *Amstel.* 1704. p. 592.

††) l. c. p. 432.

†††) Consp. Ther. spec. p. 911.

*) Ars medend. §. 385.

**) Medic. obs. and inqu. Vol. VI. p. 84.

***) l. c. T. II. p. 138.

†) An essay on the recovery of the apparently dead. London. 1788.

§. 45.

Eadem ex causa in *Comate* et *Sopore* fuit adhibitum.

RIVERIUS *) pueros comate affectos sale vitrioli vomitivo citius ac tutius, quam ullo alio remedio liberari dicit. PLATNER **) Gillam Paracelsi in sopore ad $\mathfrak{z}\beta\mathfrak{z}$ j. exhibendam suadet.

§. 46.

Eodem Vitriolo nostro cl. STACK ***) puerum, qui dormiens sanguinem e naribus ruentem deglutiverat indeque *Lipothymia* correptus fuerat, in vitam revocavit. Longa nimirum et tranquilla inspiratione cum brevi et sonora expiratione, quam pro certo ventriculi affecti signo habet, persuasus, non tam inanitionem, quam potius pressionem a sanguine in ventriculo accumulato causam Lipothymiae esse, vini Ipecac. \mathfrak{z} x propinavit, quae quidem post dimidiae horae spatium elapsum vomitum non ciebant. Vitrioli albi vero gr. x. illico multum cruoris ejecerunt, quo ejecto sensim aeger ad sese rediit.

§. 47.

Interdum accidit in decursu *Februm bilioso-putridarum*, ut vomitus, quamvis quam maxime indicatus, tamen impetrari nequeat, dum emeticum unum post alterum exhibitum, nunc ob spasticam ventriculi constrictionem, vel extinctam fere ejus irritabilitatem, omnino nullum effectum edit, nunc ob majorem intestinorum irritabilitatem vel peculiarem corporis idiosyncrasiam, praesertim vero, si diarrhoea jam urget, hunc deorsum exserit. In hoc autem statu ancipiti, praegressis remediis, quae illic spasmus solvere, hic vero acrimoniam irritantem diluere, involvere, nimiam tubi intestinalis irritabilitatem obtundere ac diarrhoeam frustraneam coercere possunt, emeticum, quod hoc sibi privum habet, ut non modo majori vi stimulante irri-

*) l. c. p. 203.

**) l. c. §. 375.

***) Medical cases with occasional remarks, *Bath*, 1784. p. 35.

tabilitatem ac sensibilitatem sopitam resuscitare, sed etiam, absque inverſae operationis metu, citum certumque vomitum provocare queat, non poteſt non eſſe exoptatiſſimum. Atque tale eſſe videtur Vitriol. album; tale ſaltem in binis aegris ſimili ſtatu afflictiſ, ubi et tartarus emeticus, et ipecacuanha, vomitum ſperatum denegabant, ſeſe praeſtiſſe, cel. FISCHER, Praeceptor pie colendus, placide mecum communicavit.

§. 48.

In *Catarrho ſuffocativo*, ad pituitam tenacem et irritantem quam citiſſime eliminandam. Gilla a 3ß-Θjj a SCHULZIO *) PLATNERO **), LOESEKIO ***), aliſque laudatur.

§. 49.

Haud minorem fructum promittit Vitriolum album in *Raphania*, ubi primaria medellae pars circa eliminati-
nem colluviei pituitosae ac verminosae verſatur. In tanta enim, quae ſemper adeſſe ſolet, tubi alimentaris inſenſibilitate, vi, qua gaudet, magis irritante, fibras nervosque ventriculi torpentes efficacius excitare et pituitam glutinoſam, vermium hospitem, potentius, quam ipſe tartarus emeticus, vomitu; ejicere poterit.

§. 50.

Laudantur a pluribus in *Hydrope* emetica, quae totum corpus et viſcera praeſertim abdominis concutiendo debilia contrahere, obſtructa aperire, ſerum tenax ſoluere; ejus reſorptionem promovere et ſic hac illave via evacuare poſſunt, modo ſint viſcera adhuc vitiis libera, aqua extravata non nimium corrupta, vires nondum exhaustae. Vitriolum album vero tum praecipue reliquis emeticis praeſtaret, ubi tonus ſolidorum relaxatus ſimul eſſet roborandus. Haud ita pridem quoque in reſerandis obſtructioni-

*) l. c.

**) l. c. §. 433. 700.

***) l. c.

bus inveteratis indeque orto hydrope valde efficax reperit cl. SCHMALZ †).

§. 51.

Magni quoque aestimarunt veteres Vitriolum album in sananda *Epilepsia*, utpote quod non modo ad colluviem, fere semper huic morbo comitem, evacuandam, sed simul etiam ad tonum relaxatum roborandum irritabilitatemque morbosam placandam prae caeteris esset aptum. ANGELUS SALA *) ad coelum usque attollit, nec minus QUERCETANUS **), PENOT ***), le FEBURE †), CHARAS ††) aliique eo fugasse gloriantur. At vero et nupera experimenta non minus huic remedio favent. Non semel Vitriolo albo epilepsiam sanasse asserit cl. JOHNSON †††), simul autem longius continuandum ejus usum injungit, si quid inde exspectare velis. Aegra, cujus historiam refert, jam per tres annos iniultus epilepticos passa fuerat. Paroxysmi, qui initio rarius reversi erant, nunc intervallo 14 dierum ingruebant. Variis jam remediis, inter haec et valeriana, frustra tentatis, cl. JOHNSONI opem implorabat, qui, suasu cl. SAUNDERS *), Vitriolum album floribus zinci praeferentis, initio bis quotidie hujus gr. v. exhibuit, pedetentim vero ad gr. xii ascendit, quod quidem augmentum praeter levem interdum nauseam, nihil molestiae creavit. Ter quaterve initio brevioris temporis spatio et majori vehementia, quam antea, paroxysmus redibat, dein vero per duos ipsos menses abfuit. Sic, continuato ejus per dimidium anni spatium usu, aegra perfectam sanitatem recuperavit. In epilepsia ab infarctibus atrabilaribus orta Vitriolum

†) SCHWENKE Bemerk. über die Wassersucht und einige langwierige Krankheiten. Mit Zusatz. von SCHMALZ. Dresden, 1787.

*) l. c. p. 498.

**) l. c. p. 153.

***) l. c. p. 118.

†) l. c. P. II. p. 803.

††) l. c.

†††) Medic. and. philosophic. Comment. Vol. V. P. III.

*) ibid.

album in sodalitis aquae laurocerasi et methodi Kaempferianae praedicatur a cel. THILENIO **). Ad vomitum autem excitandum eodem (ut opinor, impuro) dosi sensum aucta usus est cel. HILDEBRANDT ***).

§. 52.

Vitriolum album etiam in *Febribus putridis* eximium esse remedium, tam ex iis, quae de ejus viribus exposita sunt, colligere licet, quam ex frequenti apud veteres in peste aliisque id genus morbis usu patet. Magis vero adhuc elucescit ejus vis antiseptica ex effectibus vix expectandis, quos cl. WIEL *) vidit in febribus putridis, quae Moscoviae epidemice grassantes in nosocomio suae curae tradito ingentem stragem edebant. Cessit interdum morbus aliis idoneis remediis. Quod si vero nono die in pejus mutabatur, vel jam ab initio malignitatis speciem prae se ferebat; statim Vitriol. alb. gr. x-xv in aqu. fl. Chamom. ℥vj. solui, hujusque solutionis omni trihorio ℥β. propinari jussit. Unde materia peccante tam per alvum et urinam, quam per transpirationem eliminata, jam post aliquot a sumto Vitriolo dies ex 56 aegrotis 48 reconvalescere.

§. 53.

Similem ejus efficaciam expertus est in puero, qui in quintum diem *morbo varioloso* laborabat. Variolae erant confluentes et violacei coloris cum pulsu debili, celeri, et tendinum subsultibus conjunctae. Dedit ipsi omni trihorio, quantum cochlear capere potuit mixturae ex aqu. fl. sambuc. ℥vj. Vitriol. alb. gr. IX. et syr. cort. aurant. paratae. Sumtis tribus dosibus, pulsus plenior colorque variolarum rubicundior. evasit. Sic continuato remedio, ut bis vel ter quotidie alvum motum haberet, die decimo quinto fuit sanatus. Plura ejusmodi exempla videantur in Diss. cit.

**) Medicin. und chirurg. Bemerk. p. 129.

***) Geschichte der Unreinigkeiten im Magen und den Gedärmen. 3 B. p. 482.

*) Obs. de usu interno Nucis vomicae et Vitrioli albi in pertinacibus morbis curandis conspicuo Wittenb. 1771.

§. 54.

Vis Vitrioli albi febrifuga jam a CHARAS *), le FEBURE **) aliisque laudatur. Magis vero innotuit ex periculis, quae nuperrime cl. BLANE †) et cl. TELFORD ††) felicissimo cum effectu ad profligandas *Febres intermittentes* cum illo cepere, quarum hic plures sanasse refert, quae cortici peruviano ipsi cedere noluerunt. Exhibuit ejus gr. v. omni quadrihorio, tempore apyrexiae, ac quidem, si a duabus inveterato hydrope complicatis recesseris, in reliquis optato cum effectu. Ansam hisce experimentis capiendis praebuerunt illa, quae cl. HENDY *), dum Barbadosii degebat, cum floribus zinci instituit, quarum ope nonnumquam febres intermittentes profligavit, quae corticis vim diu elulerant. Eandem licet efficaciam in quibusdam casibus TELFORD expertus fuerit; tamen illis Vitriolum album praefert, quippe quod lenius operetur ac magis ventriculo sit amicum. Nequaquam vero hoc omnino cortici peruviano aequiparandum vel substituendum, sed modo in quibusdam casibus, quos quidem non adfert, huic praefendum esse arbitratur. Videtur autem in illo imprimis statu conducere, ubi laxitas solidorum cum dissolutione humorum et pronitate ad sudores noxios coniuncta conspicitur.

§. 55.

Eximios quoque effectus Vitrioli huius usum secutos vidit cl. WIEL **) in *morbis rheumaticis et arthriticis*, licet quidem hic in connubio aliorum remediorum efficacium fuerit adhibitum. Dedit illud cum duplici quantitate extracti amari in pilulas gr. jj. formatum, quarum omni qua-

*) l. c.

**) l. c.

†) Observat. on the diseases incident to seamen; London 1785. P. III Chap. I. p. 420.

††) ibid.

*) ibid.

**) Diff. cit.

drihorio 3 - 4 fumendas iussit. Citum plerumque auxilium attulerunt, dum statim peculiari modo in lotium agebant, et cum hocce materiam arthriticam sub forma sedimenti calcarei et crassae pituitae vasibus adhaerentis e corpore eliminabant. Harum usu cl. WIEL se ipsum ab arthritide haereditaria et ex illa ortis viscerum obstructionibus breui temporis spatio liberasse refert. Eosdem salutares effectus etiam ill. CRELL *) non semel harum pilularum usu praestitos obseruauit, nec vnquam etiam sedimentum illud, materiae peccantis eiectae testis, abfuit.

§. 56.

Iisdem pilulis cl. WIEL et ill. CRELL **) varios *affectus hypochondriacos* feliciter oppugnarunt.

Cl. LETTSOM ***) *Palpitationem cordis* inveteratam post vehementem terrorem in hypochondriaco ortam Vitriolo albo leuauit. Praescripsit eius \mathfrak{ss} in aqu. alexiter. simpl. \mathfrak{z} ij. soluendum, cuius solutionis ter in die cochlear propinauit. Simili modo ill. CRELL ****) *palpitationem cordis* in femina plethorici habitus, instituta prius, at sine leuamine, venaesectione, penitus abstulit. Feminis debilitate hysslerica laborantibus, quibus roborantia et antispasmodica sueta incassum data fuerant, quassiam vitriolo albo nuptam eximio cum effectu propinauit modo laudatus LETTSOM †)

§. 57.

In *Fluore albo* a sola laxitate, vel vniuersali vel partiali, orto, Vitriolum album etiam, vt alia roborantia, interne

*) MARTINI diss. cit. p. 30.

**) ibid.

***. Medicinische Nachrichten von dem allgemeinen Dispensatorio in London von 1773 bis 1774. A. d. Engl. Altenb. 1777. p. 271.

****) l. c.

†) Memoires of the medical society of London. Vol. I. London, 1787. vid. Richter chir. Bibl. 10 B. C. 240.

adhibitum conducere potest, et LEVISON *) hoc praecipue connubio datum laudat: R. Pulv. Fl. Chamom. ℥ss. Vitriol. alb. ℥j. Pulv. rad. Rhabarb. Zingib. ana gr. vj. M. S. Bis quotidie talis sumendus.

§. 58.

Eosdem pulveres LEVISON **) in *Diabete* cum fructu adhibuit. Ac facile intelligitur, Vitriolum album virtute, qua pollet, adstringente et roborante vigorem virium animalium imminutum restituere, vim corporis assimilatricem debilitatem corrigere renumque laxitati mederi posse.

§. 59.

III. CRELL ***) pilulas istas WIELII in figulo vehementi *Colica* saepius vexato cum optimo successu usurpavit. Videtur haec *Colica saturnina*, vel illa, *Pictonum dicta*, fuisse, cui GRASHVIS †), PERCIVAL ††), ipse ill. CRELL †††) aliique alumen tam felici successu opposuere. In *Colica saturnina*, praemissis laxantibus e cremore tartari seu oleo ricini, cum successu praebuit cl. MOSELEY *).

§. 60.

Laudatus JOHNSON **) Vitriolo albo ad *Diarrhoeas* pertinaces compescendas usus est, ubi Ipecac. Rhabarb. terra Japon. aliaque adstringentia frustra fuerant usurpata.

In *Dysenteria* praecipue efficax reppererunt Medici Monspellientes ***) et nuper maxime modo memoratus mo-

*) Beschreib. der Lond. medic. Prax. Berl. 1782. 2 Th. p. 98.

**) l. c. I Th. p. 244.

***) l. c.

†) Tentam. de colica pictonum; Amstel. 1752.

††) Essays medical, and. experimental, Vol. II. p. 194.

†††) v. BALDINGER, Magaz. für Aerzte, Bd. 3. St. I. p. 4.

*) A treatise on tropical diseases and on the climate of the West-indies. London, 1788.

**) l. c.

***) Chem. Lehrsätze der hohen Schule zu Montpell. p. 175.

SELEY *), qui solutionem e Vitrioli albi ℥ijj et aluminis ℥j cum aquae ℔j paratam, dosi ac tempore pro re nata varie mutatis, summo cum fructu propinasse testatur.

§. 61.

Vermes tandem enecare et expellere Vitriolum album plures veterum saepius jam citati asserunt.

*) l. c. vid. Gött. Anz. 1789. 65 St.

XI.


DR. IOANNIS MÜLLER

DISSERTATIO

MEDICAMENTORUM ANTIMO-
NIALIUM CONSPECTUM
SISTENS.

H A V N I A E,

1 7 8 7.



MEDICAMENTORUM ANTIMONIALIUM CONSPECTUS.

P R O O E M I U M.

Pro materia dissertationis inauguralis sumpsi mihi medicamenta antimonialia s. stibiata, sub conspectu chemico-medico ita ponenda et consideranda, ut classificentur secundum partes constitutivas, prout nempe vel utrumque principium, regulus atque sulphur, in solita proportionem, vel regulus solus adest, vel iste sulphurve praevallet, vel neutrum revera datur, utque jugiter efficaciae eorundem in corpore humano habeatur ratio. Hoc labore id in votis habui, ut mihi met ipsi eo magis cognitam atque perspectam redderem praecipuam illam Materiae medicae hodiernae partem, junioribus artis cultoribus simul aliquam exinde nascituram utilitatem sperans. Apparebit enim, immensam illam antimonialium farraginem, quoad essentialia et virtutes medicas, ad paucissima praeparata posse redigi; innumeros illos Regulos, Calces, Infusiones, Tincturas etc. nihil fere esse, nisi variationes arbitrarias; multa denique, quae nostro aevo pro inventis plane novis venditantur, cramben esse bis coctam. Optarem quidem, ut et spatium et tempus mihi esset, historiam antimonii ab antiquissimis inde temporibus enucleate exponendi. At sane haec sola limites dissertationis inauguralis excederet, nec in lectores ulla alia inde redundarent emolumenta, quam ut viderent, Dioscoridis aequae ac Plinii et Galeni temporibus hocce medicamen in usu fuisse, multasque, interdum ridiculas, tam de partibus ejusdem constitutivis, quam de modo praeparandi, apud antiquos, ut et recentiorum nonnullos existisse opiniones. Paucis rem exemplis illustrare liceat. Aliqui, idque Plinii seculo, duo ejus genera statuerunt, marem nempe et foeminam. Alii antimonium pinsita farina circumlutum torruerunt, et deinde mulieris lacte exstinctum in usum asservarunt. Alii iterum huic minerae omnium fere metallorum, ut auri, argenti, mercurii, aeris, princi-

pia viresque medicatas inesse putarunt. Alii de terra quadam mercuriali tanquam principio antimonii constitutive fomniarunt. Sed incerta, dubia, fabulosa mittam, quaeque ex saniore chemia de antimonii principiis et virtutibus nostro magis enubilato aevo innotuerint breviter proponam, quo magis dein elucescat, quaenam falsa, quaenam vera sint, cum de multivariis hujus medicamenti praeparationibus agendum erit. Compendium autem laboris haud exiguum mihi pariet, et clariorem, ut spero, lucem ipsi conspectui adfundet praevia consideratio nonnullorum theorematum, tam analyticis quam syntheticis experimentis et observationibus medico-practicis superstructorum, quae igitur praemittere fas sit.

THEOREMATA CHEMICO-MEDICA.

a. *Analytica.*

I.

Antimonium in statu suo naturali, quod *crudum* vocant, consideratum, constat ex metallo quodam singulari, *Regulo antimonii dicto*, et *Sulphure communi*. Hoc antimonium crudum modica dosi propinatum drasticas vires in corpore humano non exferit.

II.

Regulus antimonii solus, ex *terra metallica specifica* et *phlogisto* combinatus, semper in corpore nostro, dummodo in non nimis minuta quantitate propinetur, aque ventriculi humoribus solvatur, vomitum ciet.

III.

Regulus antimonii, calcinatione libera maximam partem suo phlogisto privatus, in pulverem cinereum mutatus, deinde in Vitrum conversus, utraque sub conditione valentiores effectus, non raro drasticos, in corpore humano producit, quam immutatus ille regulus (II.)

IV.

Pulvis iste cinereus (III.) quem *Calcem antimonii* dicunt, vel etiam ex eo confectum *Vitrum antimonii*, acidis, impri-

mis muriatico, soluta, ut statum salinum ineant, qualam e. gr. in Butyro antimonii cernimus, in summo efficaciam drastrictam exercet gradu.

V.

Regulus denique antimonii, omni suo phlogisto orbatus, sistit *terram* illam *specificam* antimoniale (II.) albidam et sub nomine *Antimonii diaphoretici abluti* notam, de cujus efficacia inter medicos disputatur. A modo tamen, quo praeparatum est, magnopere pendet sensibilis vel dubia ejus virtus.

b. *Synthetica.*

VI.

Haec autem *terra antimonialis* sub nova cum tantillo phlogisti copula, ut calx antimonii cinerea, vires acquirit drastrictas.

VII.

Calx antimonii parum phlogificata, acido nupta, qualem e. gr. sistit Tartarus emeticus, efficaciore vi drastricta praedita est.

VIII.

Terra antimonialis, majori phlogisti copia juncta, eo-que quasi saturata, et ope ignis in statum metallicum reducta, in quo *Regulus antimonii* audit, difficilius in corpore humano solvitur, adeoque minus efficax, quam antea, dum phlogisto pro parte erat destituta.

IX.

Regulus antimonii denique cum sulphure in eadem proportionem, quam novimus adesse in antimonio crudo, per fusionem combinatus, exhibet productum, antimonio crudo simile, quod *Antimonium regeneratum* vocant, in quo vires drastrictae *terrae specificae antimonialis phlogificatae*, ob intimam cum sulphure copulam quam maxime limitatae sunt.

Ex his rite consideratis facile apparet, quid virtutis expectandum sit a quolibet antimoniali praeparato, in stupenda illa farragine, ad quam perlustrandam nos jam

accingimus, occurrente. Quippe in singulis, quatenus antimonium ipsis inest, ratione habita proportionis tam sulphuris, quam phlogisti, ad terram specificam antimoniam, facile computari poterit efficacia. Hunc in finem itaque medicamentorum antimonialium conspectum, qualem convenientissimum judicavimus, doctiorum examini subijcimus.

CONSPECTUS GENERALIS.

Omnia antimonialia chemice considerata in quatuor classes dispelci possunt, quarum

Ima ANTIMONIA ipsa,

II da REGULINA,

IIIa REGULINO-SULPHUREA,

IVta PSEUDOSTIBIATA sistit.

Placeat lectori cum hacce classificatione comparare illam, quam Cl. *Saunders* in elegantissimo suo opusculo *) dedit, nec non illam, quam nuperrimus auctor, Cl. *Ebell* **) exhibuit. Prior nempe omnia *ex antimonio parata* dividit in *regulos*, sive *acido junctos*, sive *non junctos*. At vero nimis contractam seu angustam esse hanc divisionem facile patet. Et primo quidem ipsum antimonium nativum a praeparatis ex antimonio removendum esse, inficias ibit nemo, qui perspicit, quantum simplex a praeparato distet. Deinde binas illas classes varia pseudostibiata, cum stibiatis ipsis nequaquam confundenda, ingredi necesse est. Ita quidem ipse auctor regulinis, nulli acido junctis, inseruit Tincturam antimonii tartarifatam. Ita quoque suo systemate coactus hepar antimonii sejunxit a regulis cum sulphure combinatis. Plura exempla afferre possem, si hoc loco singula extricare liceret.

Alterum auctorem quod attinet, sequentes ille condidit classes: 1. Regulos. 2. Calces. 3. Vitra. 4. Sulphurea. 5. Salina. 6. Spirituosa. In hoc systemate mi-

*) *Observationes de Antimonio ejusque usu in morbis curandis*, Londin. 1773.

**) *Diff. inaug. de Medicamentorum antimonialium differentia*, Göttingae 1784.

nus congruum mihi videtur, quod ex calcibus et vitris classes fecerit speciales, quae tamen tanquam ordines sub regulinis comprehenduntur. Simpliciter sulphurea dicit auctor, quae ipse tamen ex regulo et sulphure composita esse agnoscit. Spirituosa in singularem redigit classem, quae tamen vel ad salina vel ad pseudostibiata pertinent.

CONSPECTUS SPECIALIS.

CLASSIS PRIMA.

A N T I M O N I A.

ANTIMONIA hic dicimus illa praeparata, in quibus regulus et sulphur adsunt in proportionem et forma naturae consentanea, sive ipsa mater, sive ars illa combinaverit. Sunt autem vel simplicia, vel composita, prout vel solum adest antimonium, vel alia ingredientia admixta sunt.

A. ANTIMONIA SIMPLICIA.

I. ANTIMONIUM CRUDUM OFFICINALE, Graecis forte $\sigma\iota\mu\mu\iota$, $\sigma\iota\beta\iota$, Latinis *Stibium*, alias *Plathyophthalmon*, *Larbason* etc. dictum, a peregrinis lapideis, terrenis et aliis inquinamentis, quae ipsi adhaerere solent, separatum est minera singularis cujusdam semimetalli, ponderosa, splendens, striata, friabilis, nigricans, saporis et odoris expers, in qua semimetallum seu regulus aequali circiter sulphuris communis portione est mineralisatum *). Ipsum semimetallum se ab aliis figura sua chrySTALLINA, stellam radiatam exhibens, distinguit, ejusque gravitas specifica ad g. f. aquae est ut 8000 ad 1000. Gravitas specifica antimonii crudi plerumque ad aquae g. f. ut 4700 ad 1000 **), quae ratio

*) Sulphur antimonii a vulgari nullo modo esse diversum probant Boerhaave, F. Hoffmann, Meuser et alii. Sulphuris vero et reguli mutua proportio diversa ab auctoribus statuitur. Hic autem dissensus oritur tam a difficultate rationem harum partium accurate indagandi, quam a varia proportionem quae reapse in antimonio invenitur e diversis petito fodinis. Ita antimonium e Gallia et Britannia allatum regulum et sulphur fere aequali proportionem mixta continet. In Hungarico autem ratio sulphuris ad regulum reperitur ut 1 ad 3 vel 4.

**) Muschenbroekii introductio ad philosophiam naturalem, p. 537.

tamen pro variis sodinis, e quibus obtinetur antimonium, quin et pro ejusdem coni partibus *) differt. Impura enim minera fusione in formam conicam a peregrinis adhaerentibus liberatur. Purior autem fusioni non subicitur.

2. *ANTIMONIUM CRUDUM PRAEPARATUM*, sive *Alcohol antimonii*, est antimonium crudum subtilissime pulverisatum et super porphyrite tamdiu laevigatum, donec vel minimae particulae splendentes disparuerint, quo facto multa aqua abluitur et siccatum in usum asservatur. Antimonium ita praeparatum propter subtilitatem particularum suarum ab acido in primis viis facilius solvitur.

3. *ANTIMONIUM REGENERATUM*. Hujus praeparationem in theoremate IX. indicavimus. Non modo experimenti causa instituitur ista synthesis, verum etiam frequentius in usum medicum adhiberi deberet; ita enim purissimum medicis practicis subministraretur antimonium praeparatum.

B. ANTIMONIA COMPOSITA.

4. *AETHIOPS ANTIMONIALIS*. Antimonium crudum et sal commune α . p. mixta funduntur per horam; frigesacta massa in fundo crucibuli invenitur quidam regulus, (sed minus proprie sic dictus, cum maximam partem antimonium crudum sit), qui diligenter a scoriis separatus teratur cum α . p. mercurii vivi usque dum globuli mercuriales penitus extincti fuerint **). Iuxta Pharmacopoeam Danicam antimonii crudi purissimi unc. i. teritur cum mercurii vivi unc. β . Ab hac formula recedit Pharmacopoea Svecica ***) addendo scilicet florum sulphuris dr. β †). Dantur et aliae ingredientium proportiones, sed his supersedeo, quum practicis tutius et rectius sibi ipsis formulam componere expediat, quo de quantitate mercurii certiores fiant.

*) Apex nempe basi ponderosior est et reguli ditior.

**) *New Dispensatory* p. 545.

***) In editione priori A. 1775. Sed in altera praescribitur hydragryi p. iii, cum Kermes mineralis p. ii. trituration.

†) Cum hoc convenit *Aethiops antimonialis Huxhami*. Rec. antimonii purif. subtiliss. pulver. p. iii. mercur. viv. puriss. p. iv. flor. sulphur. p. ii. M.

5. MORSULI ANTIMONIALES, vulgo *restaurantes Kunkelii* *). Amygdalarum dulcium decorticatarum et minutim incisarum unc. I. antimonii praeparati unc. β. cinnamomi minutim concisi dr. II. sacchari albissimi ad consistentiam tabulati cocti dr. VII. misceantur, fiant inde morsuli XVI aequales. Praestat tamen recentem aliquam miscelam, quam istos facile ranceicentes morsulos exhibere.

Morsulos antimoniales Pharmacop. Brandenb. et Kleinii, Pilulas antimoniales ejusdem, Pilulas de Vinqued, Decoctum antivener. Zwelferi et Kleinii, sudoriferum Richardi de Hauteferk, Bolum psoricum ejusdem et multa alia tam officinalia quam magistralia, diversimode composita, quorum infinitum fere numerum cumulare possem, omittere praestat.

CLASSIS SECUNDA.

R E G U L I N A.

Regulina antimonialia mihi sunt illa, in quibus nulla alia Stibii pars adest, praeter regulum, quantumvis forma diversum. Quotquot enim plus minusve sulphuris in sinu suo fovent, ad *regulino-sulphurea* jure meritoque referuntur. Sub triplici autem forma habentur haec *regulina* strictissime sic dicta, *metalli* nimirum, *calcis* et *salis*.

A. REGULI *ipsi* sive *regulina metallica*.

Regulina metallica quid sint ex dictis patet: Scilicet pars antimonii metallica a sulphure quidem separata, sed suo phlogisto, ejusque beneficio metalli dotibus, quotquot ipsi competunt, gaudens. Est vero regulus vel *simplex*, nihil alieni metalli continens, vel *compositus*, Martis, Jovis etc. majori minörive copiae junctus.

Ad sulphur ab antimonio crudo separandum complures viae sunt excogitatae, adjectis nempe vel certis salibus, qualia sunt alkali fixum quodcunque, aut quaedam salia media; vel adjectis metallis, e. g. bismutho **), argento, stan-

*) *Laborat. chem. P. III. c. 32.*

**) Si ad detrahendum sulphur bismutho usus fueris, regulus antimonii purus obtineri dicitur, quia hic cum omnibus metallis, Bismutho excepto, copulam init.

no, cupro et imprimis ferro, quippe quae majorem affinitatem cum sulphure habeant, quam regulus ipse. Potest etiam regulus obtineri reductione variarum calcium, ut croci metallorum, mercurii vitae, vitri antimonii, nec non antimonii per se calcinati, addito nempe corpore phlogisti divite, e. gr. resina, sapone nigro aliove pingui cum pulvere carbonum mixto. Qui ex tali reductione producuntur reguli, simplicibus, utpote ab omni alieno metallo immunes, annumerantur.

α. REGULI ANTIMONII SIMPLICES.

REGULUS ANTIMONII SIMPLEX quid sit ex praecedentibus elucescit. Modus autem illum parandi duplex est. Antiquior *) et nostro aevo obsolescens methodus ea est, qua antimonio crudo sal adjicitur, ad sulphur abstrahendum inque hepatis speciem convertendum idoneum, quale est vel nitrum vel tartarus crudus, vel amborum miscela. His nonnulli addiderunt pulverem carbonum. Selectus et proportio variant. Anaticas nitri, tartari et antimonii crudi partes sumpservnt veteres. Pharmacopoea Danica ad antimonii crudi unc. xxiv nitri praescribit unc. xvi et tartari unc. xviii. Alii usi sunt tartari p. ii ad antimonii p. i. Alii iterum alia proportionem usi sunt. Ea procul dubio erit optima et seligenda, quae maximam reguli puri largitur copiam. Praestantior methodus, ab aevo Kunkelii cognita, alteri, utpote ipsius reguli partem consumenti et magis sumptuosae haud immerito praeferenda, consistit in calcis antimonialis simplici calcinatione paratae reductione. Quem Zwelferus proposuit, modus, solius pulveris carbonum ope ex antimonio crudo educendi regulum, irritum sistit laborem rationali chemiae plane non congruum.

β. REGULI ANTIMONII COMPOSITI.

Horum characterem jam dedimus. Occurrunt autem species ejusdem sequentes:

I. REGULUS ANTIMONII MARTIALIS paratur ex ferri lb. i. antimonii crudi lb. ii. alkali vel nitri unciis iv. β

*) Regulum simplicem salis ope eductum. *Vegetabilem* perperam dixerunt antiquiores.

fufis. Si proportio antimonii ad ferrum fit uti 3 ad 1, regulus pauciores adtrahit particulas martiales, minori repurgatione indiget et indole ad regulum antimonii simplicem proxime accedit.

2. REGULUS ANTIMONII IOVIALIS constat ex p. 11. reguli antimonii simplicis et p. 1. stanni, simul fufis.

3. REGULUS METALLORUM. Reguli antimonii martialis p. 11. cupri, stanni, singulorum p. 1. simul fundantur.

4. ELECTRUM ANTIMONII MINUS ex antimonio crudo, obtinetur ex antimonii crudi p. vi. stanni, plumbi, ana p. 111. fufis addantur tartari crudi p. xii, nitri p. viii. Massam denuo committe igni, ut instar aquae fluat, eamque in calicem fusorium effunde. Proportio tartari et nitri ad massam heic nimia est, cum tantum addantur ad fluxum promovendum. Stannum vero cum plumbo sulphuri absorbendo inservit.

5. ELECTRUM ex regulo. Regulus antimonii martialis et stannum aequali pondere mixta funduntur. Hoc *Antihectico Poterii* conficiendo inservit.

6. ALIUD ex argento. Reguli antimonii martialis et argenti p. æ. funduntur.

7. ELECTRUM ANTIMONII MAIUS. Antimonii crudi, martis, ana lb. i. veneris, jovis, saturni, mercurii ana dr. 11. M. fundantur adjectis nitri uncis 11. In hoc praeparato nihil mercurii remanet.

8. ALIUD. Reguli antimonii martialis unc. iv. veneris dr. 11. jovis dr. 111. saturni unc. β. lunae dr. i. solis dr. β. M. fundantur, adjiciantur nitri unciae 11.

9. REGULUS ANTIMONII SOLARIS Basilii Valentini, paratur ex auri p. i. et antimonii crudi p. iv. fufis. In hoc processu, qui interdum instituitur ad aurum purificandum *), aliquid regulinae partis antimonii cum auro jungitur, reliquum antimonii scoriae instar supernatat et peregrina metalla, si his aurum inquinatum fuerit, sulphure suo soluta continet.

*) GELLERT *Anfangsgr. der metallurg. Chemie* p. 421.

B. CALCES REGULINAE.

Sub *Calcis* nomine venit regulus, suo phlogisto plus minus vel omnino orbatus, sive hoc perficiatur vel solo igne, vel per additamenta, per sublimationem, detonationem, corrosionem, solutionem et praecipitationem. Sub triplici illa occurrit forma, *calcis* nempe *strictius* ita dicendae, *vitri-
ficatae* et *salinae*.

α. CALCES STRICTE SIC DICTAE.

Calces regulinas strictiori sensu dicimus, quae nec vitri speciem prae se ferunt nec salini quid admixtum habent. Differunt autem prout vel simplices sunt vel compositae. In utrisque enarrandis ab illis, quae maximam jacturam phlogisti fecerunt, ordiemur.

a. *Simplices.*

I. ANTIMONIUM DIAPHORETICUM *) ABLUTUM, *Diaphoreticum minerale, Calx antimonii alba*. Formula illud praeparandi antiquissima haec est. Antimonii crudi p. i. et nitri p. iiii. calcinantur et deinde aqua abluuntur. Fundamentum operationis eo nititur, quod pars acidum nitrosi cum sulphure antimonii per detonationem in auras abigatur; alia acidum nitrosi pars cum phlogisto reguli detonat, adeo ut regulus totus in calcem dephlogisticatam mutetur, qui a nullo acido simplice solvitur, sed aqua regis. Haec solutio diutius integra manet, quam illa reguli, quae successive paululum terrae metallica deponit. Aqua diversarum decantationum quodammodo evaporata et in locum frigidum seposita, crystallos praebet prismaticas, in quibus nonnullae haerent particulae regulinae. Crystalli *nitrum antimoniatum* audiunt. Praeter has quoque prodit *tartarus*

*) Epitheton diaphoreticum non competere Calci antimonii per detonationem rite calcinatae et edulcoratae putarunt medicorum nonnulli, hanc pro terra inerte habentes. At vero non adeo inertem esse hanc terram ex reductione ejus patet. Deinde an impossibile dixeris, in corpore humano phlogisti non secus ac acidum quid cum illa calce copulam inire, hincque eandem efficacem reddi? Sed quid opus est verbis, ubi ipsi Clinici (Perillustrem de Berger nominasse sufficiat, qui instar multorum est,) testantur, diaphoreticum ablutum cum fructu jungi aliis medicamentis.

*vitriolatus antimoniatu*s, ab acido sulphuris, sub detonatione evolutu, et ab alkali nitri exortus. Ex nitro superflite patet non tanta portione ejus ad perfectam calcinationem opus esse, nisi adhibeatur antimonium crudum, quod prae alio sulphuris majore copia gaudeat.

2. *POUDRE DE LA CHEVALRIE* est antimonium diaphoreticum per repetitas fusiones cum nitro emendatum (ut crediderunt scilicet), et edulcoratum.

3. *DIAPHORETICUM REGULINUM*, *Cerussa* antimonii, *Cerussa antimonialis diaphoretica*, *Sulphur album philosophorum Knoeffelii* paratur ex p. i. reguli antimonii simplicis et p. iii. nitri, eodem modo quo antimonium diaphoreticum, a quo etiam, si ablutum fuerit, nihil differt. Proportio nitri ad regulum quoque heic nimia est.

4. *BEZOARDICUM MINERALE* seu *antimoniale Crollii* obtinetur, si mercurii vitae p. ii. cum nitri p. iii. calcinantur et massa dein edulcoratur. Alia, et magis usitata methodus *Bezoard. minerale* parandi haec est: butyri antimonii, vel pulveris Algarothi p. i. miscetur cum acido nitri p. ii; a miscela, retortae injecta, abstrahitur acidum, (quod *Spiritus nitri bezoardicum* perperam vocarunt antiqui; est enim *aqua regia* impura) residuum calcinatum edulcoratur. In hoc processu affusum acidum nitri *) cum acido salis butyri antimonii efficit aquam regiam, quae partem regulinam praecipue solvit; hinc, acido abstracto, residuum calcinatum et edulcoratum est mera calx antimonii; in illo autem acidum nitrosum mercurii vitae phlogiston destruit, relinquens cum calce dephlogisticata alkali, aqua ablendum. Est itaque *Bezoard. minerale*, modo licet diverso praeparatum, mera calx antimonii cum praecedenti conveniens.

5. *PRAECIPITATUM ANTIMONII DIAPHORETICUM*. Croci metallorum p. i. cum acido nitri p. vi. per aliquot dies digeruntur, dein igne forti ad ficcitatem abstra-

*) Acidum nitri non solum mercurium vitae, cui, ut alibi demonstrabitur, inest portiuncula acidi salis, verum et regulum antimonii, vel alias ejusdem calces, phlogisto gaudentes, in calcem meram mutare valet.

hitur acidum, pulvisque residuus aqua abluitur, qui nihil aliud est quam antimonium diaphoreticum ablutum.

6. *ANTIMONIUM DIAPHORETICUM FIXUM* five *Flores antimonii fixati*, five *Materia perlata* obtinetur, si massa salina antimonii diaphoretici adhuc calida cum aqua coquitur, posteaque aceto aut alio quodam acido praecipitatur; edulcoratum est mera calx antimonii.

7. *PRAECIPITATUM ANTIMONII PURGANS* five antimonium *crudum fixatum*. Antim. crudum aqua regis solvitur, pars regulina soluta inde ope aquae praecipitata calcinatur. Heic reg. antimonii mediante aqua regia dephlogificatur, adeoque cum antimonio diaphoretico convenit.

8. *NIX DIAPHORETICA ANTIMONII* *). Sulphuris antimonii aurati p. i. acidi vitriolici concentrati p. ii. misceantur, in retorta digerantur et exinde liquor abstrahatur. Residuum bene ablutum praebet pulverem album, quo antiquiores externe tamquam cosmetico, interne autem tamquam diaphoretico usi fuerunt. Haec nix a praecedenti praecipitato antimonii diaphoretico in eo differt, quod acidum vitrioli semimetallum phlogisto suo non plane priverit.

9. *PANACEA SULPHURIS ANTIMONII VERI Schröderi*. Sulphuris antimonii et reguli antimonii ana p. i. cum acidi vitriolici concentrati p. iii. per octo dies digerantur; liquore ad ficcitatem abstracto, residuum edulcoratum nostram sistit panaceam. Hoc praeparatum est calx regulina non plane dephlogificata. Pars enim acidi vitrioli arripit phlogiston metalli, atque novum sulphur generat, cum sulphure antimonii sublimatione abiens; reliquum acidum regulum in calcem corrodit, illum vero non plane phlogisto suo privat. Hinc virtutis est parum emeticae, quae tamen major, quam in Nive diaphoretica.

10. *CALX* five *CINIS ANTIMONII* five antimonium *ustum colore cinereo*. Ex antimonio crudo pulverisato patinae figulinae non vitreatae imposito, leniori igne, sub perpetua agitatione sulphur cum magna parte regulini phlogi-

*) SCHROEDER *Pharmac.* p. 442.

sti in auras abigitur. Haec calx vi emetica gaudet ob rationem in Theoremate III. adductam.

II. CALX ANTIMONII MAGICA. Sic vocatur calx antimonii per Solis radios mediante speculo aut vitro caustico parata, praecedente paullo candidior.

12. FLORES ANTIMONII CRUDI per *detonationem* *). Antimonii crudi p. i. cum triplo Nitri in retortam tubulatam candentem successive ingeritur, atque flores inde ascendentes in recipiente excipiuntur. Hi flores gaudent virtute emetica, quippe phlogisto non plane privati, cujus tamen proportio, ut in omnibus floribus quocunque demum modo paratis, incerta est, quare etiam, ut par est, raro vel nunquam in medicina adhibentur.

13. FLORES REGULI ANTIMONII sive *Flores antimonii argentei*. Hi sub fusione reguli antimonii simplicis in tigillo superimposito perforato excipiuntur; virtute gaudent diaphoretica et secundum *Lemery* pro regulo destructo haberi possunt. Reliquae FLORUM variis modis praeparatorum species eorumque virtutes videantur passim suis locis.

14. EMETICUM MITE ANTIMONII *Boerhaavii*. Paratur illud ex antimonii crudi p. i. cum nitri p. ii. detonatis. Vires nomini respondent et proxime accedunt ad eas antimonii diaphoretici; nam, dimidia parte nitri superaddita, antimonium suo phlogisto perfecte privatur.

15. PULVIS IACOBI *Primi ordinis*. Anglice: *James's Powder* parari dicitur eodem modo, ac praecedens, mutata tamen proportione, nimirum ex antimonii crudi p. iv. cum nitri p. vii. detonatis; hinc ob privationem minorem phlogisti paulo fortius agit, quam emeticum mite.

b. *Compositae.*

I. PULVIS IACOBI *secundi ordinis*, qualem *Donald Monro* (in praelectionibus medic. ex Cronii instituto p. 62)

*) Ejusmodi flores sub praeparatione antimonii diaphoretici, crucibuli lateribus adhaerent, ope spatulae sollicite separandi et rejiciendi, vel massae fluenti adjiciendi, ut in meram calcem mutantur.

descripsit, revera nihil aliud est, quam miscela e calcis antimonii granis xxx. et mercurii praecipitati rubri grano 1; haec dosis ab auctore *Jacobo* ut plurimum una vice propinata, plerisque in Anglia practicis merito nimia esse videtur.

2. CROCUS MARTIS ANTIMONII APERITIVUS *Stahlii*. Scoriae edulcoratae reguli antimonii martialis cum duplo, aut triplo nitri mixtae in crucibulo rite deflagrando liquantur et dein aqua edulcorantur. Hic crocus potius pro calce ferri, quam antimonii habendus est.

3. ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE s. *Cachecticum Ludovici*, e regulo martiali, ad arbitrium ferro impraegnato, eodem modo paratur atque antimonium diaphoreticum vulgare ablutum; est adeoque calx ex antimonio diaphoretico et croco Martis composita.

4. ANTIHECTICUM POTERII. Reguli antimonii simplicis vel martialis p. iv. stanni partes ii. ad p. viii. confundantur; frigesacta massa redigatur in pulverem, cum triplo nitri calcinetur et eluatur. Rarissime haec calx in usum vocatur, nec forsan unquam vocari debuisset.

5. SULPHUR EX REGULO ANTIMONII IOVIALI. Ex regulo Ioviali et nitro paratur calx cum lixivio alkalino forti coquenda, et soluta calx aceto destillato praecipitanda. Praecipitatum hoc elotum nullo modo sulphureum, sed mera est calx antimonii et stanni.

6. BEZOARDICUM MARTIALE obtinetur ex regulo antimonii martiali butyrum antimonii destillando; unde acidum nitri ex retorta abstrahitur, et cohobatur, residuum denique calcinatur et aqua eluitur. Est mera calx antimonii et ferri.

7. BEZOARDICUM IOVIALE eodem, ac praecedens, paratur modo; adhibito nempe regulo joviali loco reguli martialis.

8. BEZOARDICUM SATURNINUM paratur ex vitro Saturnino et butyro antimonii, unde acidum nitri aliquoties cohobatur. Est calx antimonii et plumbi.

9. BEZOARDICUM SOLARE *Crollii*. Dimidia librae butyri antimonii dr. iv. auri, aqua regia soluti, adde et ad

siccitatem abstrahere, a residuo affusum acidum nitri iterum iterumque abstrahere, residuum bene edulcora.

IO. BEZOARDICUM LUNARE. Simili obtinetur modo, dummodo pro auro addatur argentum in aqua forti solutum.

II. CERUSSA ANTIMONII SOLARIS. Reguli antimonii simplicis unc. i. aur. dr. i. simul funduntur; frigidata massa in pulverem redigitur, qui cum triplo nitri calcinatur et dein aqua abluitur.

12. ANTIMONIUM DIAPHORETICUM SOLARE AURATUM *Zwelferi* eodem modo paratur ac praecedens, addendo ad nitrum cremoris tartari unc. β . Cui bono haec additio, sciat *Zwelferus*.

13. SPECIFICUM STOMACHICUM *Poterii* *) est regulus antimonii martialis cum vel sine auro confectus per nitrum calcinatus et dein edulcoratus.

β . CALCES VITRIFICATAE.

Vitrificatae calces antimoniales sunt, quae fortiori igne in massam vitream mutatae sunt. Sunt illae vel simplices vel compositae.

a. *Simplices.*

I. VITRUM ANTIMONII, ex sola calce antimonii per se parata fortiori igne in crucibulo bene tecto per fusionem obtinetur. Color optimus ejusdem, teste *Huxhamo*, est pellucide hyacinthinus, variat tamen, prout calx adhibita plus minus suo phlogisto privata fuit **). Calcis antimonii unc. viii. dederunt mihi vitri unc. vi. cum dr. vi.

2. VITRUM REGULINUM *Schroederi*. Regulus antimonii pulverisatus per se in calcem redigitur, eodem modo ac antimonium crudum, ex qua tandem f. a. paratur vitrum, a praecedenti non differens.

*) vid. *J. Helfrici IUNKEN Lexicon* p. 237.

**) Calx antimonii suo phlogisto nimium orbata per se in vitrum verti nequit absque novo phlogisti accessu. Haec est ratio, cur illud semper virtutem exerceat emeticam.

3. SUCCINUM ANTIMONII Schroederi est vitrum antimonii ex mercurio vitae s. a. paratum. Nomen a colore habet. Respectu virium illud a praecedenti non differt.

4. VITRUM ANTIMONII Bergmanni *) paratur ex antimonio diaphoretico et pauco sulphure fufis.

5. VITRUM ANTIMONII SOLARE Schroederi. Antimonii crudi p. xvi. cum auri p. i. funduntur, massa per se calcinatur et denique in vitrum mutatur. Num aurum hujus vitri neque in solitis menstribus medicis, neque in ventriculo solubile, virtutem medicam exercere possit, merito dubitatur.

b. *Compositae.*

I. VITRUM ANTIMONII CERATUM. Iuxta Pharmacopoeam Edinburgensem **) cerae flavae dr. i. in vase ferreo liquefactae injiciatur vitri antimonii tenerrime contriti unc. i. calcinentur leni igne per semihoram, spatula continue agitando; dein effundantur in chartam et frigidata redigantur in pulverem. Dosis est a gr. ii. ad xx. usque. Non autem calcinanda sed frigenda est massa, ut vitrum in cera quodammodo solvatur et vis ejus corrosiva per oleosas cerae partes quasi dulcificetur. Hinc vitrum antimonii ceratum simplici vitro mitius multo est, et fere iners redditur iterata cum cera tostione, id quod experimento ipse compertus sum. Ratio hujus inertiae procul dubio in eo quaerenda est, quod vitrum antimonii ob repetitam cum cera calcinationem in regulum quasi reducitur. Iam vero vires reguli completi in corpus humanum incertae, et pro quantitate et qualitate acidi in ventriculo latitantis, variae sunt. Hinc ergo colligitur, quare vitrum antimonii ceratum modo mitius agat, modo nullas fere exerat vires.

γ. CALCES SALINAE.

Salinam dicimus calcem regulinam, cui admixtum est salis quid, sive hoc sub processu accesserit, sive studio super-

*) Diff. de Antim. sulphuratis.

**) In editione Baldingeriana p. 104.

additum fuerit. A diversitate hujus salis derivavimus ordinem pertractionis, prout nempe illud vel acidae vel mixtae naturae fuerit.

a. *Acidae.*

I. MERCURIUS VITAE *). *Pulvis Algarothi* **), *Aquila alba* ***), *Magisterium antimonii* †), *Pulvis angelicus*, *Mercurius mortis*. Vulgaris et antiquissima hunc praeparandi methodus jubet, ut butyrum antimonii, quocunque demum modo paratum ††) magnae copiae aquae calidae instilletur; ita quidem regulus nonnihil dephlogisticatus sub forma pulveris albi fundum petit; aqua supernatans decantatur et praecipitatum frigida eluitur.

Aquam decantatam veteres perperam dixerunt spiritum vitrioli philosophicum; est illa vero acidum salis dilutum, cui nonnullae particulae regulinae adhuc insunt, quae alkali beneficio inde praecipitari possunt. Praecipitatum hoc ablutum vocatur *Materia perlata*. Pulvis ille Algarothi est calx regulina phlogisto suo nonnihil orbata, adhucdum cum portione acidi salis conjuncta, cujus praesentia exinde probatur, quod mercurius vitae destillationi subjectus aliquantulum butyri antimonii praebeat. Ita quoque, si huic pulveri instilles acidum vitrioli concentratum assurgit fumus, odorem acidi salis spirans. Est autem mercurius vitae medicamentum valde drasticum, et infidum; hinc usus ejus in medicina forsan jam abrogatus esset, nisi illo magni viri, *Macquer* et *Bergmann* pro parando tartaro emetico usi essent. Hunc in finem *Schelius* †††) brevior et minus pretiosum modum eum absque solito antimonii butyro parandi commendavit. Scilicet hepatis antimonii pulverisati lb. i. affunditur miscela ex aquae lb. iiii, olei vitrioli et salis culinaris ana lb. i.

*) Ita Paracelsus in *Archid. magic.* L. V.

**) A medico quodam Italico.

***) Hoc nomen confusionis causa vitandum est, quum Mercurius dulcis eodem passim insigniatur.

†) Datur aliud antimonii magisterium suo loco exponendum.

††) Observari hic meretur, nullam praecipitationem fieri ex butyro antimonii semel rectificato, vel acido salis adhuc diluto et postea crystallisato. De hujus phaenomeni causa vide butyrum antimonii rectificatum.

†††) vid. *CRELLS Neuesste Entdek. in der Chem.* T. VI. p. 171.

digeritur haec massa per XII. horas, refrigerata filtratur; residuum rursus cum tertia parte antea indicati menstrui digeritur et liquor filtratur. Hae duae solutiones miscentur, illisque sat magna copia aquae fervidae affunditur, quo facto mox praecipitatur pulvis albus, qui edulcoratus et ficcatus cum praecipitato ex butyro antimonii convenit.

2. FLORES BUTYRI ANTIMONII Crollii *). Est mercurius vitae aqua calida edulcoratus.

3. MAGISTERIUM ANTIMONII B. V. Ut longam operationem paucis complectar, omnis huc redit labor. Ex aluminis usti unc. iv, antimonii crudi, salis culinaris et boli armeni ana lb. β . destillatur oleum (butyrum nempe antimonii) in quo solvitur aurum foliatum; solutioni denique adjicitur aqua et praecipitatur pulvis albus (nimirum mercurius vitae). Nonne antiqua haecce praescriptio recentioribus viam monstravit, butyrum antimonii viliori pretio obtinendi?

4. ROSA VITAE MINERALIS. Est mercurius vitae e butyro antimonii ope tincturae fantali rubri praecipitatus.

5. PRAECIPITATUM ANTIMONII PURGANS *Rolfincii* **). Ille vitrum antimonii salis acido solvit ***) solutumque aqua praecipitavit. Praecipitatum istud est mercurius vitae.

6. PRAECIPITATUM REGULI ANTIMONII MARTIALIS Schroederi. Regulus antimonii martialis acido salis solutus aqua praecipitatur, praecipitatum edulcoratum calcinationi committitur. Procul dubio hoc idem est, ac pulvis Algarothi, quoniam particulae ferreae ab acido salis solutae, sub praecipitati edulcoratione in aqua solutae manent.

7. MERCURIUS VITAE CORRECTUS *Schroederi*. Mercurium vitae tam diu calcinari jubet *Schroederus*, donec ruber evadat. Calcinato affunditur spiritus vini iterumque abstrahitur. Pulvis residuus paulo mitior est mercurio vitae, siquidem acidum salis partim igne partim per spiritum vini aufertur.

*) *Basilic. Chem. p. 130.*

**) Eadem formula exstat apud SCHROEDERUM sub nomine *Vitri antimonii correcti*, sed perperam; nam id sane vel ipso vitro simplici acrius est.

***.) SAUNDERS l. c. p. 42.

8. MERCURIUS VITAE CATHARTICUS *Schroederi*.

Mercurius vitae saepius trituratur cum sale culinari, et dein aqua abluitur. Hac via illius vim drastrictam diminuere al- laboravit auctor, sed frustra. Alii mercurium vitae ex bu- tyro antimonii ope solutionis alkali fixi praecipitarunt. Po- steriori hac methodo scopum quodammodo attigerunt che- mici; etenim mercurius vitae suo sic privatur acido salis, adeoque mitius agit.

9. VITRUM ANTIMONII CORRECTUM *Schroederi*,

hoc nihil aliud est, quam *Praecipitatum purgans* Röllinccii, de quo sub No. 5. legimus.

10. PANACEA EX BUTYRO ANTIMONII. Butyri

antimonii partibus VIII. admisce spiritus vini p. III. et per hebdomadem digere; digestionem peracta, spirituque ab- stracto *), residuo affunde acidi vitrioli diluti p. XII. ite- rumque digere et liquorem ad siccitatem abstrahe, rema- nentiam tandem ad rubedinem calcina. Est calx antimonii unde acidum salis per acidum vitrioli expulsum est.

11. FLORES ANTIMONII DIAPHORETICI. Flo-

res antimonii acido sulphuris (i. e. acido vitriolico volatili) madefacti et dein siccati in crucibulo, operculo tecto, leni igne calcinantur. Vero simile tamen est hos flores parum de vi sua drastricta hac operatione amisisse. Idem ac prae- cedens.

12. VITRUM ANTIMONII MAXVELLI PURGANS

PER INFERIORA. Vitri antimonii pulverisati unciae I. septies affunde acidi vitriolici concentrati unc. I. totiesque iterum abstrahe. Residuum autem, deflagrando super il- lud spiritum vini, (melius: destillando inde S. V.) edulcoret- tur. De hoc praeparato idem iudicium, ac de praecedenti, ferendum est.

13. ANTIMONIUM VITRIOLATUM, s. *Mercurius*

vitae coelestis *Klaunigii* **) ex iisdem ingredientibus et eo- dem modo paratur ac praecedens, adeoque idem.

b. *Mixtae*.

I. PANACEA AUREA REGULINA PURGANS B. V.

*) Est spiritus salis dulcis, odore tetro praeditus.

**) Ejus Nosocomium *charitatis* 1718.

Antimonii diaphoretici e regulo antimonii martiali p. II. diagrydii et cremoris tartari ana p. I. misceantur. Est calx antimonii et martis, virtuti additorum nupta.

2. PULVIS CORNACHINI, *Pulvis Comitum de Warwick, Pulvis Diatrion*. Parum ille abludit a praecedente, quum sola proportio ingredientium, pro lubitu varianda, discrimen faciat. Hunc scilicet una pars cremoris tartari, tres partes antimonii diaphoretici et quatuor diagrydii constituunt. Angue autem pejus practici sibi caveant, ne ejusmodi pulverem diu servatum aegrotis propinent, quippe horrendam emesin et hypercatharsin excitantem *).

3. ANTIMONIUM CATHARTICUM *Wilsoni* **). Vitri antimonii pulverisati parti I. sensim sensimque instilla acidi vitriolici concentrati p. III. digere per 48 horas et leni calore abstrahe acidum, residuum frigesactum aqua elue, donec omnem amiserit acrimoniam; dein sicca et cum æ. q. salis mirabilis Glauberi, nec non dupla salis enixi (i. e. Arcani duplicati) contere; haec mixtio in crucibulum injecta per spatium horae quadrantis lente fluat, tandem massam ab igne remotam et frigesactam in pulverem redige. Hoc praeparatum propinavit *Wilson* dosi a gr. II. ad x. usque, neque ullam exinde in stomacho oriri nauseam animadvertit. Praeterea tres aegrotos lue confirmata correptos illius usu se curasse auctor adserit. Quantum ad hanc curam, sit fides penes auctorem. Quod illud ne nauseam quidem excitare valeat, nullus dubito, quum id revera nihil aliud sit quam antimonium diaphoreticum cum sale mirabili Glauberi et arcano duplicato conjunctum.

C. SALIA REGULINA.

Sal regulinum sistit regulus ab acido quodam vere solutus, sive formam induat siccam, sive liquidam. Inde eluescit, quomodo differat a calce regulina salina. Subdivisionis fundamentum a diversitate menstrui dependet.

α. SALIA REGULINA VITRIOLATA.

Sunt haec quoque vel simplicia vel composita.

*) vid. thes. *Trilleri* P. I. p. 529.

**) A compleat course of chemistry by *G. Wilson* 1725, p. 104. vid. et *New dispensatory* p. 573.

a. *Simplicia.*

1. SAL ANTIMONII ex Vitro. Vitrum antimonii mediante acido vitriolico diluto extrahitur; extractio decantatur, leni calore evaporatur et deinde in loco frigido chrysalificationi exponitur. Est sal regulinum vitriolatum. Ex illo, quod institui, experimento obtinui crystallos lanceolato-plumosas.

2. VITRIOLUM ANTIMONII, *Antimonium* s. *stibium vitriolatum* recentiorum. Reguli antimonii parti i. affunde olei vitrioli p. iv. destillando abstrahere acidum, quod, teste Morveau, ex reguli phlogisto volatile est et sulphureum, residui autem pars quaedam solubilis est; solutio frige facta in crystallos abit, quae ejusdem sunt indolis, ac sal antimonii ex vitro.

b. *Composita.*

1. VITRIOLUM ANTIMONII B. V. Vitrum antimonii acido vitrioli et aceti per digestionem, quoad fieri potest, solutum, in formam salinam evaporando redigitur. Cum praecedente convenit.

2. FLORES ANTIMONII DIAPHORETICI TARTARISATI. Alkali tartari et florum antimonii alborum ana p. æ. misce et in crucibulo funde; massam exemptam loco humido ad deliquescendum repone. Liquoris dein obtenti partibus ii. admisceatur acidi vitrioli concentrati p. i. et miscela ad siccitatem abstrahatur. Residuum est tartarus vitriolatus antimonii.

3. VITRUM ANTIMONII CORRECTUM B. V. et Schroederi. Vitrum antimonii in oleo tartari per deliquium solve *) solutioni acidum vitrioli dilutum guttatim instilla; quo facto crystalli fundum petunt.

β. SAL REGULINUM NITRATUM.

ANTIMONIUM NITRATUM. Regulus antimonii ab acido nitri potius corroditur, quam solvitur, exigua tamen

*) Hac via admodum exigua pars vitri solvitur, unde hoc praeparatum parum a tartaro vitriolato differt. Tentandum foret, num solutio majoris copiae alkali cum vitro antimonii fusi in aqua sub saturatione per acidum partes antimoniales retineat.

ejus portio soluta manet. Calcium antimonii autem major portio in acido nitri solvitur.

γ. SALIA REGULINA MURIATICA.

I. BUTYRUM ANTIMONII. *Causiticum antimoniale, Oleum antimonii **). *Sal antimonii muriaticum, antimonium salitum, sibiium salitum* Bergmanni. Antiquissimus illud praeparandi modus sequens est: Antimonii crudi pulverisati **) parti i. admiscetur mercurii sublimati corrosivi p. ii. vel iii. Ex hac miscela butyrum antimonii destillatur. Hodie satis superque notum est, hoc butyrum originem suam unice debere conjunctioni acidi salis concentrati cum particulis regulinis, simulque sublimari cinnabarin, mercurio vivo et sulphure antimonii sese invicem arripientibus. Recentiores chemici itaque, tam laboris quam sumtus ratione habita, secundum vetustas quasdam formulas ***) et principia artis aliam inierunt viam illud viliori pretio obtinendi. Sic cl. *Wiegler* ex salis culinaris p. iv, acidi vitriolici concentrati p. iii, diluti aquae simplicis p. ii. et antimonii crudi p. i. destillavit butyrum antimonii. Formula a cl. *Gmelin* laudata nihil a priori differt, nisi proportionem ingredientium mutata. Eundem finem assecutus est cl. *Hagen*, adhibendo salis culinaris et aluminis usti ana p. ii. antimonii crudi p. i. Butyrum autem antimonii his praeparatum modis id secum fert incommodi, ut ad usus externos nimis sit dilutum, atque odorem tetrum sulphureum spiret. Hoc vitium evitaveris, si loco antimonii crudi adhibueris vel regulum antimonii vel crocum metallorum, vel potius, si juxta mentem *Göttlingii* illud ex vitro paraveris; alterum vero, sequendo formulam a cl. *Hagen* praescri-

*) Hoc nomen confusioni aniam praebere potest, quum et occurrat *Oleum antimonii B. V.*

**) Vel etiam reguli antimonii p. iii. cum mercurii corrosivi sublimati p. viii. At tunc nulla oritur cinnabaris.

***) Apud B. V. reperitur formula butyrum antimonii parandi ex antimonio crudo, sale culinari et argilla. *Rolfsack* (Diff. de antimonio C. xx.) destillavit illud ex miscela antimonii crudi, salis culinaris et vitrioli. Praeterea etiam *Becher, Glauber, le Febvre* et alii bene multi hujus methodi mentionem fecerunt.

ptam *). De praecipitatione mercurii vitae ex butyro antimonii vide suo loco.

2. BUTYRUM ANTIMONII RECTIFICATUM. *Oleum antimonii*. Sic vocatur butyrum antimonii iterum ex retorta destillatum. Proprietates, quae hoc a praecedente distinguunt, sunt fluiditas major, et in aqua pura solubilitas, absque praecipitatione. Fluiditas cum perfecta solubilitate oritur partim a perfectiori calcis cum acido unione, partim a majore acidi salis copia. Sub destillatione enim tantum proveniunt particulae regulinae acido salis superfaturatae, relictæ in fundo retortae portione regulina, ad quam perfecte solvendam acidum deficiebat. Hujus theoriae fundamentum sequenti experimento nititur. Butyrum antimonii nondum rectificatum, copiosiori acido salis adfuso, totum in crystallos abit et cum butyro antimonii rectificato convenit.

3. BALSAMUS VULNERARIUS *B. V.* **). Antimonii crudi p. II. salis culinaris p. I. argillae p. XII, mixta in retortam injice et exinde destilla balsamum. Prodit inde butyrum antimonii debile et parcum.

4. OLEUM ANTIMONII *B. V.* Antimonii calcinati, salis gemmae ana p. III. pulvis silicum p. II. mixta destillantur. Labor hic imperfectus similis est praecedenti; sal scilicet gemmae ut plurimum continet paululum terrae calcareae salitae sive salis ammoniaci fixi, quod acidum suum diuturno igne expelli finit.

5. OLEUM ANTIMONII CRYSTALLINUM. Floribus antimonii affunde aquae fortis p. æ. digere et exinde destilla spiritum; hunc laborem, novam aquam fortem affundendo, aliquoties repete, tandem massam ex retorta destilla, excipiendo seorsim liquorem primum, dein, mutato excipulo, oleum. Hoc veteres pro butyro antimonii habuerunt, nec injuste. Nam illud acidum, quod aquae for-

*) Vide plura apud WIEGLEB *Algeme. Handb. der Chem.* §. 1011. CRELL *Chem. Journ.* T. III. p. 118. *Neueste Entdeck.* T. VII. p. 81. T. X. p. 97. *Chem. Annal.* T. II. p. 203. TYCHSEN *Chem. Haandb.* §. 939.

**) Sunt, qui butyrum antimonii rectificat, et balsamum Vulner. B. V. pro synonymis habent; sed, uti jam patet, minus recte.

tis nomine veteres insignierunt, revera fuisse acidum salis, ex adnotatione apud Schroederum didici. Scilicet expelli jubent illam aquam fortem ex vitriolo calcinato, sale culinari et argilla.

δ. SAL REGULINUM ARSENICATUM.

Regulus antimonii ab acido arsenici, teste Scheelio, via humida *) solvitur, solutio autem plerisque acidis uti et aqua pura decomponitur.

ε. SAL REGULINUM BORACINUM.

Hoc obtinetur, si regulo antimonii, aqua regia soluto, adjiciatur solutio boracis. Sub hac operatione aqua Regis cum alkali minerali se conjungens expellit acidum boracis, quod regulum arripit et fundum petit.

ζ. SAL REGULINUM PHOSPHORATUM.

Calx antimonii, teste *Bergmanno*, cum acido phosphori connubium init. Nuperrime etiam relatum legimus de regulo antimonii in forma calcis vi naturae per acidum phosphori mineralisato, quem Comes *Razoumowsky* in Sabaudia detexit, et experimentis subiectum invenit, ipsi aequalem mineram componi, si calcis antimonii p. viii. cum acidi phosphori p. X. uniuntur **). Ejusdem minerae specimen possidet Illustriss. de *Holmskiold*, ex Hungaria adlatum.

η. SAL REGULINUM SUCCINATUM.

Calx antimonii, minime vero regulus, ab acido succini solvitur, quae quidem solutio, teste Wenzelio, nulla solutione alkalina praecipitatur, nisi hepate sulphuris soluto.

θ. SALIA REGULINA ACETATA.

I. SAL ANTIMONII EX ANTIMONIO CRUDO, (rectius e calce) antimonium crudum, post praeviam per se calcinationem, aceto destillato extrahitur et dein evaporatur. Haec

*) Via sicca nulla datur solutio, quia acidum arsenici eripit regulo suum phlogiston et inde in regulum arsenici mutatur.

**) CRELL chem. Annal. 1786. IV. St. p. 291.

extractio virtute emetica gaudet; regulum ex illa reduxi. Nullae vero obtinentur crystalli.

2. VITRUM ANTIMONII DIAPHORETICUM. Sub hoc titulo intelligitur hujus vitri antimonii solutio in aceto. Cum praecedente convenit.

3. OXYSACCHARUM VOMITIVUM LUDOVICI. Vitri antimonii dr. β . infundantur aceti vini unc. xviii; digestionem peracta filtretur liquor, in quo solvantur sacchari unc. iv. solutio dein ad syrupi consistentiam evaporetur. Nomen suum respondet hoc praeparatum.

4. TINCTURA EX ANTIMONIO CALCINATO *B. V.* Lapidem prunellae et antimonium crudum aenatica proportionem mixta per quinque dies igni reverberatorio committantur. Ex massa elota, (quae fere eadem est ac crocus metallorum) ope aceti destillati extrahatur tinctura. Haec quoad vires parum ab aqua benedicta Rulandi differt, sed magis drastica est.

5. TINCTURA EX CROCO METALLORUM *Bickeri.* Ex croco metallorum cum aceto destillato extrahe tincturam decantandam et ad mellis spissitudinem evaporandam. Nomen tincturae improprium, vires autem cum praecedente conveniunt.

6. TINCTURA FLORUM ANTIMONII VITRIOLATORUM. *Antidotus Lysipyretos.* Flores antimonii rubri et vitriolati primum spiritu vitrioli veneris, (i. e. spiritu vitrioli) dein spiritu saturni aethereo, (i. e. aceto concentrato et saccharo saturni destillato) infunduntur et extrahuntur. A praecedente parum differt.

7. ELIXIR SOLARE ANTIMONII. *Electrum* sive *Lilium Paracelsi.* Reguli antimonii et auri p. æ. simul funde et cum salis ammoniaci p. iv. sublima; sublimationem peracta, partes salinae aqua eluuntur, residuum autem calcinatur; e calce primum aceto dein spiritu vini extrahuntur tincturae post mixtionem concentrandae. Hoc medicamentum gaudet vi emetica, nihil vero continet auri, quippe quod in residuo remanet.

8. TINCTURA EX FLORIBUS REGULI. *Antidotus panchrestos.* Flores reguli antimonii rubri per tres dies calcinationi committuntur, dein extrahuntur aceto, quod ad

siccitatem evaporatur, huic denique affunde spiritum vini quem iterum abstrahere. Spiritu, ut praescribitur, abstracto, remanentia, substantiae gummosae haud dissimilis, idem fuit praeparatum ac illud, quod obtinetur extractione prima cum aceto, nempe sal quoddam antimonii acetatum *); nisi operatio ita instituat, ut apud alios auctores reperi, quod scilicet, extractione cum aceto peracta, residuo in retorta affundatur spiritus vini, hicque iterum destillatione abstrahatur. Hic spiritus convenit cum tinctura ex antimonio rubro fixo, et balsamo vitae B. V. quae videantur sub sectione Pseudostibiatorum.

ι. SAL REGULINUM BENZOINUM.

Exigua tantum portio calcis antimonii ab acido Benzoes solvitur.

κ. SAL REGULINUM CITRATUM.

Acidum citri libenter regulum, attamen duntaxat sub forma calcis vel vitri solvit.

λ. SAL REGULINUM CYDONIATUM.

ROOB VEL SAPA VOMITORIA *Sylvii*. Vitri antimonii unc. I. cum succi cydoniorum libr. IV. aliquandiu digere, liquorem digestum filtra et inspissa ad syrupi consistentiam. Est praeparatum valde drastrictum.

μ. SAL REGULINUM SACCHARATUM.

Regulus antimonii ab affuso acido sacchari nigrescit, solutio vero non datur nisi adhibeatur vel calx antimonii, vel ejus vitrum, utrumque acido sacchari solutum et evaporatum crystallos praebet, in aqua difficulter solubiles.

ν. SAL REGULINUM ACETOSELLATUM.

Acidum acetosellae, nec non sal acetosellae ipsum, quod heic praestat, calces antimonii solvit, cumque illis

*) Haec appellatio quibusdam fortasse impropria videbitur. Sed considerent, velim, particulas regulinas heic ab aceto esse solutas, licet forma crystallina non gaudeant, nam ex illa substantia quasi gummosa, maximam partem in aqua solubili, regulum reduxi.

massam salinam sistit tartaro emetico, teste *Wenzelio* et aliis, haud dissimilem; nec mirum, sal enim acetosellae, hujusque acidum, juxta recentiorum experimenta parum aut nihil differt a cremore tartari hujusque acido, quod iterum indole convenit cum acido tamarindorum, sacchari, lactis, vini, hisque similibus vegetabilium acidis.

§. SAL REGULINUM TAMARINDATUM.

Sal essentiale tamarindorum cum alkali vegetabili saturatum cum vitro antimonii anatica proportionem mixtum atque in sufficiente quantitate aquae per semihoram coctum, teste *Lassonio* praebuit sal emeticum, viribus et indole neque a tartaro tartarificato antimoniali *Bergmanni*, neque a praecedente ulla ratione diversum.

o. SALIA REGULINA TARTAREA.

1. *Cum acido tartari puro.*

Experimenta, quae cl. *Bergmann* *), cum sale essentiali tartari et regulina antimonii parte sub variis formis instituit, (adhibendo nempe regulum, hepar, crocum metallorum, vitrum, antimonium diaphoreticum, materiam perlata, pulverem Algarothi etc.) manifeste ostendunt, acidum tartari solum nihil fere in corrodenda regulina substantia valere, quamdiu illa adhuc phlogisto abundat, sed prout hoc diminuitur, illa magis quoque solutioni apta redditur. Ast Vitrum antimonii, phlogisto licet ditius, quam quidem antimonium diaphoreticum, nihilominus faciliori negotio solvitur, quam hoc; non tamen, adeo ut acidum tartari purum pro menstruo congruo ad parandum tartarum emeticum haberi queat.

2. *Cum tartaro tartarificato.*

STIBIUM TARTARO TARTARISATUM *Bergmanni* **). Tartarus tartarificatus substantiae regulinae stibii solvendae par est et fere eodem modo ad varias stibii praeparationes se habet atque cremor tartari, adeo, ut ab illo sale medio

*) Diss. de Stibio tartarificato, Upsal. 1773. p. 9. seqq.

**) l. c. p. 16.

regulus antimonii parum aut nihil solvatur, crocus metallorum magis, vitrum autem antimonii, antimonium diaph. et mercurius vitae maxime in illo fit solubilis.

3. *Cum crySTALLIS tartari.*

TARTARUS EMETICUS, *Tartarus antimonialis*, *Stibium* sive antimonium *tartarifatum*. Hujus medicamenti, omnium antimonialium facile praestantissimi, praeparatio eo redit, ut tam acidum crystallorum tartari quam tartarus tartarifatus in illis delitescens regulinas antimonii partes solvant atque eiscum vel in chrysellinam vel pulverulentam formam abeant.

Ad hoc praeparandum chemici variis usi sunt methodis, variisque ex stibio praeparatis, uti hepate antimonii, croco metallorum, calce antimonii per se, vitro antimonii, nec non mercurio vitae. Prima, ni fallor, formula reperitur apud *Adrianum Mynsicht* *), qui crocum metallorum adhibuit. *Zwelfer* autem ut et *Saunders* **) vitrum antimonii commendarunt. Horum sententiam amplexi sunt *Wiegleb* ***) et *Höpfner* †). *Lassone* et *Bergmann* ††) deinde novam proposuerunt methodum. Duae unciae totidemque drachmae pulveris Algarothi cum unc. v. crystallorum tartari et lib. i v. aquae fontanae per semihoram in vase figulino leniter coquantur, solutio filtrata, remanente in filtro paucopulvere nigricante, in alio vase leni igne ad cuticulam evaporetur et crystallisationi exponatur. Quantitas tartari emetici hoc modo crystallisati fere eadem vel etiam paulo major est quantitate cremoris tartari adhibiti. Licet vero de successu hujus operationis nullum sit dubium, confido tamen plerosque practicos methodum *Saundersi*, *Wieglebii* vel *Höpfneri* fore praelaturos. Illorum methodus breviter haec est. Vitri antimonii rite parati, (i. e. pellucidi coloris hyacinthini) p. i. et crystallorum tartari p. ii. affundatur aquae tantum, ut ad unc. β. tartari aquae adda-

*) *Thesaur. chem. med.* Hamb. 1631.

**) *Obs. de Antimon.* p. 80.

***) *Algem. Handb. der Chem.* §. 1045.

†) *Abhandl. über die Bereit. des Brechweinst.* Weim. 1782.

††) *l. c.* p. 16.

tur lib. I. Coctio instituat, imprimis si quantitatem majorem, e. g. libram tartari emetici parare velis, per horas XII. *), et sub coctione tantum aquae rursus affundatur, quantum fuit evaporatum. Posthac liquor fervidus filtretur et filtratus sub continua agitatione ad siccitatem inspissetur. In hoc tartaro emetico pondus cremoris tartari, a soluto vitro adauctum diversum ab auctoribus statuitur. Haec autem diversitas non imputanda est majori minorive portioni vitri antimonii, a cremore tartari solutae, sed potius inspissationi ad pulverulentam siccitatem haud institutae, unde fit, ut cremoris tartari aqua crystallisationis haud rite evaporata pondus tartari emetici augere valeat. Namque licet ab uncia I. cremoris tartari drachmas III. cum scrupulis II. vitri antimonii per debitam coctionem solvi ipse experimentis didicerim **); nihilominus tamen in tartaro emetico ad pulverulentam siccitatem inspissato, minime, ut ait *Saunders*, crystallorum tartari uncia quaeque augmentum ponderis ad drachmas tres, sed ad drachmam unam cum dimidia acquirit. Hinc ergo patet, quam necessaria sit hujus medicaminis inspissatio ad pulverulentam siccitatem. Caveatur quoque, ne coctio fiat in vasis, quorum materia in solutione fervida cremoris tartari solubilis est. Cum tartarus emeticus, hoc modo praeparatus, intentioni practico- rum egregie satisfaciat, non consultum fore duco mercurium vitae in locum vitri antimonii substituere.

4. STIBIUM TARTARISATUM AMMONIACALE *Lassonii*. Cl. *Lassone* tartarum emeticum cum æ. p. salis ammoniaci depurati invicem miscuit: miscelae partibus II. aquae partes III. affundi solutionemque salinam crystallisationi tradi jussit. Ejusmodi tartarus emeticus non solum ob summam in aqua solubilitatem absque praecipitatione practicis commendandus est, sed etiam ob virtutes salis ammoniaci peculiare, quae cum illis tartari emetici junctae scopo medicorum egregie saepe favent. Plura de hoc praeparato adferre non hujus loci est; dosin vero hujus altero tanto majorem esse debere, sponte liquet.

*) Coctionem per 24 horas injunxit cl. *Wiegleb*; sed hoc tum demum necessarium est, cum vas non fuerit satis capax.

**) Idem quoque observavit cl. *Höpfner* et alii.

5. *ESSENTIA ANTIMONII EMETICA Schroederi.*
 Florum antimonii alborum unc. II. β . tartari crudi unc. v. cum q. f. aquae ad plenariam solutionem coquantur. Decoctum coletur et ad remanentiam unc. vi. evaporetur. Huic remanentiae adde sacchari albi unc. vi. atque ad consistentiam syrupi inspissa. Hunc syrupum esse emeticum, at impurum et infidum, nemo non videt, cum non modo flores antimonii, quoad vires incertas, sed etiam tartarum crudum, semper impurum praescripserit auctor. Ab antiquis a dr. β . ad I β . propinatus fuit, quod si impune factum sit, sine dubio tartaro crudo inhaerentes impuritates vim florum mitigarunt.

π. SALIA REGULINA VINOSA.

I. *ESSENTIA f. VINUM ANTIMONII Huxhamii* *). Vitri antimonii rite praeparati unc. I. in pulverem redigatur, cui affundantur vini maderatici optimi frigidi unc. xiv; hoc liquidum per x. aut xii. dies saepius agitur; subsideat deinde liquor per unum alterumque diem, effundatur vinum, et coletur per chartam bibulam albam, ferveturque in lagena vitrea bene obturata. Tali modo paratum vinum, pergit auctor, per plures annos conservari potest; praestat tamen elapso uno alterove mense recens denuo parari, quia, ut recte admonet *Leonhardi*, per longam moram aliquid regulini fundum et latera vasis petit. Vinum maderaticum ab auctore praefertur, quia melius, quam pleraque alia vina, conservatur; vinum tamen album hispanicum generosum bene quoque convenire asserit. Modum praeparationis *Huxhamii* verbotenus adduxi; quia certe optandum est, hocce praeparatum, utpote reliquis antimonii tincturis, infusionibus nec non plerisque antimonialium praeparatorum, ob subtilissimam partium regulinarum in vino grato solutionem, palmam praeripiens, semper et ubique idem esse. Quare illud etiam primo loco inter salia regulina vinosa posui, non ut horum antiquissimum, sed ut reliquorum normam. Laudo quoque sententiam auctoris,

*) Opp. physic. medic. edit. Reichel. T. III. p. 129. vid. et ejusdem *Medical et Chemical Observations upon Antimonium*. Lond. 1756. p. 1.

qui illud in ultimis suis scriptis absque aromaticis parari jubet. Vinum enim antimonii, per se sat efficax et jucundum remedium, aromaticorum virtute et deliciis non indiget; praeterea si quis de illorum efficacia in hac vel illa indicatione aliquid boni exspectat, addere illi licebit vinum quoddam aromaticum vel spiritum huic similem. Dosis hujus medicaminis pro medendi scopo vario varia est: propinatur nempe adultis a guttis xxx. usque ad unc. β . De hujus vini meritis et iusta laude lege plura in *Huxhamii* opp. 1. c.

2. VINUM ANTIMONIALE *Leonhardi* *). Est solutio tartari emetici in vino dulci, quam vino antimonii H. auctor praeferendam esse putat; sed ad meam aliorumque practitorum opinionem minus iuste, non enim dubitandum est salia metallica, si per acidum, quod certe vino dulci inest, solvuntur, alterationem quandam subire, et praesertim tartarum emeticum, qui vel sola aqua solutus successu temporis facile inde ex parte praecipitatur. Suam tamen hoc vinum meretur laudem, si determinatam quantitatem tartari emetici contineat, inprimis si solutio fiat extemporanea, eademque non multo post aegris propinetur.

3. INFUSIO VITRI ANTIMONII *B. V.* Vitri antimonii pulverisati dr. i. vel dr. ii. cum vini generosi lib. iii. per sat longum tempus leni calore digerantur. Etiam si proportio vitri antimonii ad vinum magnopere ab ea, quam praescripsit *Huxhamus*, recedat, utrique tamen similis inest virtus, cum exigua tantum portio vitri a vino solvatur.

4. AQUA BENEDICTA *Rulandi*, per infusionem croci metallorum cum vino Rhenano obtinetur et natura sua parum aut nihil a priori differt.

5. VINUM sive HIPPOCRAS EMETICUM *Musitani*. Recipe mercurii vitae unc. ii. β ., caryophyllorum, cinnamomi aa dr. i β . vini graeci lbr. ii, leni calore digerantur. Hoc vinum suo nomini facile respondebit.

CLASSIS TERTIA.

REGULINO-SULPHUREA dicimus illa praeparata, in quibus regulis et sulphur quidem adsunt, sed neque in pro-

*) *MACQUERS chemisch. Wörterb. a Leonhardi edit, T. V. p. 331.*

portione, neque forma *), quibus natura antimonium formavit, adeo, ut jam haec jam illa pars praevaleat. Haec iterum sunt distinguenda in simplicia et composita.

a. *Simplicia* quid sint per se elucescit; ceterum non negaverim hisce interdum portiunculam menstrui et praecipitantis adhaerescere. In his vero adornandis, quoad ejus fieri potest, ordiemur ab illis, quae indole et viribus proxime accedunt ad antimonium crudeum.

I. CROCUS ANTIMONII MEDICINALIS.¹ Antimonii crudi p. viii, nitri p. i. mixtae simul fundantur, massa fusaedulcoretur. Hic crocus est species reguli antimonii medicinalis; mitius tamen ob minorem privationem sulphuris agit vulgari; quare illum hic primum adduxi: reliquae autem species videantur in sequenti descriptione.

2. REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS, f. *Febri-fugum Craanii*, f. *Rubinus antimonii*. Antiquissima et vulgatissima methodus sequens est: antimonii crudi p. v. salis culinaris p. iv. et alkali tartari p. i. simul fundantur. Massa fusa, frigesacta et a scoriis separata terendo in pulverem mutetur, qui aqua calida ablutus siccatur, iterumque in subtilissimum pulverem teritur. Hoc praeparatum colorem ex fusco rubrum exhibens, perperam vocatur regulus, qui vires fere habet antimonii crudi, ita tamen ut hoc paulo sit efficacior; exigua enim portio alkali, sub fusione cum sulphure et regulo hepar antimonii efficiens, parum sulphuris, facta nempe ablutione, detrahit, acidi salis culinaris pars non nihil reguli sub forma butyri antimonii siccioris aut florum volatilizat; maxima autem salis culinaris pars scoriam super nostra format massa, adeoque a nonnullis omittitur. Varii praeterea propositi sunt processus, alii

*) Cl. Ebell antimonium crudeum, Kermes minerale et sulphur antimonii auratum etc. in una eademque classe posuit, sed mea opinione minus juste; pars enim regulina Kermes mineralis et sulphuris antimonii aurati his non inest in ea proportionem ad sulphur, qua est in antimonio crudo, nec in eadem forma, sed potius ceu calx, phlogisto plus minus orbata: praeterea crocus metallorum, quem inter calces posuit, regulino sulphureis adnumerandus fuisset, utpote non solum magna parte sui phlogisti, verum etiam aliqua sulphuris gaudens.

enim loco alkali adhibuerunt vel tartarum crudum *), vel tartarum vitriolatum, vel nitrum, quorum salium prius sub fusione in alkali mutatum hepar antimonii format, alterius vero acidum cum phlogisto reguli sulphur: acidum autem nitrosum primum sub detonatione portionem sulphuris antimonii arripiens cum illo avolat, deinde alkali nitri a suo acido liberum, quantum per quantitatem licet, cum sulphure antimonii hepar sulphuris constituit, quod substantiam regulinam ex parte solvit. Patet adeoque, quamdiu una tantum pars hujus vel illius salis ad quinque partes antimonii fumatur, parum interesse, quonam horum utamur; salium vero portione adaucta, actionis alkali et nitri non una eademque ratio est. Sunt et qui regulum medicinale per synthefin parant, adjiciendo nempe croco metallorum, aut vitro antimonii sulphur commune; potest quidem hac viâ acquiri medicamen a regulo medicinali parum diversum, ratione nempe habita ingredientium justae proportionis: ast cui bono? Sunt etiam, qui regulum medicinale per fusionem sulphuris antimonii aurati parari jubent; hoc autem fufum a regulo medicinali stricte dicto et indole et viribus differre, quis non videt? in sulphure enim aurato pars sulphurea praevalet, hujusque pars regulina mutationem majorem subiit, quam in regulo medicinali fieri solet. Experimento rem illustrabo: ex antimonii crudi et vitri antimonii p. æ. per fusionem cum paucis alkali paravi regulum medicinale, ab illo, methodo antiquissima parato, fere nihil diversum: nec mirum; nam vitrum antimonii, non solum sulphuris, verum et maxima parte phlogisti orbatum, si antimonio crudo adjeceris, idem evenit, ac si de hoc aliquam sulphuris portionem detraxeris, ejusque regulum pro parte in calcem mutaveris.

*) Alii ex spumae (rectius sedimenti incrustati) Thermarum Carolinarum p. i, antimonii crudi p. v. per fluxionem lentam, ut ebullitio nimia impediatur, idem medicamen pararunt, huicque praeparato ob particulas subtilissimas ferreas, sali Thermarum inclulas, mirificam tribuerunt efficaciam; ferri vero admixtio per chemicas operationes magis determinato et certiori modo fieri potest.

3. CROCUS ANTIMONII MITIOR *) paratur ex antimonii crudi p. II, nitri p. I. mixta simul fundantur, massa fusa edulcoretur. Hoc praeparatum regulo medicinali acrius est, et croco metallorum mitius.

4. PANACEA ANTIMONII **) paratur, uti antecedens, ex antimonii crudi p. II, nitri p. I, salis culinaris p. I. β , pulveris carbonum p. I. Edulcoratum praecedente paulo acrius est, et croco metallorum mitius. Omnia haec praeparata sunt medicamenta varii gradus medii inter antimonium crudum et crocum metallorum; cujusmodi autem varietates praxis medica vix exposcit.

5. CROCUS ANTIMONII s. METALLORUM, *anodynum minerale, terra sancta Rulandi*. Hepar antimonii, sive per fusionem antimonii cum alkali, sive per detonationem cum aequali portione nitri paratum ***) sufficiente quantitate aquae fervidae solvitur, solutio adhuc calida colatur, residuum denique ablutum pulverem sistit colore spadiceo praeditum. Ob colorem *crocus* vocatur, qui cognomen *metallorum* sortitus est, quod veteres stibium pro matre veluti omnium metallorum habuerint. *Croci metallorum*, qui a *Rulando*, *Brendelio*, *Denzelio* nomen habent, nihil a priori differunt, nisi salium adjectorum copia justo major fuerit, uti nec *crocus metallorum absynthiacus Mynsichti*; sal enim absynthii non alia virtute in stibium agit, quam alkali. Quid autem sit crocus metallorum, paulo accuratius examinemus. Hepatis antimonii indolem notam ponimus, hujus massa calida, aquae fervidae injecta, partim solvitur, ob hepar sulphuris in aqua solubile, secumque ve-

*) Vide new Lond. dispensatory.

**) loco citato.

***) Haec in praeparando hepate antimonii differentia in causa quoque est, cur nonnihil discriminis inter crocos metallorum intercedat. Sic croco metallorum, post elotionem hepatis antimonii per detonationem cum nitro parati superstiti, testibus *Scheele et Wiegleb*, portiuncula arcani duplicati semper adhaeret. ablatione quantumvis optime instituta. Est et ejusmodi crocus, teste *Meu-dero*, lenioris efficaciae, idque procul dubio ob eandem causam; nam proportio sulphuris hujus croci ad regulinas partes certe minor est illa, quae in croco ex hepate antimonii cum alkali fuso obtinet.

hens regulini quid, ut lotiones ejusmodi hepatis monstrant; namque successu temporis ex illis sponte secedit pulvis colore ex rubro spadiceus, qui Kermes minerale audit, postea, adhibito acido, alius praecipitatur pulvis, altiori colore praeditus, nempe sulphur antimonii auratum; pars reliqua massae hepaticae insolubilis et in filtro remanens est species quidem Kermes mineralis, cujus partes regulinae nonnihil phlogisti et sulphuris continent; posterioris indicia praebet aër hepaticus, exinde sub affusione acidi salis oriens, et croci metallorum ulterior cum nova additione nitri detonatio; minorem tamen sulphuris portionem continet, quam Kermes minerale, quia sulphur sub lotione a croco separatur, verum in praeparatione Kermes mineralis sulphur cum particulis regulinis spontanea secessione fundum petit. Ex hisce adeoque liquet, quantum crocus metallorum a Kermes minerali discrepet, simulque perspicitur, quam longe a veritate aberrarint, et qui illum pro hepate antimonii, ablutione partibus salinis orbato habuerint, et qui meram antimonii calcem esse dixerint.

6. KERMES S. CHERMES MINERALE, *sulphur antimonii rubrum*, *Pulvis Carthusianorum*. Primam hujus pulveris formulam dedit chirurgus nomine *la Ligerie* *) quam post illum fusiùs explicavit *Gaubius*. Methodus antiquior haec est: antimonii crudi ruditer pulverisati p. *iv*. coquuntur per horas quatuor cum liquoris nitri fixi p. *i*. et aquae communis p. *viii*. Absoluta coctione lixivium fervidum filtratur et reponitur, ut ex eo refrigerato pulvis se se praecipitet coloris obscure rubri. Residuum antimonium iterum cum eadem liquoris nitri fixi et aquae communis quantitate coquitur, et ex filtrato et frigefacto liquore sponte rursus secernitur Kermes minerale. Idem processus tertia vice repetitur, omniaque tria praecipitata mixta optime cum

*) Hic formulam accepit a Monacho quodam Carthusiano, nomine *Simon*, qui primum hanc a B. V. mutuavit, et dein cum suis fratribus hujus pulveris virtutem in se et aliis exploravit, inque proprio celebravit tractatu, cujus versio in linguam Franco-Gallicam inscripta est: Usage de la veritable poudre Alkermes, ou aurifique mineral, dite vulgairement Poudre des Chartreux. Paris 1719.

aqua edulcorantur, et dein exsiccantur; tandem spiritus vini semel vel bis pulveri superfusus deflagratur. Haec methodus id incommodi habet, quod coctio ob exiguam alkali proportionem ad stibium saepius reiteranda sit; hinc recentiores, salis alkalini copia aucta, per unicum potius, quam per plures coctiones Kermes minerale parare suadent, et deflagrationem spiritus vini nullius usus omittunt. Proportio maxime idonea est, si antimonii crudi p. i, salis alkalii depurati p. iv. aquae communis p. xvi. simul coquuntur. Alii lixivium causticum adhibendum esse volunt, quod procul dubio praestat, si modo probe caveatur, ne id calce inquinatum sit. Alii loco lixivii alkalini usi sunt calce viva, de qua *Saunders* *): „Ope calcis vivae Kermes minerale omnino simile illi, quod ab aliis alkalinis, sed minori copia, obtinetur.“ Rectius ille, pro „*omnino simile illi*,“ dixisset impurum; ejusmodi enim decoctio, spontaneae praecipitationis gratia reposita, per attractionem aëris fixi ex aëre atmosphaerico obducitur cuticula, quae re vera est calx cruda, quaeque una cum particulis regulino-sulphureis et reliqua calce soluta fundum petit. Usus adeoque Kermes mineralis, quod auxilio aquae calcis vivae obtinetur, omnino rejiciendus est. Utrum autem lixivium alkalinum factum sit e sale tartari extemporaneo, an ex alio sale alkalino fixo, dummodo puro, nihil refert. In genere in praeparando Kermes minerali non opus est determinata proportionem ingredientium **); totius enim processus cardo in eo vertitur, ut antimonium pulverisatum cum lixivio alkalino, imprimis caustico, tamdiu coquatur, donec id antimonialibus satis superque saturum sit (saturatio patet ex pulvere rubescente liquori innatante) quo facto, lixivium, vel rectius hep-
par sulphuris liquidum, partem reguli solutam continens, ab igne remotum statim et adhuc fervidum filtratur, vel

*) Observat. de antimonio. p. 56.

**) Qua si necessario opus esset, sequitur quoque ut proportionem sulphuris, quod antimonio inest, adamussim norimus; haec autem, quemadmodum alibi diximus, incerta est, nisi in stibio regenerato, quod tam hanc ob causam, quam ob puritatem in praeparando sulphure aurato commendavit amplissimus Praeses. *CRELL chem. annal.* I. B. I. St. 1784. p. 39.

potius caute decantatur cum pulvere innatante. Liquor decantatus ad crystallisationem tartari vitriolati, in alkali forte delitescens praecavendam, duplo pondere aquae fervidae augetur; lixivium hoc dilutum et pene frigidum decantatur a pulvere in fundo remanente, huic iterum aqua calida affunditur, simulatque pulvis fundum petierit, decantatio rursus instituitur. Tali modo praeparatum Kermes minerale, si iterum edulcoratum fuerit, minori quidem obtinetur copia, sed purius est, et tum a salibus mediis, tum ab alkali quam maxime immune, adeoque ejus in medicina usus efficacior et certior. Cl. *Bergmann* reperit in Kermes mineralis p. 100 delitescere reguli p. 52, et sulphuris p. 48: at cl. *Geoffroy* in Kermes mineralis p. 100 invenit reguli p. 24, sulphuris p. 57, et alkali p. 19. Haec autem differentia partium hujus praeparati constitutivarum procul dubio vel ex errore calculi, vel potius diversae praeparationis et separationis modo resultat. Quantitas alkali admixti, non autem alteratio sulphuris procul dubio in causa fuit, cur cl. *Geoffroy* cinnabarim, post admixtum mercurium, inde sublimare nequiverit, nisi addito vitrioli acido.

7. KERMES MINERALE *Bergmanni*. Antimonii diaphoretici eloti et sulphuris communis p. æ. mixtae leni calore caute funduntur. Num haec species eadem subtilitate, qua praecedens, gaudeat, valde est dubium.

8. SULPHUR ANTIMONII FIXUM *Stabelii* *) praeparatur per solutionem eodem modo ac Kermes minerale; nisi quod loco antimonii crudi sumatur regulus medicinalis, et pro liquore nitri fixi adhibeatur alkali fixum, ope calcis vivae acido aëreo orbatum. Pulvis rite ablutus et siccatus a Kermes minerali nihil differt; liquet autem e regulo medicinali minorem illius acquiri copiam, quam si antimonio crudo usus fueris. Ratio ex illis, quae sub sectione reguli medicinalis dicta sunt, manifesta est.

9. SULPHUR ANTIMONII *Hoffmanni* **). E regulo medicinali et alkali fixo paratur lixivium hepatis, ex quo ope aquae calcis vivae loco acidi cujusdam fit praecipitatio.

*) Chem. dogmat. p. 315.

**) Obs. Phys. Chem. p. 290.

Hoc sulphur cl. *Hoffmann* sulphure aurato communi fixius et virtutis lenioris esse perhibet. Per fixitatem auctor procul dubio difficiliorem ejus solubilitatem intelligit, cujus, uti et virtutis lenioris ratio facile exinde colligitur, quod pulvis noster, quem Kermes minerale impurum voco, sub spontanea praecipitatione secum vehat particulas calcareas, easque in crudas, ut vocant, ab aëris accessu mutatas; nam e lotione antimonii hepatica frigefacta, absoluto nimirum pulveris spontaneo secessu, ope quidem acidi cujusdam, non autem beneficio aquae calcis vivae ulteriorem fieri praecipitationem, experimentis constat.

IO. FLORES ANTIMONII CRUDI per se. Ad hos obtinendos antimonium crudum ex cucurbita, cui superimponitur alembicus l. a. sublimatur. Ejusmodi flores tum ob variam proportionem sulphuris, cujus plus minus sub sublimatione deflagrat, ad regulum, tum ob majorem minoremque mutationem vel jacturam regulini phlogisti, quo in hoc processu orbatur stibium, colore et virtute quam maxime inter se discrepant; hinc nulla ratione habita emendationum, quas commendarunt antiqui, eorum usus jam dudum merito rejectus est.

II. SULPHUR ANTIMONII EX MINERA, *vel ex antimonio crudo*. Sub hoc intellexerunt vetustioris aevi chemici, ut *Basilus Valentinus*, *Quercetanus*, *Keslerus*, *Hartmannus* et alii, modo Kermes minerale, modo sulphur auratum, utrumque autem jam ex minera antimonii, jam ex antimonio crudo via sicca, ut vocant, et humida simul, vel tantum via humida paratum. Nec in praeparando sulphure aurato via humida ab hodiernis chemicis multum aberrarunt; adhibuerunt enim lixivium, modo ex alkali vegetabili solo, cui interdum adjecerunt alkali minerale, modo ex alkali vegetabili caustico, quin et nonnulli minerae vel antimonio crudo addiderunt sulphur commune, et ad praecipitationem plerumque usi sunt aceto. Hinc, si paulo accuratius rem tractassent atque explicassent, et nisi minerae antimonii virtutem mirificam inesse credidissent, venerandam antiquitatem nihil sane neglexisse video, quod circa haecce praeparata nostra emendaverit aetas.

12. ANTIMONIUM DIAPHORETICUM TARTARISATUM. Antimonium crudum et sal tartari aequali proportionem mixta funduntur, massa e crucibulo defumta loco humido deliquescendi ergo reponitur, e liquore dein obtento ope acidi vitrioli diluti praecipitatur pulvis edulcorandus. Antimonium diaph. tartarifatam impropria est hujus praeparati denominatio; nam illud nulla ratione differt a sulphure aurato. De spontanea liquefactione, massae hepaticae nil loquar, cum omnibus constat, hujus cum aqua coctionem esse praeferendam.

13. PANACEA GLAUBERIANA *) alias CONERDINGIANA. E lixivio hepatis antimonii vel scoriarum reguli simplicis cum solutione cremoris tartari loco acidi cujusdam instituitur praecipitatio. Praecipitatum hocce edulcoratum et siccatum panaceam nuncupavit *Glauberus*; est autem sulphur antimonii auratum; acidum enim praecipitans praecipitati indolem heic ipsius sulphuris antimonii nequaquam mutat, nisi, quatenus tartari tatarisati portiuncula praecipitato forsan adhaereat; maxima, enim ejus portio sub edulcoratione certe abluatur.

14. SULPHUR ANTIMONII AURATUM, s. *praecipitatum* in genere ex quovis hepate antimoniali, uti etiam ex scorii reguli antimonii simplicis, nec non e residuo tincturae antimonii tartarissatae obtinere licet, parato nempe ex illis lixivio, ex quo ope acidi cujusdam, ut aceti, vel etiam acidi vitrioli diluti praecipitatur pulvis; haec autem praecipitatio non unica, sed tribus ut plurimum vicibus instituitur; pulvis tertia vice praecipitatus, colore altiori aurantio praeditus, probe elotus caute siccatur. Haec methodus chemiae peritis manca esse videtur, nec immerito. Ratio enim, cur tertia vice praecipitatum sulphur tantum a practiciis medicis praescribatur, sola quaerenda est in sulphuris tertiae praecipitationis majori copia ad partes regulinas, unde ejusmodi sulphuris prae sulphure 2da aut 1ma vice praecipitato efficacia lenior. At vix et ne vix quidem in singulis hisce praecipitationibus, utcumque accurate institutis, ratio sulphuris ad regulum una eademque semper esse

*) *Meuderi* analys. antimonii p. 69. et *Hagen* Lehrbuch der Apothekerkunst §. 577.

potest, ob majorem minoremque copiam pulveris, qui hac vel illa vice praecipitatur. Hinc, uti jam diximus, recentiores chemici methodum praeparandi sulphur antimonii praecipitatum sequentibus modis emendare conati sunt. Nonnulli enim unicam praecipitationem suadent; alii pulverem diversis vicibus praecipitatum in unum miscunt; at tum iste pulvis virtutis efficacioris est, quam ille tertia vice praecipitatus. Hinc *Hirschingius* *), *Wiegleybius* **) et alii ***) ex antimonio crudo cum determinata proportionem sulphuris communis et alkali tartari per fusionem pararunt hepar antimonii, quod dein per coctionem in aqua solverunt et omne, quod praecipitari potest, una vice ope acidi vitrioli diluti praecipitarunt. Per fusionem vero quaedam pars sulphuris in aërem dispergi potest, adeoque ratio sulphuris ad regulum incerta redditur. Ad hanc jacturam sulphuris praecavendam hodie plerique, et *Wiegleybius* ipse, illorum sequuntur sententiam, qui sulphur antimonii per coctionem cum lixivio caustico parari suadent. Hanc methodum commendarunt *Wallerius*, *Baumé*, *Lemery* †) et accuratissime tandem *Göttlingius* ††), qui antimonii crudi partes II. cum sulphuris communis partib. III. exactissime in pulverem miscuit, hujus pulveris unc. IV. β . coquuntur in mensuris tribus lixivii caustici, ex alkali vegetabilis depurati unc. XII. et calcis vivae unc. XVI. parati. Absoluta coctione lixivium antimoniale hepaticum filtratur; liquor filtratus cum sufficiente aquae copia diluitur et ope spiritus vitrioli omne sulphur, partes regulinas secum vehens, una vice ex eo praecipitatur, quod rite elotum et caute exsiccatum pondus unciarum IV. aequare solet. In hoc praecipitato ratio sulphuris ad regulum, teste *Bergmanno*, est uti 75 ad 25.

*) Antimonii crudi p. I. sulphuris comm. p. II, ciner. clavellatorum depurat. p. IV. mixta funduntur.

**) Antimonii crudi p. I, sulphuris p. β . cin. clavell. p. III.

***) Pharmacopoea Stralsund. 1778 praescripsit antimonii crudi et sulphuris ana partem I, cin. clavell. p. II.

†) Hi usi sunt lixivio caustico saponariorum absque additamento sulphuris.

††) CRELLS neue Entdeckung. in der Chemie T. II. p. 14. seqq.

b. *Composita.*

1. **HEPAR ANTIMONII**, *f. hepar sulphuris antimoniale* obtinetur, si antimonii crudi et nitri p. æ. mixtae carbone accendantur. In hoc processu nitrum sub detonatione partim cum sulphure antimonii deflagrat, partim in alkali mutatum cum reliquo sulphure hepar sulphuris efficit, quod partes regulinas solvere valet, oriturque simul portiuncula salis polychresti *Glaferi* ex acido sulphuris et alkali nitri. Partes itaque ejusmodi hepatis antimonii sunt sulphur, (in minori tamen proportionem, quam inerat antimonio crudo) alkali vegetabile, et partes regulinae quodammodo reclusae et phlogisti parte orbatae, nec non sal polychrestum *Glaferi*. Si vero, ut nonnulli faciunt, sumseris antimonii crudi et alkali vegetabilis fixi p. æ., hancque miscelam fuderis, nulla oritur detonatio, adeoque minor fit sulphuris jactura; hinc ejusmodi hepar antimonii indole et viribus proxime accedit ad antimonium crudum, quo tamen paulo fortius est, ob indolem reguli, ope hepatis sulphuris mutatam; mitius autem est hepate antimonii per nitrum parato.

2. **LIQUOR ANTIMONII per deliquium** *f. balsamus antimonii ex scoriiis* obtinetur, si scoriae reguli antimonii simplicis (nimirum per nitrum et tartarum parati) acri ad deliquescendum exponantur. Liquor iste est solutio hepatis sulphuris antimonialis.

3. **SULPHUR ANTIMONII DIAPHORETICUM** *Schröderi*. Scoriae reguli antimonii martialis loco humido ad deliquescendum reponuntur, liquefactae cum aqua coquuntur, et dein solutione alkali fixi fit praecipitatio. Praecipitatum est sulphur antimonii martiale, et cum praeparato hujus nominis convenit, nisi quod particulae ferreae in hoc subtiliores esse videantur. Praecipitatio autem solutionis alkalinae per alkali antiquum sane olet chemiae studium.

4. **SULPHUR ANTIMONII MARTIALE**. Ex lixivio hepatis antimonii loco acidi cujusdam fit praecipitatio per solutionem vitrioli martis. Praecipitatum est sulphur antimonii auratum martiale, colore nigrescente praeditum; nam acidum vitrioli (quod solutioni vitrioli martis inest)

cum alkali lixivii hepatis copulam init, adeoque pars regulina cum sulphure fundum petit, secumque vehit Martem, nemine; cui nubatur, relicto.

5. FLORES SALIS AMMONIACI ANTIMONIALES, *flores stibii Helmontii*, f. *flores antimonii compositi*, sub his intelliguntur flores ex antimonii crudi et salis ammoniaci p. æ. sublimati. Hi flores nondum edulcorati procul dubio sunt virtutis admodum drasticae, cum partes regulinae ope salis ammoniaci reclusae sint, et parte phlogisti privatae; praeterea pars aliqua sulphuris sublimatione avolat: iidem flores aqua eloti, teste Meudero, sistunt *Tincturam antimonii siccam Grammanni*, de qua nullum iudicium feram, cum ejus natura mihi nondum satis liquet.

6. FLORES ANTIMONII VITRIOLATI, f. *nobilis antidotus Lysipyretos*, f. *febrifugum certissimum*. Florum antimonii cum sale ammoniaco sublimatorum p. iv, sulphuris communis p. ii, colcotharis vitrioli p. xii. simul sublimentur. Hi flores ob majorem sulphuris portionem praecedentibus mitiores sunt, simulque virtuti Martis nupti.

7. PULVIS ALTERANS PLUMERI. Sulphuris antimonii aurati et Mercurii dulcis p. æ. terantur usque dum fiat pulvis subtilissimus. Huc quoque pertinent *Pilulae alterantes ejusdem*, *Pilulae mercuriales Piederit*, multaque alia ex sulphure antimonii aurato et Mercurio dulci conflata remedia, de quibus practicos monitos esse velim, ne haec diu in officinis servata aegrotis propinent; ejusmodi enim praeparata, ut experientia docet, successu temporis vim drasticam acquirunt, cujus ratio ex acidi salis actione in partes regulinas deducenda esse videtur.

CLASSIS QUARTA.

PSEUDOSTIBIATA.

Dicuntur praeparata diversae indolis ab antimonio nomen sortita, ad quae obtinenda adhibitum quidem fuit antimonium, cujus tamen vel nihil praeparatum ingreditur, vel saltem adeo exigua ejus portiuncula, ut inde nulla salutaris actio in corpus humanum expectari possit. In hujus classis distributione ordinem alphabeticum sequamur, quo

facilius lectores desiderata inveniant; cujus vero sint naturae, si id non sponte liquet, ad finem singulorum adjicietur.

I. ACETUM ANTIMONII B. V. sub hoc antiqui intellexerunt liquorem e minera antimonii sine ullo additamento per destillationem s. a. elicatum. Ignis nihil aliud ex antimonio expellere potest, quam spiritum sulphuris, id est, acidum vitrioli volatile.

2. ANTIDOTUS SOAEPHILOS *Quercetani*. Floribus antimonii compositis atque edulcoratis superfunde acetum destillatum, quod, digestionem peracta, abstrahitur et inspissatur, dein ex inspissato ope aquae vitae coralliorum tincturam extrahe, quae denique igni fortiori ex retorta iterum iterumque abstrahenda est, donec instar olei rubicundi prodeat. *Schroederus*, *Basilii Valentini* commentator, putat: aquam vitae coralliorum esse spiritum vini in coralliis regeneratum, huncque obtineri dicit, si corallia aceto vini solvantur, et dein ex retorta destillentur. Ipsum destillatum est spiritus vini partes oleosas e coralliis praeparatis extractas continens.

3. AQUA ANTIEPILEPTICA *Quercetani*. Ex croco metallorum cum micis panis per se destilletur spiritus, qui non alius esse potest, quam spiritus panis acidulus empyreumaticus, antimonialis nihil secum elevare valens.

4. AQUA OPHTHALMICA ANTIMONIALIS. Ad hanc parandam crocus metallorum aqua destillata infundatur. Crocus vero metallorum ab aqua pura non solvitur, sed trituratione subtili aliquatenus per eam diffundi potest.

5. AQUA STIMMI SULPHUREA, s. *Clyffus antimonii*. Antimonii crudi, nitri et sulphuris p. æ. misce et in retortam tubulatam ignitam sensim injice, spiritumque in recipiente, cui aqua inest, excipe. Prodit inde Clyffus sulphuris, scilicet mixtura spiritus nitri dilutissimi et spiritus sulphuris, aut vitrioli volatilis.

6. AQUA STIMML TARTAREA, paratur ex antimonii crudi, tartari crudi et salis communis partibus aeq. eodem modo ac Clyffus antimonii. Nihil aliud inde prodit, quam spiritus tartari, nisi sal commune inquinatum fuerit calce salita, tum quidem portiuncula butyri antimonii obtinebitur.

7. **BALSAMUS ANTIMONII SENNERTI.** Antimonii crudi lib. II, alkali vegetabilis fixi lib. β . nitri unc. IV. misce, dein igni forti ut fluant cura, post fluxionem effunde in tabulam lapideam. Huic massae pulverisatae admisce calcis vivae unc. III, eandemque, spiritu terebinthinae ad eminentiam quatuor digitorum affuso, digere donec liquor rubro tingatur colore; postea adde filices contusos ad spissitudinem mellis et destilla; quamprimum autem guttae flavae apparent, muta recipientem, et auge ignem, sic exstillabit oleum rubrum. Est oleum terebinthinae empyreumaticum; destillatio autem incongrua est: sola digestio cum spiritu terebinthinae, absque pulvere filicum sufficit ad sulphur hepatis antimonii solvendum et in saponem stibio-terebinthinatum redigendum.

8. **BALSAMUS, s. TINCTURA REGULI ANTIMONII Schroederi.** Pulvis antimonii q. v. cum spiritus terebinthinae s. q. digeritur et abstrahitur, dein affunditur spiritus vini et extrahitur tinctura. Huic nullae particulae regulinae inesse possunt.

9. **BALSAMUS SULPHURIS ANTIMONII Zwoelferi.** Sulphuris e cinnabari antimonii, et salis tartari p. æ. misce et funde, dein cum oleo terebinthinae ad solutionem digere. A balsamo sulphuris terebinthinato in eo tantum differt, quod loco sulphuris communis nostro praeparato insit hepar sulphuris.

10. **BALSAMUS VITAE Basilii.** Antimonio crudo pulverisato affunde acetum destillatum, digere, extrahe et cola; residuo denique, ad siccitatem abstracto, affunde spiritum vini, iterumque abstrahere, ut obtineatur tinctura. Vires in aceto et residuo, non in hac tinctura quaerendae sunt.

II. **CINNABARIS ANTIMONII, sulphur minerale, Bezoar rubrum, antimonium rubrum sudoriferum, Butyri antimonii parergon, s. Flores antimonii,** obtinetur per sublimationem e residuo, post destillationem butyri antimonii, si nimirum illud praeparatur ex antimonii p. I. et mercurii sublimati corrosivi p. II. Haec autem cinnabaris, per iteratam sublimationem ab acido salis aliisque sordibus purgata, nihil reguli continet, et a cinnabari artificiali e mercurio

et sulphure vulgari nullatenus differt. Sulphur enim in antimonio est sulphur commune. Hinc vires hujus cinnabaris a viribus cinnabaris vulgaris differre nequeunt.

12. INFUSIO ANTIMONII CRUDI. Antimonii crudi pulverisati unc. β . cum aquae destillatae vel vini unc. iii . per nycthemeron digeritur. Virtutes antimonii ope aquae extrahere idem est atque aethiopem lavare: Vinum autem, digestionem diutius protrahita, levem emesin in sensibilibus excitabit subjectis.

13. INFUSIO CROCI METALLORUM f. *Aqua benedicta Quercetani*. Croci metallorum unciae i . infunde aquae cardui benedicti lib. ii , aquae cinnamomi unc. β . macera per triduum et liquorem transcola. Nullius frugis est haecce infusio, nisi aquae adhibitae vinosae fuerint.

14. LIQUOR E SALE VITRI ANTIMONII. Vitrum antimonii tritum ovorum albumini, ad duritiem cocto, aut rapis excavatis inclusum in cella deliquescenti gratia reponitur. Absurdum sane conamen; nam liquor non tam e vitro antimonii, quam ex albumine vel rapis proveniet.

15. MANNA ANTIMONII cum tinctura ex antimonio crudo, de qua suo loco, convenit.

16. OLEUM ANTIMONII COMPOSITUM B. V. Antimonii crudi, sulphuris communis ana p. ii , salis ammoniaci p. i , calcis vivae p. iv . seorsim pulverisata misce et in retortam ingere, ex qua primum leni, dein fortiori igne destillatur oleum. Est sulphur in alkali volatili solutum, quod parum aut nihil a *spiritu fumante Beguini* differt.

17. OLEUM ANTIMONII FEBRIFUGUM ET ANTI-
PLEURITICUM. Regulus antimonii per se calcinatus in acido vitrioli (quoad fieri potest) solvitur, solutio filtrata inspissatur, et ope spiritus vini inde destillatur oleum, per ignorantiam ita nuncupatum. Si loco abstractionis tantum institueretur extractio, ut veterum nonnullis placuit, tinctura prodiret acido-spirituosa; destillatus vero liquor est spiritus vitrioli dulcis.

18. OLEUM S. LIQUOR ANTIMONII MELLITUS. Antimonii crudi lib. i , mellis optimi lib. iii . bulliant simul, moveanturque spatula, usque dum substantia aquosa mellis evaporaverit, et remanserit materia quaedam nigra,

hanc destilla gradatim recipiendo liquorem in excipulo amplo. Liquor prodiens, quo antiqui usi sunt ad ulcera fordida mundificanda, est acidulato empyreumaticus, ne quidem ipsi melli virtute aequiparandus.

19. OLEUM ANTIMONII SACCHARATUM *B. V.* Vitro antimonii affunde succum uvarum immaturarum, digere per aliquot dies, deinde succo ad siccitatem abstracto admisce sacchari p. æ. cum modico aceti, destilla per retortam gradatim, tandem igne fortissimo, ut prodeat oleum rubicundum, cum spiritu vini exaltandum. Nihil aliud est quam liquor spirituosus et saccharato empyreumaticus: si vero succus uvarum, digestionis peracta, non abstraheretur, sed solummodo decantatus cum saccharo misceretur, liquor foret saccharato-acidulatus, vi emetica gaudens.

20. ALIUD EX ANTIMONIO CRUDO *B. V.* Antimonium crudum et saccharum miscentur et per se distillantur. Liquor prodiens est spiritus sacchari impurus.

21. OLEUM ANTIMONII SACCHARATUM *Beguini*, ex iisdem, ac praecedens, praeparatur ingredientibus, superaddito alumine usto, quo acidum sacchari facilius expellatur.

22. OLEUM ANTIMONII SACCHARATUM *Fausii*. Croci metallorum, sacchari ana p. ix, acidi vitrioli diluti p. ii, spiritus vini p. β. misceantur et per hebdomadem digesta igni forti ex retorta destillantur. Spiritus elicited est saccharato-acidulatus.

23. OLEUM ANTIMONII SACCHARATUM *Sennerti*. Antimonii crudi p. viii, sulphuris p. i. misce et deflagrato sulphure funde; massam fusam cum aceto destillato extrahere, remanentiae dein partibus iii. adde sacchari p. i, et spiritus vini p. ii; omnia denique destillationi subijce, et liquorem destillatum ad quartam circiter partem evapora. Si in fine non nimius adhibeatur ignis, spiritus vini exigua portione e residuo extracta maritatus prodibit; jam vero liquor elicited est saccharato-empyreumaticus.

24. OLEUM ANTIMONII SACCHARATUM *Quercetani* s. *Antidotus Panaeretos*. E minera antimonii et saccharo s. a. paratur syrupus, igni dein forti ex retorta destillan-

us. Prodit spiritus sacchari et denique oleum ejus empyreumaticum, nonnihil sulphuris secum evehens.

25. RUBINUS ANTIMONII MERCURIALIS *Clodii*. Stibii et tartari crudi p. æ. funduntur, ut fiat hepar antimonii, hujus massae p. 11. cum mercurii vivi p. 1. et acidi vitrioli concentrati p. 11. mixtae leni calore ad siccitatem digeruntur. Deinde ope alcohol vini extrahe tincturam *), quae decantata ad mellis consistentiam inspissatur. Sic, dicit auctor, habebis materiam, quae frigori exposita indurefcit in lapidem instar Rubini.

26. SAPO CHEMICUS **) f. *Tinctura alkalina Veneris et antimonii juniperina Dippelii*. E cupri p. 1, antimonii crudi p. 11. et alkali vegetabilis fixi p. 1v. fusione paratur hepar adhuc calidum terendum, huic calido superfunde 3 partes olei juniperini, illudque trituratione diuturna hepatis bene incorporetur: tum adde p. 20. spiritus vini rectificatissimi et miscelam digestionem per 8 dies committe, deinde tinctura decantetur. Residuo de novo affundatur spiritus, iterumque decantetur tinctura, haec cohobatio tamdiu repetenda est, quamdiu spiritus peregrino tingatur colore. De mixtis hisce tincturis superfluous abstrahatur spiritus, donec saturatissimus restet liquor, cui addatur balsamus peruvianus pro usu interno, vel sapo venetianus pro usu externo. Huic praeparato nullae insunt particulae regulinae, nisi spiritum adhibueris peraquosum (ut in praeparando sulphure antimonii liquido); at tum simul aderunt particulae cupreae, quibus illud redditur noxium.

27. SAL EMETICO-CATHARTICUM *Meuderi* ***). Ex hepate antimonii, per fusionem ex anatica portione salis tartari et antimonii parato, post secessionem Kermes mineralis ope aceti destillati obtinetur sal colore albo, qui etiamsi aëri expositus deliquescat, nulla tamen, ipso auctore fatente, indicia alkalinae naturae monstrat: nec mirum; nam

*) Est tinctura alkalina; in residuo autem remanet turpethum minerale cum parte regulino-sulphurea.

**) Conf. vitae anim. morb. et med. auctore *Chr. Democrito*. Lugd. Batav. 1711. p. 93.

***) l. c. p. 42.

hicce sal est terra foliata tartari, et convenit cum *Terra foliata tartari antimoniatata Lehmanni* *), quae obtinetur, si lixivium, post sulphuris antimonii aurati praecipitationem per acetum remanens, evaporetur.

28. SPIRITUS REGULI ANTIMONII. Per sublimationes repetitas regulus antimonii ex opinione veterum fixior reddendus est; quo facto in loco humido ad deliquescendum reponitur: deliquium destillationi subicitur, ut obtineatur spiritus. Est operatio in musaeo a chemiae imperito concepta, in praxi nullum promittens successum.

29. SULPHUR ANTIMONII AURATUM LIQUIDUM f. *Tinctura saponata Jacobi* **). Haec tinctura maxime convenit cum *Tinctura saponata Schultzii* ***). Hic saponem venet. in lixivio caustico solvit, et solutionem ad siccitatem evaporavit: hujus massae uncias II. solvit in lib. I. alcohol vini, cum hac tandem solutione e scoriis reguli martialis simplicis extraxit tincturam, quae ab illa Jacobiana non indole, sed methodo praeparandi parum differt; *Jacobus* enim e scoriis jam nominatis cum alkali paravit lixivium forte, illudque cum olei amygdalarum s. q. ad consistentiam saponis coxit: huic massae affudit tincturae antimonii acris p. III. vel IV, et, digestionem peracta, extraxit tincturam. Ille autem *Jacobus* in scriptis suis aliquid de laude tincturae Schultzii detrudere conatur, cum haec sulphuris antimonii nihil contineat, quod tamen suae tincturae inesse perhibet. Verum prius est, sed non posterius, nisi spiritum adhibuisset nondum rectificatum. At genuinum sulphur antimonii auratum liquidum obtinetur sequenti methodo, quam commendavit cl. *Wiegleb.* Stibii unc. II. cum sulphuris comm. unc. I. trituratione mixtae in vase figulino vitreato coquantur cum lixivio caustico, donec perfecta fiat solutio; solutioni filtratae adjiciantur olei amyg-

*) Vide apud cl. *Hagen* l. c. §. 557.

**) *Christianus Iacobus* primus hujus tincturae mentionem fecit in Act. Acad. Elect. Mogunt. 1757. Conf. et *Iob. E. Theoph. Guericke* dissertationem, Erfordiae 1776.

***) Vide ejus praelectiones in dispensatorium Brandenb. edit. 2da. Norimb. 1753. p. 634.

dalarum vel olivarum unc. vi, mixturam leni igne ad consistentiam saponis evapora. Huic saponi antimoniali spiritus frumenti peraquosi unc. 24 superfunde, et tandem debita digestionem extrahe tincturam, quae sulphur antimonii auratum in se solutum tenet; nam adjecto acido sulphur antimonii statim ex illa praecipitatur.

30. TINCTURA ANTIMONII ACRIS. In genere ex reguli antimonii p. i. cum multivariis proportionibus nitri, ab una nempe parte usque ad octo per fusionem, et dein per extractionem ope alcohol parari solet. Hodie omnibus chemiae peritis constat, hanc esse meram tincturam salis alkali caustici *), uti sunt tinctura salis tartari aliaeque; nitrum enim, per detonationem et calcinationem in alkali causticum mutatum, nullum in regulo invenit sulphur, quocum hepar efficiat; quae tamen haec unica foret via regulini quid solvendi, hinc alcohol vini nihil solvit, praeter alkali causticum, atque ad hoc optime parandum necessario adsit basis quaedam fixa metallica. Per experimenta enim satis evictum est, neque nitrum, neque alkali fixum solum per se vehementiorem ignis gradum diu sustinere, quin per crucibulum effluant. Hanc basin pro usu medico praeprimis suppeditat regulus antimonii martialis, quod cl. *Dehne* luculentius demonstravit, quare hujus methodum omnium instar exponam **). Reguli antimonii martialis pulverisati unc. iv. cum unc. viii. nitri depurati sicci in crucibulo satis capaci simul fundantur, post horam iterum nitri unc. iv. fluenti massae adjiciantur, idque bis amplius cujusvis horae spatio praeterlapso, adaugendo simul ignem, repetitur, ita ut ad reguli antimonii p. i. accedant nitri p. v. et tota massa per horas iv. in igne fluens teneatur. Hoc facto illa in mortarium ferreum calefactum effunditur, ruditer pulverisatur et adhuc calida phiolae, cui inest spiritus vini rectificatissimi lib. i, sensim et caute injicitur, et miscela, sub mixtione lactescens, digestionem per

*) Hujus sententiae sunt hodie omnes Chemici, et dudum fuerunt *Hoffmann, Meuder, Schulze, Lavater* et alii.

**) Dissertatio - medica de praeparatione tincturae antimonii acris concentratae. Auctore I. Ch. Conrad. *Dehne*. Helmstad. 1776. 4. §. XVI, Experim. IX. seqq.

aliquot dies traditur, quae inde colorem ruberrimum accipit. Decantata prima tinctura, residuo rursus libra una vel altera alcohol vini affundi, et plus minusve concentrata inde tinctura extrahi potest.

31. TINCTURA ANTIMONII ALKALINA f. TARTARISATA. Varii hujus praeparandae modi existant; omnes tamen huc redeunt, ut antimonium crudum cum alkali vegetabilis fixi p. II. vel III. fundatur et calcinetur; deinde ope vini alcohol extrahatur tinctura. Haec recens parata, ob hepar sulphuris sub fusione ortum, et substantiae regulinae solvendae idoneum, exiguam quidem portionem sulphuris aurati continet, quae tamen successu temporis sponte exinde separatur, nisi pro spiritu vini rectificatissimo ad extractionem adhibueris spiritum frumenti semel rectificatum; tum obtinetur tinctura, minus quidem caustica, sed particulis stibiato-sulphureis magis saturata; siquidem spiritus vini semel rectificatus majorem quam rectificatissimus continet aquae quantitatem, quae hepatis sulphuris solvens est praecipuum.

32. TINCTURA ANTIMONII GENUINA MANGOLDI *). Sulphuris antimonii aurati unc. β . cum tincturae tartari, vel tincturae antimonii acris, vel etiam tincturae metallorum unc. iv. per hebdomadem sub frequenti agitatione digeritur. Auctor hanc tincturam similem illi esse autumat, quam invenit *Abrah. Vater* **); hoc quidem non negandum est; utrique tamen nihil inest regulini, probante id cl. *Bucholtz* sequenti experimento: sumsit nempe sulphuris antimonii aurati unc. i. terendo in mortario vitreo sensim addidit tincturae antimonii acris unc. xii; sub continua trituratione sulphur auratum colorem nigrescentem induit, simulque substantiam resinae haud dissimilem exhibuit. Hanc mixturam in retortam ingessit et digestionem commisit, spiritumque dein ad dimidiam partem abstraxit. Quod in retorta remansit, sapore minus acri, quam antea

*) Dessen chem. Erfahr. u. Vorth. Frankf. et Leipzig 1749. p. 49.

**) Progr. de tinct. antimonii antehac invent. virt. et effic. Viteb. 1749.

gaudebat *); residui autem in filtro sulphuris aurati pondus nihil fere diminutum esse deprehendit. Liquet inde tincturam regulini nihil continere. Ad sulphur in filtro superstes edulcorandum, huic infudit aquam calidam, cujus ope totum sulphur, sesquidrachma excepta, solvebatur. Haec solutio sulphuris antimonii aquosa, colore ex fusco rubro et sapore amarissimo erat praedita. Hanc solutionem voco *Tincturam sulphuris antimonii aquosam Bucholtzii*, quae adeoque pertinet ad praeparata regulino-sulphurea. Totum huncce processum eodem cum successu repetii, eum in finem, ut viderem, numne tincturae alkalinae aptae forent dissolvendae portioni sulphuris aurati; eventus autem contrarium probavit.

33. TINCTURA ANTIMONII NIGRA, *sive mineralis amara Gmelini*. Pharmacopola quidam Norinbergensis, *Dietrich*, primus hujus tincturae mentionem fecit **), ejus autem exactam descriptionem non dedit, sed illam tantummodo e regulo antimonii medicinali parari jubet, quare cl. *Gmelin* ***) et *Model* †) qui modum conficiendi secundum experimenta propria uberius exposuerunt, pro hujus tincturae auctoribus habendi sunt. Illorum methodus haec est. Ex antimonii crudi unc. iv. cum nitri unc. iβ. s. a. paratur regulus antimonii medicinalis. Huic pulverisato addantur lixivii alkalini saturatissimi unc. iv. vel viii, totumque digestionem committitur. Cum hae massa, per digestionem paululum inspissata, periculum instituitur, num alcohol vini ipsi adfusus inde colorem obtineat; quod si contingat, massae adhuc calidae, in cucurbitam immissae, instillantur successive alcohol vini unc. viii. vel xvi, vas subinde commovendo. Quo facto intra spatium dimidiaae horae obtinetur tinctura ††). In praeparatione hujus tincturae antimonium crud. cum nitro mixtum successive in crucibulum

*) Procul dubio alkali causticum particulis sulphureis involutum, causticitatem aliquatenus amisit.

**) Vid. *Commerc. litter. Norib. 1731.* p. 133.

***) *Phil. Fr. Gmelin* diss. de tincturis antimonii minus usitatis. *Tubing. 1759.* §. 7. seqq.

†) *Model* *Chem. Nebenstunden.* Petersburg. 1762 p. 169. seqq.

††) de qua vid. plura in *Macq. chem. Wörterbuch* 5 Th. p. 326.

ignitum injiciatur, neque nova portio miscelae superaddatur, antequam prior deflagrata fuerit, interque singulas ingestiones crucibulum claudatur: tota sic deflagrata miscela, ignis augetur, et iteratis vicibus ope stili ferrei tentatur, num huic stilo massae fluenti immisso adhaereant flores ex brunno flavi; quod si fiat, massa e crucibulo extrahitur et in mortario ferreo calefacto in pulverem redigitur, qui dein cum lixivio alkalino et alcohol vini praescripto modo tractatur. Ita scilicet regulus medicinalis parandus est, ut obtineatur tinctura colore nigerrimo, et sapore amaricante gaudens. Alcoholis vini bonitas cognoscitur, si alkali tartari ipsi injectum, in eo non solvitur.

34. TINCTURA ANTIMONII THEDENII *). Pulverisatum hepar antimonii, per fusionem antimonii crudi p. I. cum salis alkali p. III. paratum, saturatur f. q. aceti vini per congelationem concentrati. Mixtura haec saturata post plenariam evaporationem cum alcohol vini p. v. vel VI. diluitur. Spiritus iterum abstrahitur, et aliquoties **) cohobatur. Spiritus denique affusus per tres menses cum massa digeritur, et tinctura inde orta filtratur. Cl. *Thedenius* et post illum cl. *Gmelin* in peculiari tractatu ***) hanc tincturam particulas regulino-sulphureas continere contendunt, sed alii bene multi, inter quos cl. *Wiegleb*, contrarium perhibent. Neque causa, cur huic nihil antimonii insit, illum latere potest, qui processum, utcunque laboriosum, animo perpenderit. Hepar enim antimonii cum aceto perfecte saturatum deponit et sulphur et regulum, et alkali cum aceto connubium iniens terram foliatam tartari constituit, quae quidem in alcohol vini solubilis est, sed neque sulphur, neque regulus, adeoque nec utrumque, in spiritu vini solvi potest, nisi antea sulphur cum alkali et oleo in saponem quasi fuerit redactum, quod tum partem

*) Vid. dessen neue Bemerk. et Erfahr. zur Bereicherung der Wundarzen. et Arzen. Gel. Berl. 1782. T. II. p. 84 seqq.

**) Numerum incertum pro certo posui, partim quia repetitas cohobationes hic inutiles censeo, partim quum ab autoribus tam incerti ponantur numeri: ut ter, novies, terdecies etc.

***) Vid. Chem. Annalen I B. p. 101 — 134.

metallicam secum recipit. Ast forsan nonnulli aliquid expectant a tredecies repetita cohobatione spiritus; nam sic judicavit *Basilus* *), quem *Thedenius* fideliter secutus est: sed repetatur sexcenties, et spiritus vini nihil aliud efficiet, quam ut terram foliatam tartari solvat, quod vel prima vice facere valuit. Ejusmodi vero tincturam non solum particulis regulino-sulphureis praeditam, verum etiam breviori tempore obtinere licet; si dimidia tantum parti hepatis antimonii cum aceto saturati, et dein evaporati adjiciatur altera dimidia pars haud mutata: et si loco alcohol vini, adhibeatur spiritus vini semel rectificatus: vel etiam, si juxta mentem *Leonhardi* et *Hartwig* spiritus vini, terra foliata tartari imbutus, hepati antimonii adhuc calido et pulverisato superfundatur, et per aliquot dies leni igne digeratur, tum obtinetur tinctura particulis regulino-sulphureis una cum terra foliata tartari praedita.

35. TINCTURA ANTIMONII EX VITRO ANTIMONII SOLARI. Vitri antimonii p. ii. auri p. i. funde simul et cum aceto destillato extrahe tincturam, eamque ad siccitatem abstrahere. Deinde massae affunde spiritum vini et igne forti abstrahatur tinctura. Est spiritus paululum dulcificatus, at impurus. Vitrum et aurum in residuo remanent. Cum hac tinctura conveniunt *Tinctura ex antimonio crudo*, *Tinctura ex antimonio rubeo fixo*, et *Alexiterium antimonii*.

36. TINCTURA EX ANTIMONIO TARTARISATO. Antimonii crudi et tartari crudi p. æ. mixtae funduntur: massa fusa et pulverisata ope alcohol vini extrahitur. Est tinctura alkalina et parum caustica. Differt quoad preparationem a tinctura antimonii tartarisata Pharmac. Danic.

37. TINCTURA EX FLORIBUS REGULI MARTIALIS s. *Antidotus Isochrysos*. Praecipitati et calcinati flo-

*) *Basil. Valentin. Chem. Schriften. Hamb. 1717. p. 457.*

res reguli martialis aceto destillato philosophico (i. e. aceto cum ex aerugine destillatum) extrahuntur, extractio ad siccitatem abstracta per aliquot horas calcinatur, ex qua spiritu juniperi extrahitur tinctura rubicunda. Extractio prima, antequam spiritus juniperi additus fuerit, vi pallet emetica; nisi acidum aceti in calcinatione abigeretur, spiritus juniperi ejus adjumento tincturam aliquam, sed incertarum virium, extrahere valeret.

38. TINCTURA EX OLEO ANTIMONII SACCHARATO. Oleum antimonii saccharatum *Basilii* triplo vel quadruplo aceti destillati infusum et digestum extrahatur, ut prodeat tinctura rubicunda. Est liquor saccharino-acidulatus.

39. TINCTURA FLORUM ANTIMONII f. *Lilium Paracelsi* *). Antimonii crudi et salis amoniaci p. æ. sublima, flores bene edulcoratos in vase clauso ad rubedinem calcina, dein cum spiritu vini extrahe tincturam, quae ad oleositatem usque abstrahitur.

40. TINCTURA NEPHRITICA *Amelongii*. Antimonii crudi, nitri, tartari crudi et filicis p. æ. pulverifatas misce, et retortae tubulatae ignitae sensimingere. Spiritus exinde elicitus est clyffus nitri et sulphuris perexigui usus.

41. TINCTURA REGULI MARTIALIS. Calx reguli martialis solvitur in spiritu salis, et destillatur, prodibit inde oleum vel butyrum antimonii, quod cum spiritu vini mixtum digeritur, et spiritus inde abstrahitur. Est spiritus salis dulcis odore alliaceo praeditus, quem tamen praevia additione testae ostrearum praecavere licet.

42. TINCTURA SULPHURIS ANTIMONII AURATI. Ex sulphure antimonii aurato ope alcohol vini extrahitur liquor, ad spissitudinem mellis dein inspissandus. Val-

*) Datur et aliud *Lilium Paracelsi* tinctura nempe metallorum, quae mere alkalina est. Vid. suo loco.

de debilis hoc modo obtinetur tinctura sulphurea, cui nihil regulini inest. Vid. not. n. 32.

43. TINCTURA SULPHURIS REGULI IOVIALIS s. *Antidotus soterios Quercetani*. Haec licet diverso a praecedente modo praeparatur, nihil tamen ab hac differt; superfluum itaque foret taediosam ejus praeparationem heic exposuisse.

44. TINCTURA VITRIOLI vel *Crystallorum antimonii*. Solutio reguli in acido vitrioli aqua diluitur multa, ita quidem praecipitabitur pulvis albus; cui post praeviam calcinationem infunditur acetum destillatum, quo abstracto ex residuo ope alcohol vini extrahitur tinctura, Extractum acetosum emeticam exercebit virtutem. Quod vero alcohol vini mediante acido aceti residuo efficacem tincturam reguli antimonii extrahere non valeat, crisis tincturae *Thedeanae* monstravit.

45. TINCTURA ANTIMONII EX MINERA *B. V.* Mineram antimonii cum aceto proprio *) extrahe, decanta atque acetum abstrahe. Residuum extrahe cum spiritu vini optimo, decanta et rejectis faecibus circulationi expone. Si hanc tincturam per mensem unum alterumve circulatam destillaveris, consequeris oleum seu essentiam antimonii, omnium fere morborum panaceam, ex qua lapis ignis paratur. Haec sunt verba Basilii; panacea autem laudata nihil aliud est, quam spiritus vini spiritu sulphuris impraegnatus.

Medicamentorum antimonialium farragine hactenus exposita, superest, ut efficaciae eorundem in corpore humano habeatur ratio; quod quidem negotium, quo facilius succedat, selectus ejusmodi medicaminum antimonialium habendus erit, quorum virtutem e partibus constitutivis tu-

*) Vid. acetum antimonii, quod alii majori cum successu per extinctionem minerae ignitae in aqua parant.

tius eruere et cautis experimentis confirmare licet: omnium enim et singulorum efficaciam in corpore humano fideliter per experimenta determinare neque utile foret, neque vita unius medici huic operi sufficeret. Quamprimum itaque desiderata quaedam tentamina huc pertinentia absolverim, selectum medicaminum sibiatorum faciam, eorumque in corpore humano operationis, relationisque ad alia medicamenta socia, nec non cautelas inde observandas in supplemento hujus dissertationis expositurus sum *).

*) Quod supplementum utilissimum adhuc desideramus. Edit.

XII.

DR. IOANN. PETRI XAV. FAUKEN

DISSERTATIO

DE

SOLUTIONE REGULI ET VITRI
ANTIMONII IN DIVERSIS
VINIS.

V I E N N A E,

1 7 6 7.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1900

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1900

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1900

D I S S E R T A T I O

D E

SOLUTIONE REGULI ET VITRI ANTIMONII IN
DIVERSIS VINIS HIC LOCI COGNITIS.

Antimonium fibris capillaribus separatis, semimetallum est friabile, ponderosum, igne volatile, rapax *) constat binis principiis, sulphure nempe et parte metallica regulina **). Antimonium hoc calcinatum cinerem exhibet, qui igne majori vexatus Vitrum Antimonii procreat hyacinthinum.

Regulinae jam partis, ut et Vitri Antimonii hyacinthini solutio in diversis vinis hic loci cognitis mihi examinanda venit. Magnum, quem non praevidi, laborem! praeterquam enim, quod difficile admodum sit, nisi difficilimum accipiendi vina genuina et aliis vinis non adulterata, restat adhuc labor certe pertaesus: quodcunque enim experimentum quinquies statera examinandum est. Nihilominus tamen, cum viderem saepius in pharmaciis *Aquam Benedictam Rulandi*, nec non *Syrupum Emeticum* ex hac praeparatum in formulis praescribere, quin tamen dosis Vitri Antimonii in his praeparatis praesens ipsis esset cognita, animo perpendebam necessarium esse maxime, ut per experimenta saepius repetita indagarem quantitatem Reguli aut Vitri Antimonii in vinis solutam, qua accurate determinata tutius praescribenda veniunt haec praeparata, cum sine cognita dosi maximum instet periculum tale quid exhibendi; debet enim interdum dirissima mala experiri Medicus, si bona adhuc fortuna aegrotantem sub spe curationis non mittat ad patres.

Verum enim vero ut citam crisin praematuri scisci evitare eo certius, non sine consilio Clariss. D. Professoris *Crantz* in aeternum venerandi omnes etiam minimas adhibui cautelas, quas hic secundum ordinem adducam, ut illi, qui experimenti probam experiri volunt, eas etiam adhibere

*) Clariss. vir Profess. *Crantz* Mat. Med. Tom. III. pag. 63.

**) ibidem.

possint; cuicumque enim non erit ignotum, quam difficile sit laborem quemdam suscipere novum, cum tot scioli invidia turgiduli plurimis plerumque stimulentur judiciis, a quibus afficiuntur, et ita quidem, ut experimentorum laudem vel minuere vel plane delere conentur, at dum omnes huic fato sunt expositi, me non excipiam, et lubens me crisi expono, hoc autem praemonitum volui, ut praejudiciis liberi omnes cautelas infra adnotatas sincere applicent, minimum enim accidens (ut praxis Chemiae docet) eventum coelo interdum diversum in experimentis demonstrat, praecipue si artifex vel rudius, vel incautius, vel negligentius tractet.

Ut itaque omnia dicam, quae ad rem pertinent, silentio praeterire nolim, quod Regulum Antimonii vulgarem stellatum dictum ex quatuor partibus Antimonii, tribus tartari, et duabus nitri compositum, ut et Vitrum Antimonii hyacinthinum minutissime pulverisatum in Pharmacia ad S. Spiritum accepi, et erant genuina, cum ipsemet ea praeparare viderim.

Vina vero ad experimenta haec facienda necessaria a quibusdam amicorum meorum mihi pro munere fuerunt oblata, sic parsis sumtibus accepi vina profecto catholica, quae ab oenopolis propter adulterationem pro certo sperare non poteram, et sunt sequentia: Vinum nempe Tockayense, Hispanicum, Champaniense, Burgundicum, Rhenanum, Mosellanum, Budense, Austriacum.

Cum itaque ad experimenta haec facienda maxime necessaria, eaque genuina possidebam; necesse etiam erat, ut omnes cautelas quascunque possibiles in quovis experimento adhiberem, quae jam secundum ordinem sequuntur.

Imprimis accepi vas vitreum latiori aliquantulum fundo constructum, quatuor circiter unc. continens, hoc optime depuratum staterae imposui obtento aequilibrio, Reguli aut Vitri Antimonii quantitatem in experimento adhibendam libravi, hoc facto affudi vini quantitatem determinatam. Obmunivi dein vas vesica fuilla, et digestionem exposui, prout in experimentis notatis videndum est.

Secundo filtrum, per quod liquor digestus filtrandus erat, similiter attentionem non minimam merebatur; cogi-

tabam enim filtrum statera examinatum a transfuso liquido etiam post opinatam exsiccationem majorem in se posse continere aquae quantitatem, et sic experimenti veritatem falsificare incio artifice. Propterea accepi filtrum diu radiis solis ad exsiccamdum expositum statera examinaui, et determinatum pondus annotavi, his factis vinum solum cum aqua mixtum transcollabam, iterumque radiis solis ad exsiccamdum exponebam, ut viderem, utrum filtri pondus a transfuso liquido augeretur: tum enim experiebar, filtri pondus a transfuso liquido non augeri, sed idem omnino habere pondus, ex quo conclusionem deducere poteram, quod post filtrationem liquidi cum Regulo digesti, aut cum Vitro Antimonii nihil in filtro maneat exsiccatione probe observata quam Regulus aut Vitrum Antimonii, prout experimentum fuit; methodo enim sequenti determinabam solutam quantitatem Reguli aut Vitri; in filtro adnotatum erat pondus et filtri et Reguli aut Vitri Antimonii, omnibus dein rite observatis, pondus filtri et Reguli aut Vitri Antimonii simul in una parte staterae imponebam, in altera parte filtrum cum intus contento Regulo aut Vitro in experimento applicato: in quantum ergo aequilibrium turbabatur, tanta erat solutio aut Reguli aut Vitri Antimonii.

Tertio. Digestione peracta accepi vitrum, in quo digerens liquidum continebatur, hoc pollice clausum concussi, ut sic particulae Reguli aut Vitri Antimonii graviores in fundo vasis haerentes innatarent liquido, et sic liquidum per filtrum transjeci, ne autem aliquid in vitro maneret, saepius aqua elui, pollicemque ad filtrum saepius absterfi, donec vas purissimum evaderet, et ita certo certius credere poteram, me nullam Reguli aut Vitri Antimonii fecisse jacturam.

Quarto. Accepi semper filtrum duplex ex charta bibula tenuissima, qua thee involutum ex Hollandia ad nos adferri solet, ne nempe particulae quaedam aut Reguli aut Vitri Antimonii maxime alcoholisati per filtrum pertransire valerent, sicque semper liquidum transcollatum lucidissimum evasit. His peractis filtrum in latiori ejus parte plicis obfirmavi, ne nempe particulae quaedam Reguli aut Vitri An-

timonii rudiori aut incauta tractatione, exsiccatione et libratione ex filtro prolabi posset.

Quinto. Aura pluviali experimenta nunquam statera examinavi, ne aliquis credere posset, chartam bibulam prius bene exsiccata humiditatem aëris ad se traxisse, et sic Reguli aut Vitri Antimonii quantitatem solutam praesentasse longe minorem, cujus possibilitatem mihi sequens experimentum demonstravit. Chartam bibulam radiis solis diu, ut omnem humiditatem ad sensum possibilem amitteret, exposebam, dein statera ipsius pondus inquirebam, hocque determinatum annotabam, aliquibus diebus praeterlapsis aura pluviali accelerante, dum aër humiditate impraegnabatur, mox eandem chartam statera examinabam, ubi experiebar hanc chartam pondere ad aliquot grana esse majorem.

Sexto. Stateram, quae minutissima, mox dixissem, cogitationes indicabat, diligentissime semper depuravi, ne pulvisculorum hinc inde in aere volitantium moles in stateram deposita turbaret ejus aequilibrium. Quod hoc notatu dignum, assignavit mihi casus quidam accidentalis, qui mihi contigit cum experimento septimo Sectionis secundae: in hoc experimento unc. I. vini Hispanici per viginti quatuor horas solvebat unam decimam sextam partem gr. unius; dum observatis omnibus cautelis hoc experimentum statera examinabam. Hoc idem experimentum prout cum omnibus factum repetii, dum vero statera examinabam repetitum hoc experimentum, indicabat mihi solutionis differentiam vix non ad unam decimam sextam partem gr. unius. Hinc inde cogitabam et causam hujus differentiae diu non attingere poteram. Dum vero omnes cautelas adhibendas denuo examinarem, videbam me non depurasse stateram, qua dein depurata differentia non amplius apparebat. Hoc autem non intelligendum; quasi ante librationem experimenti aequilibrium staterae non examinassem. Hoc non: examinavi enim, et habuit. Inter examinandum vero adhibendo, desumendo, iterumque addendo pondera ad aequilibrium componendum in una parte plus prae altera abstergitur pulvisculorum moles, et sic quam facillime in tam delicata materia decipitur artifex.

Pondus minutissimum, quod in experimentis meis annotavi, est decima sexta pars gr. unius, nolebam enim laborem reddere difficillimum, qui per se satis difficilis est, et alioquin in experimentis meis semper annotabo excessum vel defectum unius decimi sexti.

His itaque praemonitis, et omnibus cautelis bene observatis, experimenta mea institui tempore aestivo, sola digestionem frigida, occasio enim ut et requisita ad digestionem calidam instituendam omnino mihi defuerunt.

Uni experimento fidem non adhibui, bis enim repetita placent, praecipue si exitus semper observatur idem.

Quaedam experimenta digestionem exposui per viginti quatuor horas, alia per octo dies, quaedam institui cum minori, alia cum majori Reguli aut Vitri Antimonii quantitate, quoad primum: observavi per majus temporis intervallum, simul etiam majorem Reguli aut Vitri Antimonii solvi quantitatem, quae differentia, ut in experimentis meis patebit, certe non est minoris momenti. Quoad secundum, communiter accepi vini alicujus unc. unam (haec enim est determinata quantitas vini in meis experimentis, nam defectus quorundam vinorum prohibuit majorem sumere pro uno experimento quantitatem, dum quodvis experimentum bis repetendum erat:) et Reguli Antimonii in uno experimento gr. duo, in alio experimento eandem quantitatem vini, sed triginta grana Reguli. Verum ad experimenta cum Vitro Antimonii facienda, quia major quantitas hujus solvitur, etiam major erat in experimentis adhibenda. Accepi sic vini cujusdam unc. unam, et Vitri Antimonii gr. quatuor in uno experimento, in altero vini quantitatem eandem cum gr. triginta Vitri Antimonii, et pariter in binis, tam in experimentis cum Regulo, quam cum Vitro Antimonii differentia apparebat satis notabilis, ut postea patebit.

Examinatis itaque bene experimentis meis pro certo statuere poteram sequentes positiones:

I.

Major in omnibus vinis solvitur Vitri Antimonii hyacinthini quantitas, quam Reguli Antimonii vulgaris stellati dicti.

II.

In quibusdam vinis solvitur Vitrum Antimonii hyacinthinum, in quibus Regulus ante dictus non solvitur.

III.

Quo diuturnior protrahitur digestio, eo major solvitur quantitas, tam in Regulo, quam in Vitro Antimonii.

IV.

Majori quantitate Reguli, aut Vitri Antimonii in experimento adhibita major pariter solvitur quantitas,

V.

In vinis acidulis plus solvitur et Reguli et Vitri Antimonii, quam in aliis vinis.

His omnibus bene notatis fateor nihilominus hoc opusculum minus esse completum, cum plurima adhuc desint experimenta, deficit enim tentamen cum sero lactis cum tartaro praeparato, quod quidem probavi saepius, sed semper praeter morem etiam ad nauseam usque repetita transcolatione turbulentum evasit liquidum digestum,

Deficit tentamen cum aceto destillato, at dum vitreum vas crusta quasi vitrea (in experimento enim adhibitum fuit Vitrum Antimonii) et in fundo et ad latera obducebatur, quantitatem solutam non determinare ausim, cum crustam hanc sine laesione vitrei vasis abradere non poteram.

Spiritus vini alcoholisatus nec Regulum nec Vitrum Antimonii tetigit.

Deficiunt adhuc experimenta cum acidis mineralibus, quorum duo agunt decomponendo, aliud vero, tum ob certas encheireses, ad quas instituendas et occasio, et vasa, et adminicula mihi defunt, tum ob laborem nimis taedium instituere non potui. Rem verbo: si experimenta adhuc instituenda instituere vellem, labor forte foret annuus; sufficit me fecisse haec cum vinis maxime usitatis: alia potius curiositatis, quam utilitatis gratia instituenda sunt, quod nimium; labor enim hic tam diuturnus et ob nimias observationes tam difficilis est, ut experimentis in hac Dissertatione contentis tres menses dedicare debuerim.

Ultimo adhuc monere debeo, omnia haec vina cum Regulo aut Vitro Antimonii digesta medicatum quemdam

habere odorem, non aliter, ac si cum resinâ abietina infusio facta fuisset. Unde hoc? Non minus: si quis tale infusum praescribat, ne maiorem quantitatem pro dosi exhibeat; nam expertus fui, aliquem satis caeterum robustum ab unc. una vini Rhenani, cujus digestio cum gr. duobus Reguli Antimonii per 24 horas protrahebatur, octies vomuisse, dum tamen non plus, quam tres decimae sextae partes in hoc solutae fuerant, hoc tamen etiam notandum, illum tam levem habuisse vomitum, ut ne vel minimum inde senferit ita dicendo incommodum. Iterum alteri satis robusto unc. unam vini Mosellani, quae digestionem cum gr. duobus Reguli Antimonii per 24. horas exposita fuerat, propinavi, quam sine vomitu quidem assumpsit, at sequenti die ter vel quater alvum solito laxiorem habuit, an hoc a liquore digesto, an ab alia causa accidentali, non determino. Utinam occasionem haberem pluribus tale infusum propinandi, ut dosim certiore ad vomitum promovendum determinare possem; verum binis his experimentis factis nulli amplius dulcissimis etiam verbis persuadere poteram, ut tam dulce apparens nectar assumeret. Attamen hoc practicus relinquo, qui visis his experimentis quantitatem vini talis vel syrupi emetici nota perspectaque corporis idiosyncrasia determinare possunt.

His itaque praemissis ad experimentorum demonstrationem me verto, quae jam secundum ordinem sequuntur.

S E C T I O I.

In hac sectione continentur experimenta facta cum unc. una cujuscunque vini, et gr. duobus Reguli Antimonii, cujus digestio per 24. horas protracta.

Experimentum I.

℞. Vini Austriac. unc. j.
Reguli Antimonii gr. ij.
Stet in dig. frig. per 24 horas.

Solutio.

Quinque decimae sextae partes gr. unius.

II.

- R̄. Vini Champaniens. unc. j.
Reguli Antimonii gr. ij.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Una quarta pars gr. unius.

III.

- R̄. Vini Rhenani unc. j.
Reguli Antimonii gr. ij.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Tres decimae sextae partes gr. unius.

IV.

- R̄. Vini Mosellani unc. j.
Reguli Antimonii gr. ij.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Una octava pars gr. unius.

V.

- R̄. Vini Burgundici unc. j.
Reguli Antimonii gr. ij.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Vix non una octava pars gr. unius.

VI.

- R̄. Vini Buderensis unc. j.
Reguli Antimonii gr. ij.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Fere una octava pars gr. unius.

VII.

- R̄. Vini Hispanici unc. j.
Reguli Antimonii gr. ij.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Vix aliquid aut plane nihil.

VIII.

- ℞. Vini Tockaviensis unc. j.
Reguli Antimonii gr. ij.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio

Nihil omnino solvitur.

S E C T I O II.

In hac sectione continentur illa, quae cum majori Reguli quantitate digerebantur per 24 horas.

Experimentum I.

- ℞. Vini Austriaci unc. j.
Reguli Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Gr. unum.

II.

- ℞. Vini Champaniens. unc. j.
Reguli Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Gr. unum minus una decima sexta parte.

III.

- ℞. Vini Rhenani unc. j.
Reguli Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Undecim decimae sextae partes gr. unius.

IV.

- ℞. Vini Mosellani unc. j.
Reguli Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Novem decimae sextae partes gr. unius.

V.

- ℞. Vini Burgundi. unc. j.
Reguli Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Gr. dimidium.

VI.

- R_x. Vini Budensis unc. j.
Reguli Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Gr. fere dimidium.

VII.

- R_x. Vini Hispanici unc. j.
Reguli Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Una decima sexta pars gr. unius.

VIII.

- R_x. Vini Tockaviens. unc. j.
Reguli Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Nihil omnino solvit.

S E C T I O III.

Iam sequuntur experimenta, quorum digestio per octo dies protracta fuit, et cum quoad tempus simul major solvatur quantitas, loco, quod adhibuissem in quovis experimento duo gr. Reguli, adhibui quatuor.

Experimentum I.

- R_x. Vini Austriaci unc. j.
Reguli Antimonii gr. iv.
St. in dig. frig. per 8 dies.

Solutio.

Gr. dimidium.

II.

- R_x. Vini Champaniens. unc. j.
Reguli Antimonii gr. iv.
St. in dig. frig. per 8 dies.

Solutio.

Sex decimae sextae partes gr. unius.

III.

R̄. Vini Rhenani unc. j.
 Reguli Antimonii gr. iv.
 St. in dig. frig. per 8 dies.

Solutio.

Una quarta pars gr. unius.

In hoc experimento quarto vinum Mosellanum per octiduum contraxit in superficie pelliculam, consequenter pellicula mansisset in filtro, et falie mihi determinasset solutum pondus.

V.

R̄. Vini Burgundici unc. j.
 Reguli Antimonii gr. iv.
 St. in dig. frig. per 8 dies.

Solutio.

Tres decimae sextae partes gr. unius.

VI.

R̄. Vini Budensis unc. j.
 Reguli Antimonii gr. iv.
 St. in dig. frig. per 8 dies.

Solutio.

Una octava pars gr. unius.

VII.

R̄. Vini Hispanici unc. j.
 Reguli Antimonii gr. iv.
 St. in dig. frig. per 8 dies.

Solutio.

Una decima sexta pars gr. unius.

VIII.

R̄. Vini Tockaviens. unc. j.
 Reguli Antimonii gr. iv.
 St. in dig. frig. per 8 dies.

Solutio.

Nihil omnino solvit.

S E C T I O IV.

In hac continentur experimenta cum majori quantitate Reguli, digestionem similiter per octo dies protracta.

Experimentum I.

℞. Vini Austriac. unc. j.
Reguli Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. per 8 dies.

Solutio.

Gr. unum cum dimidio.

II.

℞. Vini Champaniens. unc. j.
Reguli Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. per 8 dies.

Solutio.

Gr. unum cum una quarta parte gr. unius.

III.

℞. Vini Rhenani unc. j.
Reguli Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. per 8 dies.

Solutio.

Gr. unum.

In hoc experimento quarto vinum Mosellanum simili modo, ut in priori contraxit pelliculam.

V.

℞. Vini Burgundici unc. j.
Reguli Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. per 8 dies.

Solutio.

Quatuordecim decimae sextae partes gr. unius, seu septem octavae partes.

VI.

R \acute{x} . Vini Budensis unc. j.
Reguli Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. per 8 dies.

Solutio

Tres quartae partes gr. unius.

VII.

R \acute{x} . Vini Hispanici unc. j.
Reguli Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. per 8 dies.

Solutio.

Tres decimae sextae partes gr. unius.

VIII.

R \acute{x} . Vini Tockaviensis unc. j.
Reguli Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. per 8 dies.

Solutio.

Plane nihil.

S E C T I O V.

Visis experimentis cum Regulo Antimonii sequuntur illa cum Vitro Antimonii hyacinthino eodem ordine instituta.

Experimentum I.

R \acute{x} . Vini Austriaci unc. j.
Vitri Antimonii hyac. gr. jv.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Gr. duo cum una quarta parte gr. unius.

II.

R̄. Vini Champaniens. unc. j.
Vitri Antimonii gr. jv.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Gr. ji. cum una octava parte gr. unius.

III.

R̄. Vini Rhenani unc. j.
Vitri Antimonii gr. jv.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Gr. duo.

IV.

R̄. Vini Mosellani unc. j.
Vitri Antimonii gr. jv.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Gr. unum cum semisse.

V.

R̄. Vini Burgund. unc. j.
Vitri Antimonii gr. jv.
Stent in dig. frig. per 24 horas.

Solutio.

Tres quartae partes gr. unius.

VI.

R̄. Vini Budensis unc. j.
Vitri Antimonii gr. jv.
St. in dig. frig. per 24 hor.

Solutio.

Decem decimae sextae partes gr. unius.

VII.

R̄. Vini Hispanici unc. j.
Vitri Antimonii gr. jv.
St. in dig. frig. p. 24 hor.

Solutio.

Gr. dimidium.

VIII.

R̄. Vini Tockaviensis unc. j.
Vitri Antimonii gr. jv.
St. in dig. frig. p. 24. hor.

Solutio.

Aliquid plus una decima sexta parte gr. unius.

S E C T I O VI.

In hac continentur illa cum majori quantitate Vitri Antimonii hyacinth.

Experimentum I.

R̄. Vini Austriaci unc. j.
Vitri Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. p. 24. hor.

Solutio.

Gr. quatuor.

II.

R̄. Vini Champaniens. unc. j.
Vitri Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. p. 24. hor.

Solutio.

Gr. quatuor minus una quarta parte gr. unius.

III.

R̄. Vini Rhenani unc. j.
Vitri Antimonii gr. xxx.
St. in dig. frig. p. 24 hor.

Solutio.

Gr. tria cum dimidio.

IV.

Rx. Vini Mosellani unc. j.
 Vitri Antimonii gr. xxx.
 St. in dig. frig. p. 24 hor.

Solutio.

Gr. tria.

V.

Rx. Vini Burgund. unc. j.
 Vitri Antimonii gr. xxx.
 St. in dig. frig. p. 24 hor.

Solutio.

Gr. unum cum dimidio.

Pro hoc VI^{to} experimento mihi defuit vinum Budense.

VII.

Rx. Vini Hispanici unc. j.
 Vitri Antimonii gr. xxx.
 St. in dig. frig. p. 24 hor.

Solutio.

Gr. unum cum dimidio.

Pro experimento VIII^{vo} pariter defuit vinum Tockavienfe.

S E C T I O VII.

Ultimo demum sequuntur experimenta quoad diuturnitatem temporis a prioribus distincta.

Experimentum I.

Rx. Vini Austriaci unc. j.
 Vitri Antimonii gr. jv.
 St. in dig. frig. p. 8 dies.

Solutio.

Gr. iij. minus una quarta parte.

II.

R̄. Vini Champaniens. unc. j.
 Vitri Antimonii gr. jv.
 St. in dig. frig. p. 8. dies.

Solutio.

Gr. duo cum dimidio.

III.

R̄. Vini Rhenani unc. j.
 Vitri Antimonii gr. jv.
 St. in dig. frig. p. 8 dies.

Solutio.

Gr. duo.

Pro hoc IV^{to} defuit vinum Mosellianum,

V.

R̄. Vini Burgundi unc. j.
 Vitri Antimonii gr. jv.
 St. in dig. frig. p. 8 dies.

Solutio.

Gr. unum et tres quartae partes gr. unius.

Pro experimento VI^{to} defuit vinum Budense.

VII.

R̄. Vini Hispanici unc. j.
 Vitri Antimonii gr. jv.
 St. in dig. frig. p. 8 dies.

Solutio.

Gr. unum.

VIII.

R̄. Vini Tockaviens. unc. j.
 Vitri Antimonii gr. jv.
 St. in dig. frig. p. 8 dies.

Solutio.

Sex decimae sextae partes gr. j.

S E C T I O VIII.

Experimentum I.

- R_x. Vini Auftriaci unc. j.
 Vitri Antimonii gr. xxx.
 St. in dig. frig. p. 8 dies.

Solutio.

Gr. viginti unum cum semisse.

II.

- R_x. Vini Champaniens. unc. j.
 Vitri Antimonii gr. xxx.
 St. in dig. frig. p. 8 dies.

Solutio.

Gr. viginti et unum.

III.

- R_x. Vini Rhenani unc. j.
 Vitri Antimonii gr. xxx.
 St. in dig. frig. p. 8 dies.

Solutio.

Gr. viginti.

IV.

- R_x. Vini Mosellani unc. j.
 Vitri Antimonii gr. xxx.
 St. in dig. frig. p. 8 dies.

Solutio.

Gr. novemdecim.

Pro V^{to}. cum vino Burgundico uti et pro VI^{to}. cum
 vino Budensi non habui vina.

VII.

- R_x. Vini Hispanici unc. j.
 Vitri Antimonii gr. xxx.
 St. in dig. frig. p. 8 dies.

Solutio.

Gr. jv.

Ultimi defectus defectui vini pariter adscri-
 bendum.

I N D E X.

NUMERI INDICANT PAGINAS.

A.		Balsamus vitae Basilii, -	408
Acetum antimonii <i>Baf. Va-</i>		— vulnerarius B. V.	387
<i>lentini</i> - - - - -	407	Bezoardicum ioviale, -	378
Adiantum aethiopicum Linn.	196	— lunare, -	379
Adonis velsicatoria Linn.	197	— martiale, -	378
Aethiops antimonialis -	370	— minerale f. anti-	
Alcali fixi mineralis examen		moniale <i>Crollii</i> , -	375
chemicum - - - - -	99	— saturninum, -	378
— — — origo - - - -	106	— solare <i>Crollii</i> , -	378
Aloë linguaeformis Linn.	197	Bryoniae africanae L. decoctum	
Antidotus Soaephilos <i>Querce-</i>		diureticum, quandoque	
<i>rani</i> - - - - -	407	catharticum et emeticum, -	194
Antihecticum <i>Poterii</i> , -	378	Butyrum antimonii, -	386
Antimonium catharticum <i>Wil-</i>		— — rectificatum, -	387
<i>soni</i> - - - - -	384	C.	
Antimonium crudum eiusque		Cachecticum <i>Ludovici</i> , -	378
proprietas, - - - -	369	Cahuchu vid. Resina elastica.	
Antimonium diaphoreticum		Calx antimonii alba, -	374
ablutum, - - - - -	374	— f. cinis antimonii, -	376
— — fixum, - - - - -	376	— — magica, - - - -	377
— — martiale, - - - -	378	Cantharidum doses chemicae, -	61
— — solare au-		— historia naturalis, -	59
ratum, - - - - -	379	— effectus in corpus	
— — tartarifa-		humanum, - - - - -	64
tum, - - - - -	403	— usus internus va-	
— nitratum, - - - - -	385	riis in morbis laudatur, -	67
— vitriolatum, - - - -	383	Caoutchouc vid. Resin. elastic.	
Antimonii praecipitatum dia-		Caroxylon salsola L. - - -	198
phoreticum, - - - -	375	Cerussa antimonii solaris, -	379
— — purgans, - - - -	376	Cinnabaris antimonii, -	408
Aqua antiepileptica <i>Querce-</i>		Clyffus antimonii, - - - -	407
<i>rani</i> , - - - - -	407	Crocus antimonii medicinalis, -	396
— benedicta <i>Rulandi</i> , -	395	— — mitior, - - - -	398
— ophthalmica antimonial-		— martis antimonii ape-	
lis, - - - - -	407	ritivus, - - - - -	378
— stimmi sulphurea - -	407	— metallorum, - - - -	398
— — tartarea, - - - -	407	Crotalaria perfoliata L. -	197
Aquila alba, - - - - -	381	D.	
Arctopus echinatus L. - -	195	Diaphoreticum minerale, -	374
Asclepiadis undulatae L. deco-		— regulinum, - - - -	375
ctum hydropicis bibendum		E.	
commendatur, - - - -	195	Elixir solare antimonii, -	389
B.		Emeticum mite antimonii, -	377
Balsamus antimonii <i>Sennerti</i> , -	408	Essentia antimonii emetica	
— reguli antimonii <i>Schrö-</i>		<i>Schroederi</i> , - - - -	394
<i>deri</i> , - - - - -	408	— — <i>Huxhami</i> , - - - -	394
— sulphuris antim. <i>Zwoel-</i>		F.	
<i>feri</i> , - - - - -	408	Fagara capensis, - - - -	197
		F f	

- Febres intermittentes usu salis ammoniaci cito ac tuto curatae, . . . 152
- Flores antimonii crudi, 377 et 402
- — diaphoretici, 383
- — tartarifati, 385
- — vitriolati, 406
- reguli antimonii, 377
- salis ammoniaci antimoniales, . . . 406
- G.
- Geranium cucullat. et triste L. 194
- Gummi elasticum vid. Resin. elastic. H.
- Haemanthus coccineus L. vim exserit incidentem et diureticam instar scillae maritimae, . . . 194
- Hepar antimonii, . . . 405
- I.
- James's Powder s. Jacobi pulvis, 377
- Infusio antimonii crudi, 409
- croci metallorum, 409
- vitri antimonii B. V. 395
- K.
- Kermes minerale, . . . 399
- miner. Bergmanni, 401
- L.
- Lichenis islandici descriptio botanica, . . . 268
- — Patria et tempus colligendi, . . . 271
- — Diacrisis chemica, 272
- — pasta et syrupus, 281
- — variae vires, e. g. vis nutriens, roborans, ecoprotica etc. . . . 282
- — usus in anaphrodisia, 299
- — — in haemoptysi, 289
- — — in phthisi, 290
- — — in tussi, 287
- — — diaeteticus, 300
- — — veterinarius internus, . . . 302
- Lichenis pyxidat. analysi chemica, . . . 315
- — descriptio botanica, 311
- — maxima mucilaginis copia et principium amarum resinofum, 318
- Lichen. pyx. usus valde proficiuus in tussi convulsiva, 319
- Lilium Paracelsi, . . . 418
- Liquor antim. per deliquium, 405
- — mellitus, . . . 409
- e sale vitri antimonii, 409
- Lobelia pinifolia L. . . . 195
- Lues venerea, eiusque symptomata curantur opio, 207. non semper quidem hoc solo remedio, sed certissime, si opio mercurio iunctum sit, 225
- Lycoperdon carcinomale L. ad ulcera cancrofa commendatur, . . . 196
- M.
- Magisterium antimonii, . . . 381
- — Bas. Valent. 382
- Mercurius vitae, . . . 381
- — catharticus Schroe-deri, . . . 383
- — correctus eiusd. 382
- Morsuli antimoniales Kunkelii, 371
- N.
- Nix diaphoretica antimonii, 376
- O.
- Oleum antimonii B. V. . . . 387
- — compositum B. V. 409
- — crystallinum, 387
- — febrifugum et antipleuritic. . . . 409
- — mellitum . . . 409
- — saccharatum B. V. 410
- — — Beguini, 410
- — — Fausti, 410
- — — Quercetani, 410
- — — Sennerti, 410
- Opium diversi effectus et exhibendi modi, 203 In gonorrhoea virulenta, 207. In phymosi et paraphymosi, 210. In bubonibus venereis, 213. In ulceribus venereis et in aliis symptomatibus ex absorptione virus venerei ortis, 216. Lues venerea non semper solo hoc remedio curatur, 224. De opii vi antisiphylitica animadversiones, 234. Effectus post opium assumptum in c. h. 247 Cautelae in opii adhibitione observandae, 253. Quo

modo opium prodest in intermit-		<i>Meuseri,</i>		411
tentibus febribus, 254. et in con-		Sal regulinum arsenicatum,		388
tinuis, 256. Opium ut efficax sit,		— — acetosellatum,		390
semper sufficiente dosi exhiben-		— — benzoinum,		390
dum, — — — — — 259		— — boracinum,		388
Osmites camphorina L. 196		— — citiatum, —		390
Oxalis cernua L. — 197		— — cydoniatum,		390
Oxylaccharum vomitivum <i>Lu-</i>		— — phosphoratum,		388
<i>dovici,</i> — — — — — 389		— — saccharatum,		390
<i>P.</i>		— — succinatum,		388
Panacea antimonii, — 398		— — tamarindinatum,		391
— ex butyro antimonii, 383		Salis ammoniaci egregia virtus		
— Glauberiana, — 403		febrifuga laudatur, —		132
— sulphuris antim. veri, 376		— — adhibendi tempus ac		
Piper capense L. — 198		methodus, 135. in tertianis		
Polygonum barbatum L. 196		et quotidianis intermittenti-		
Praecipitatum antim. purgans		bus effectus, eorumque con-		
<i>Rolfskii,</i> — — — — — 382		stantia, — — — — — 138		
— reguli antim. martia-		— — ab usu febres recidi-		
lis <i>Schroederi,</i> — — — — — 382		vae rarissimae accidunt, —		143
Protea mellifera, speciosa et		— — intus in corpore ope-		
grandiflora L. — — — — — 197		randi ratio, — — — — — 145		
Pulvis <i>Algarothi,</i> — — — — — 381		— — usus in intermitten-		
— <i>Cornachini,</i> — — — — — 384		tibus cortici Peruviano ae-		
— alterans <i>Plumeri,</i> — — — — — 406		quiparari potest, — — — — — 149		
<i>R.</i>		— — usu victus ratio ob-		
Regulus antimonii jovialis, 373		servanda, — — — — — 136		
— — — — — martialis, 372		Sapo chemicus, — — — — — 411		
— — — — — medicinalis, 396		Simarubae arboris, qua cortex		
— — — — — simplex, 372		desumitur, descriptio, — — — — — 4		
— — — — — solaris, 373		Sodae Hispanicae historia, — — — — — 85		
— metallorum, — — — — — 373		— — — — — analysis chemica, — — — — — 88		
Refina elastica Caiennensis: arbor,		— — — — — usus oeconomicus,		
qua exstillat, describitur, 9. Quo		nempe in arte saponaria, — — — — — 113		
ex succo inspissato parantur varia		— — — — — in linteis l. te-		
utensilia, 12. Examinatur per se,		lis dealbandis, — — — — — 117		
14. ad aërem, aquam et ignem,		— — — — — in arte vitriaria, — — — — — 120		
18. ad varia menstrua l. acida, 27.		Solutio reguli et vitri antimo-		
l. alcalina, 33. l. saponacea et sa-		nii in diversis vinis caute		
lina, 34. l. spirituosâ, 35. l. oleo-		instituenda, — — — — — 423		
sa, 38. l. denique per varia, 41. Ex		Specificum stomachicum <i>Po-</i>		
hac refina comparantur instru-		<i>terii,</i> — — — — — 379		
menta nonnulla chirurgica, 46		Spiritus reguli antimonii, — — — — — 412		
Ricini communis L. semina, et		Stibium tartaro - tartarifatum		
oleum ex his expressum, — — — — — 195		<i>Bergmanni,</i> — — — — — 391		
Rubinus antim. mercur. <i>Clodii,</i> 411		— tartarifatum ammonia-		
<i>S.</i>		cal. <i>Lassoni,</i> — — — — — 393		
Sal ex antimonio crudo, — — — — — 388		Succinum antimonii, — — — — — 380		
— antimonii ex vitro, — — — — — 385		Sulphur e regulo antimonii io-		
— emetico - catharticum		viali, — — — — — 378		

Sulphur antimonii auratum,	404
— — — liquidum,	412
— — — diaphoreticum	
<i>Schroederi</i> ,	405
— — — fixum <i>Stabelii</i> ,	401
— — — <i>Hoffmanni</i> ,	401
— — — martiale,	405
— — — ex minera l. anti-	
mon. crudo,	402

T.

Tartarus emeticus antimonial.	392
Tinctura antimonii acris,	413
— — — alcalina f. tartarifata,	414
— — — genuina <i>Mangoldi</i> ,	414
— — — nigra,	415
— — — nephritica <i>Amelongii</i> ,	417
— ex antimon. calcinato B. V.	389
— — — tartarifato,	417
— ex croco metallor. <i>Bickeri</i> ,	389
— florum antimonii,	418
— florum antim. vitriolator.	389
— ex floribus reguli martialis,	417
— — — reguli,	389
— ex minera B. V.	419
— ex oleo antim. saccharato,	418
— saponata <i>Iacobi</i> ,	412
— sulphuris antim. aurati,	418
— — — reguli iovialis,	419
— vitrioli l. crySTALLOR. antim.	419
— ex vitro antim. solari,	417
Tulbagia alliacea et cepacea L.	198

V.

Vesicantium utilitas in variis	
morbis, tam inflammatoriis,	
tam exanthematicis, quam	
nervosis,	75
Vinum antimoniale <i>Leonhardi</i> ,	395
— antimonii <i>Huxhami</i> ,	394
— emeticum <i>Musitani</i> ,	395
Vitrioli albi indoles, 329. analysi	
chemica, 330. Quo modo arte pa-	
ratur, 331. Aliis metallis plerum-	
que est contaminatum, et quibus	

ex notis hoc cognoscitur,	333.
Quomodo rite depurandum,	335.
Vires vitrioli albi factitii f. depu-	
rati, 338. Vis emetica illius valde	
dubia et incerta, 340. Ad morbos	
sanandos purum non depurato	
semper praeferendum, 341. Usus	
externus in ophthalmia et aliis vi-	
tis oculorum, 342. in aphtis, 346.	
in angina et haemorrhagiis ex-	
ternis, 348. in gonorrhoea, 349. in	
fluore albo, 350. in morbis cutis	
chronicis et ulceribus, 351. ut et	
tanquam errhinum, 351. De uso	
interno vitrioli albi, 352. ab aliis	
celebratus ad venena narcotica de-	
glutita emesi excutenda, 353. in	
apoplexia a colluvie in primis viis	
354. in decursu febrium bilioso-	
putridarum, 355. in catarrho sus-	
focativo, in raphania et hydrope,	
356. in epilepsia, 357. in febribus	
putridis et morbo varioloso eius-	
dem indolis, 358. ad febres inter-	
mittentes profligandas, et in mor-	
bis rheumaticis et arthriticis, 359	
contra palpitationem cordis in ve-	
teratam et in fluore albo, 360. in	
diabete, in colica saturnina, ad di-	
arrhoeas, et in dysenteria,	361
Vitriolum antimonii,	385
— — — B. V.	385
Vitri antimonii in omnibus vi-	
nis solvitur maior quam re-	
guli antimonii,	427
Vitrum antimonii,	379
— — — <i>Bergmanni</i> ,	380
— — — <i>Maxvelli</i> purgans,	383
— — — correctum B. V.	385
— — — <i>Schroederi</i> ,	379
— — — ceratum,	380
— — — diaphoreticum,	389
— — — solari <i>Schroederi</i> ,	380
— — — regulinum <i>Schroederi</i> ,	379

FINIS TOMI PRIMI.

ERROR TYPOTHETAE EMENDANDUS.

a pag. 330. usque ad pag. 362. l. i. leg. Dr. Caroli Henrici Stolte.

